

Vérvizsgálatok a budapesti prostituáltaknál

DOROS GÁBOR

[...] Folyó év január-februárjában összesen 200 válogatás nélküli prostituáltat vizsgáltam meg és pedig 100-at olyant, kik mind syphilis-szel fertőzötteknek voltak bejegyezve, 100-at viszont, akiknél az orvosi nyilvántartólapon syphilis nem szerepelt. A vizsgálat minden esetben három egymást ellenőrző módszerrel, *Wassermann*,¹¹ *Sachs-Georgi*¹² és *Meinicke*¹³ eljárása szerint történt, a végeredményt pedig a három nyert érték összeegyeztetésével állapítottam meg. [...]

Az eddig felsorolt adatokból átszámítás segítségével módunkban van megállapítani, hogy az összes budapesti prostituáltaknak milyen arányban lehet syphilises fertőzést kimutatni. A bejegyzett prostituáltak össz-száma 1927-ben (a vizsgálatok idején) 1566 volt. Ezek közül 575-nél szerepelt az orvosi nyilvántartólapon syphilis, 991-nél pedig feltüntetve nem volt. Így a syphilis-es arányszám hatósági nyilvántartás szerint mindössze 36 százalékot mutatott, alig valamivel többet, mint az összes prostituáltak egyharmadát. Ezzel szemben a tiszta lappal bírók kimutatható syphilises fertőzöttsége következőleg alakul: a syphilismentes nyilvántartottak 44 százaléka vizsgálatunk szerint seropositív, 18 százaléka pedig olyan, kik fertőzésükről tudomással bírnak és magánkezelés alatt is álltak vagy állnak, seroreakciójuk¹⁴ azonban negatív. Utóbbiakkal együtt a megállapítható syphilises fertőzés aránya a tiszta lappal bíróknak összesen 62 százalékát (= 615 eset) alkotja. Ezek szerint módszerünkkel a budapesti bejegyzett prostituáltak teljes összegét képező 1566 közül $575 + 615 = 1190$ esetben, azaz 76 százaléknál, az összeseknek több mint háromnegyedében állapítható meg előrement syphilis. [...]

11 A szifilisz kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálat.

12 Szifilisz-teszt.

13 Meinicke Klarungs-reakció a vérbaj kimutatására.

14 A szerológia a vérszérum és a vér alakos (sejtes) elemeinek tulajdonságát biokémiai módszerekkel vizsgáló tudománya.,

Mindezek a vizsgálati tapasztalatok a syphilis leküzdése körül a reglementációnak imputált¹⁵ eredményeket nagyon kétségessé teszik. [...]

(Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927. – Kiny. az Orvosi Hetilap tudományos közleményeiből, 45. sz.)

Nem mindig beteg, aki magát ápoltatja

Nem mindig beteg, aki magát ápoltatja, kitűnik ez a belügyminiszternek valamennyi törvényhatósághoz intézett rendeletéből, amelyben mint a „Neues Pester Journal” írja, felhívja az illetékes közegek figyelmét arra, hogy különösen Horvát- és Szlavónországokban de az ország egyéb vidékein is, több dologtalan csavargó és kéjelgő egyén véteti fel magát betegség címén a kórházakban. Hogy ily egyének ápolásából származó indokolatlan kiadással a közalap ne terheltessék, a legnagyobb óvatosságot ajánlja a közegészségi orgánumoknak. A fővárosi tanács ezen rendelet folytán meghagyta a közkórházi gondnokoknak és orvosoknak a legszigorúbb eljárást.

(Kelet Népe, 1875. augusztus 13.)

A syphilis-kérdés statisztikai megvilágítása

DR. DOROS GÁBOR

A syphilit méltán soroljuk a tuberkulosis mellé, mint jelentőségében nem kevésbé fontos krónikus infekciózus kórt, melynek SZOCIÁLHIGIÉNÉS ÉS FAJEGÉSZSÉGÜGYI KIHATÁSAI, valamint az egyént sújtó végzetes következményei

¹⁵ „Betudott, beszámított”.