

**A BIZOTTSÁG 1465/2004/EK RENDELETE****(2004. augusztus 17.)****egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről****(EGT vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre<sup>(1)</sup> és különösen annak 3. cikkére és a 9d. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 70/524/EGK irányelv előírja, hogy közösségi engedély nélkül adalékanyagok nem forgalmazhatók. Az említett irányelv C. mellékletének II. részében említett adalékanyagok bizonyos feltételek teljesítése esetén időkorlátozás nélkül engedélyezhetők.
- (2) Az *Aspergillus oryzae* (DSM 11857) által termelt 6-fitáz enzimkészítmény használata broiler csirkék, tojtyúkok, hízópulykák, malacok és hízósertések esetében az 1353/2000/EK bizottsági rendelet<sup>(2)</sup> által és a kocák esetében a 261/2003/EK bizottsági rendelet<sup>(3)</sup> által első alkalommal ideiglenesen került engedélyezésre.
- (3) E készítmény esetében az időkorlátozás nélküli engedélyezés iránti kérelem támogatására új adatokat nyújtottak be. Az értékelés azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelvben az ilyen engedélyezés esetére megadott feltételeket teljesítették.

(4) Ennek megfelelően e készítménynek a mellékletben megadottak szerinti használatát időkorlátozás nélkül engedélyezni kell.

(5) E készítmény értékelése azt mutatja, hogy bizonyos eljárásokat kell előírni a dolgozók védelmére a mellékletben meghatározott adalékanyag expozíciója ellen. Ezt a védelmet biztosítani lehet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv<sup>(4)</sup> alkalmazásával.

(6) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

**1. cikk**

A mellékletben megadott „enzimek” csoportba tartozó készítmény használata időkorlátozás nélkül engedélyezésre kerül állati takarmányozási adalékanyagként az említett mellékletben meghatározott feltételek mellett.

**2. cikk**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 17-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

<sup>(1)</sup> HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1289/2004/EK rendelettel (HL L 243., 2004.7.15., 15. o.) módosított irányelv.

<sup>(2)</sup> HL L 155., 2000.6.28., 15. o.

<sup>(3)</sup> HL L 37., 2003.2.13., 12. o.

<sup>(4)</sup> HL L 183., 1989.6.29., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

| EK-szám | Adalékanyag           | Kémiai képlet, leírás                                                                                                                                                                | Faj vagy állatkategória | Maximális kor | Minimális tartalom                       | Maximális tartalom | Egyéb előírások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Az engedélyezési időszak vége |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |                       |                                                                                                                                                                                      |                         |               | A teljes takarmány aktivitás/kg egységei |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Enzimek |                       |                                                                                                                                                                                      |                         |               |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| „E 1614 | 6-ftáz<br>EC 3.1.3.26 | Az <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857) által termelt 6-ftáz enzimekészítmény, amelynek minimális aktivitása:<br><br>Szilárd forma: 2 500 FYT (°)/g<br>Folyékony forma: 5 000 FYT/g | Broiler csirkék         | —             | 250 FYT                                  | —                  | 1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást.<br>2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 500–1 000 FYT<br>3. A több mint 0,25 % fitinnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra.                                                                        | Időkorlátozás nélkül          |
|         |                       |                                                                                                                                                                                      | Tojtyúkok               | —             | 300 FYT                                  | —                  | 1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást.<br>2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 450-1 000 FYT<br>3. A több mint 0,25 % fitinnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra.                                                                        |                               |
|         |                       |                                                                                                                                                                                      | Hízópulykák             | —             | 250 FYT                                  | —                  | 1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást.<br>2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 500–1 000 FYT<br>3. A több mint 0,25 % fitinnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra.                                                                        | Időkorlátozás nélkül          |
|         |                       |                                                                                                                                                                                      | Malacok                 | —             | 250 FYT                                  | —                  | 1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást.<br>2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 500–1 000 FYT<br>3. A több mint 0,25 % fitinnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra.<br>4. Elválasztott malacok esetében használható kb. 35 kg testtömegig. |                               |

| EK-szám | Adalékanyag | Kémiai képlet, leírás | Faj vagy állatkategória | Maximális kor | Minimális tartalom                       |   | Maximális tartalom | Egyéb előírások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Az engedélyezési időszak vége |
|---------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |             |                       |                         |               | A teljes takarmány aktivitás/kg egységei |   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|         |             |                       | Hízósertések            | —             | 250 FYT                                  | — | —                  | 1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást.<br>2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 500-1 000 FYT<br>3. A több mint 0,25 % finnnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra. | Időkorlátozás nélkül          |
|         |             |                       | Kocák                   | —             | 750 FYT                                  | — | —                  | 1. Az adalékanyag és a premix használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletét, a tárolási időt és a pelletálaskori stabilitást.<br>2. Ajánlott dózis a teljes takarmány 1 kilogrammjában: 750-1 000 FYT<br>3. A több mint 0,25 % finnnel kötött foszfort tartalmazó keveréktakarmányban történő felhasználásra. | Időkorlátozás nélkül          |

(<sup>1</sup>) 1 FYT az az enzimmennyiség, amely 5,5 pH és 37 °C mellett percenként 1 mikromól szervesen foszfátot szabadít fel a nátrium fitárból.