

Vegyesek.

— Trefort Ágoston közoktatásügyi minister ur, Szász Károly ministeri és Markusovszky Lajos osztálytanácsos, Wéber Antal ministeri építész urak kíséretében a mult hó folyama alatt meglátogatta egyetemünket.

A látogatás célja az volt, hogy a közoktatásügyi minister úr személyes információt nyerjen az orvoskari intézetek és kórodák állapotáról, hogy ezek alapján az egyes tanszékeknek a kellő intézeti helyiségekkel és kórodákkal ellátására szükséges további intézkedéseket fogantatba vehesse.

Az intézetek közül jelenleg az élettani, kórboncztoni, általános kór- és gyógyszer-tani, államorvostani intézetek a régi főkörmányszék helyiségeiben vannak elhelyezve. Ez egy kolostorszerű épület a mult századból, hasonló a pesti újvilágutcai orvoskari épülethez, ennél talán valamivel kedvezőbb fekvésű és világosabb, de egészen czella-berendezésű szobákkal. A boncztoni intézet a lyceumi főépületben, az élet- és kórvegytani pedig a lyceumi telken létező külön állami épületben van elhelyezve.

A belgyógyászati és sebészeti tanszék kórodái a Carolina országos közkórház központi épületében, részint a szomszédos bérházban helyezvék el; a szemészeti, szülészeti, bőr- és bujakórtani kórodák szintén bérházakban vannak, melyek egymástól távolabb fekszenek.

Mind az intézetek, mind a kórodák helyisége természetesen igen távol állanak attól, hogy a mai kor igényeinek megfelelhessenek.

A kórodai tanszékeknek kellő helyiségekkel ellátása a kilátásba helyezett országos közkórházi építkezésekkel egyidejűleg tervezetnek, midőn a kórház illető osztályai berendezésénél a tanczélók is figyelembe fognak vétetni. Az új országos kórházi épületek a muzeumkert közelében fekvő kórházi telkekre tervezetnek. Felépítésük részint a már létező kórházi építkezési alap részint a bel- és közoktatásügyi költségvetés terhére fog eszközöltetni.

Az intézetek valószínűleg a muzeumkert melletti kórház-telekre jönnek csoportosított épületekben. A kolozsvári orvos-tanártestület javaslata szerint két ilyen intézet-csoport lenne: egyik a boncztoni, s kórboncztoni, míg a másik az élettani, kór- és gyógyszer-tani, s élet- és kórvegytani csoport. E beosztás inkább megfelel a tudomány mai állásának, mint a külföldön található némely ily csoportosítás, mint pl. a grázi boncztoni és élettani csoportosítás, mert tisztán el vannak válogatva benne a morphologiai tudományok a physiologiaiaktól, melyek amazoktól heterogen berendezést igényelnek. Hogy mely intézetek minő csoportban, egyszerre, vagy külön-külön épüljenek-e, a miniszteri építész helyszemléje után teendő költségvetés alapján később fog eldönteni. — Ohajtandó, hogy valamennyi intézet építése egyidejűleg kezdessék meg, a mi talán

lehető leend, minthogy a mi viszonyainkhoz képest hozzávetőleg tett számítás szerint itten öt intézet építési költségei nem fogják nagyon túlhaladni egy nagyobb pesti intézet kiállítási költségét.

A miniszter és kíséretének fogadtatása úgy az egyetem mint Kolozsvár városa részéről a legszívélyesebb volt. A megérkezés estéjén 17-én az egyetem összes tanártestületei, 18-án délután pedig az összes kolozsvári értelmiség rendezett bankettet a vendégek tiszteletére.

Hazánk orvosi oktatásügye érdekében kívánatos, hogy e látogatás mihamarább meghozza az ohajtott eredményt.

Szakosztályi ügyek.

Az 1881. febr. hó 19-én tartott szakülésen.

1. Nagy József tartott emlékbeszédet Dr. Gyergyai Árpád felett. Ez emlékbeszédet I. füzetünkben közöltük. Utána

2. Géber Ede értekezett a veres dobrócsról (lichen ruber).

Az 1881. márczius hó 26-án tartott szakülésen.

1. Benel János egy 6 hónapos gyermek beteget mutatott be, melynél künnrekedt lágycsérvtől miatti gyökeres sérvmetszés műtétét végezte. Előadását jelen füzetünk közli. Azután

2. Góth Manó mutat be egy általa kiirtott fekete husdagot (melanosarcoma).

A készítmény származik egy a 40-es években álló nőtől, ki körülbelül két év óta egy kezdetben lassan, későbbben rohamosan növekedő dagot észlelt, mely a vulva képleteiből kiindult. Miután előadó a körtörténetet röviden ismertette és a műtétnek lefolyását leírta, utal azon nehézségekre, melyek a kórisme megállapításánál jelen voltak, fejtegeti azon tüneteket, melyek carcinoma és azokat, melyek sarcoma mellett harczoltak és közli végre a — néhány górcsővi készítmény bemutatása mellett kórszövet-tani vizsgálat eredményét (Genssich tnr.), mely kivonatban itt következik:

Az újképlet hámtakarója hol vékonyabb hol vastagabb, a fehérlő foltok átlag 1.5 mm. vastag és a kis ajkak rendes háamához hasonló sejtekből állanak, melyek a legalsóbb rétegben hengeresek, ezután 3-20 sorban fésűs, nagy magvu sejtek és végre különböző vastagságban lapos háms sejtek.

A hám alatt éles határu magesadus és sokszor gümb sejtekkel bőven beszűrődött kötszövet következik, melynek legszélsőbb rétege többnyire szintelen, míg néhol festenyezett és úgy mint a mélyebb részek erősebben színezett.

A mélyebb részek — a tulajdonképi dagszövet — a színezés szerint különböző szerkezetűek.

A fehéres részben igen kifejezett alveolaris szövet van, a gerendázat vékony, másutt vastag rostos kötszövetből áll, orsószzerű és szétágazó, nagy magvu