

lehető leend, minthogy a mi viszonyainkhoz képest hozzávetőleg tett számítás szerint itten öt intézet építési költségei nem fogják nagyon túlhaladni egy nagyobb pesti intézet kiállítási költségét.

A minster és kíséretének fogadtatása úgy az egyetem mint Kolozsvár városa részéről a legszívélyesebb volt. A megérkezés estéjén 17-én az egyetem összes tanártestületei, 18-án délután pedig az összes kolozsvári értelmiség rendezett bankettet a vendégek tiszteletére.

Hazánk orvosi oktatásügye érdekében kívánatos, hogy e látogatás mihamarább meghozza az ohajtott eredményt.

## Szakosztályi ügyek.

Az 1881. febr. hó 19-én tartott szakülésen.

1. Nagy József tartott emlékbeszédet Dr. Gyergyai Árpád felett. Ez emlékbeszédet I. füzetünkben közöltük. Utána

2. Géber Ede értekezett a veres dobrócsról (lichen ruber).

Az 1881. márczius hó 26-án tartott szakülésen.

1. Benel János egy 6 hónapos gyermek beteget mutatott be, melynél künnrekedt lágycsérvtől miatt gyökeres sérvmetszés műtétét végezte. Előadását jelen füzetünk közli. Azután

2. Góth Manó mutat be egy általa kiirtott fekete husdagot (melanosarcoma).

A készítmény származik egy a 40-es években álló nőtől, ki körülbelül két év óta egy kezdetben lassan, későbbben rohamosan növekedő dagot észlelt, mely a vulva képleteiből kiindult. Miután előadó a körtörténetet röviden ismertette és a műtétnek lefolyását leírta, utal azon nehézségekre, melyek a kórisme megállapításánál jelen voltak, fejtegeti azon tüneteket, melyek carcinoma és azokat, melyek sarcoma mellett harczoltak és közli végre a — néhány górcsövi készítmény bemutatása mellett kórszövet-tani vizsgálat eredményét (Gensich tr.), mely kivonatanban itt következik:

Az újképlet hámtakarója hol vékonyabb hol vastagabb, a fehérlő foltok átlag 1.5 mm. vastag és a kis ajkak rendes háamához hasonló sejtekből állanak, melyek a legalsóbb rétegben hengeresek, ezután 3-20 sorban fésűs, nagy magvu sejtek és végre különböző vastagságban lapos háms sejtek.

A hám alatt éles határu magesadus és sokszor gümb sejtekkel bőven beszűrődött kötszövet következik, melynek legszélsőbb rétege többnyire szintelen, mig néhol festenyezett és úgy mint a mélyebb részek erősebben színezett.

A mélyebb részek — a tulajdonképi dagszövet — a színezés szerint különböző szerkezetűek.

A fehéres részben igen kifejezett alveolaris szövet van, a gerendázat vékony, másutt vastag rostos kötszövetből áll, orsószzerű és szétágazó, nagy magvu

sejtekkel, az örökben pedig otromba, laposdad és nyulványos nagy sejtek fészkelnek szemcsés protoplasmával és nagy kerekded magvakkal, melyek együtt kerek hoszpetéded, vagy ritkábban rövid és vastag szétágazó, menetszerű csoportokat képeznek.

A világos szürke részletek hasonló alkotásuak, csak hogy a gerendázat sejteiben szemcsés és rögös, barnás festeny van, gyakran oly nagy mennyiségben, hogy a sejt barna göröngynek látszik.

A sötétebb szürke helyeken nem csak a gerendázat sejtei festenyettek, hanem az alveolusokban levők is, de mindig csekélyebb mértékben, mint az előbbieik, és magvuk többnyire mint világosabb kör vagy pete látszik.

A dag legsötétebb részleteiben az alveolaris szerkezet teljesen eltűnt, itt a szövet nagy, otromba, hosszukás és laposdad sejtekből áll, melyek gyakran egy vagy több durva nyulványokkal birnak és festennyel annyira megterheltek, hogy magvat bennük meg nem különböztethetni.

Ezen sejtek közt, kevés, többnyire finom szálú, szintelen, rostos kötszöveti anyag van.

Megjegyzendő, hogy itt a sejtek közt szabad festényszemcsék is találtak és a sejtek oly bomlékonyak, hogy tépésnél szétmállanak és bennük tusszerűen szétömlik. . . .

Engel Gábor kérde nem lett volna-e célszerűbb a daganatot galvanocauticus kacschal levenni, mely esetben vérzés nem jött volna elő.

Előadó felvilágosításul válaszolja, hogy a daganat széles alapon ült, miért azt kacschal levenni nem lehetett. Egyébaránt a vérzés nem volt nagy, csakis az egyes üterek lokotése tartott sokáig a szövet szakadékonysága miatt. E mellett a vérző edények folyton comprimálva voltak.

Benel János hozzáteszi, mint ki az említett műtétnél szintén jelen volt, hogy a vérzés nem volt nagy, csakis az egyes üterek lekötése tartott sokáig, a parenchymatosus vérzés pedig thermocauterrel lett csakhamar megállítva.

Géber Ede tanár felemlíti, hogy ily esetek nem oly ritkák Rokitansky és tanítványai is láttak ilyeneket, hanem ezek nem sarcoma, hanem a carcinomákhoz tartoznak s ilyenkor, mikor a kül nemző részeknél fekete carcinoma fordul elő, az illető beteg testének többi részein is szoktak fekete foltok jelentkezni. Kérde, hogy ilyenmü fekete foltok e nő testén voltak-e láthatók?

Előadó azt válaszolja, hogy ő ugyan ez irányban a beteg egész testét nem vette szoros vizsgálat alá, mindazonáltal a hosszas kezelés, műtét és vizsgálatok alkalmával a nő testének legnagyobb részét láthatta, azonban fekete foltokat sehol nem vett észre. E mellett fenntartja azon véleményét, hogy az ilyenmü daganatok a nő külső nemző részén ritkán fordulnak elő, s ha a Géber által említett esetek azonosak is lennének e jelen esettel, mire nézve azonban nincs vele egy véleményben, miután azok bizonyára carcinomia esetek, nem pedig sarcomak, mint az, mely a jelen alkalommal szóban forog, még azon esetben is az ily helyeken való előjövetele a dagoknak nem gyakori.

Genersich Antal tanár kiemeli, hogy a jelenleg szóban levő dag, a most divó dagelmélet szerint olyan természetű, mely átmenetet képez

a sarcomak és carcinomiák között. E sarcomák nem egyformák; vannak jóindulatuak is és különösen, ha a dag oly helyen jön elő, a hol rendes, normalis között pigment lerakódások fordulnak elő, mint itt, akkor az itt kifejtett dag mégis kevésbé rossz indulatu. Évekig egy állapotban elmarad s kiirtás után nem recidivál.

3. Engel Gábor egy 4 hetes gyermeket mutat be, kinél a szülés után mindkét falcsontnak megfelelőleg egy-egy fejrédag (haematoma capit.) fejlődött. A 10-ik naptól kezdve a baloldali nagyobbodott s a 15-ik nap felfakadt midőn is 100 grmm genyes vér ürült ki. Alig 24 órára a baloldali felnyílása után a jobboldali fejrédag gyermekököl mekkoraságából férfikölhyire növekedett, lobos tüneteket mutatva; az 5-ik hét végén áttört a baloldali tályogürebe s annak nyílásán át mintegy 100 grmmnyi véresgeny ürült ki. Daczára ezen genyedési folyamatoknak a gyermek sulyban gyarapodott s javuló állapotban bocsátatott el

Az 1881. apríl 30-án tartott orvosi szakülésen.

1. Géber Ede beteget mutatott be a „lupus erythematosus“ egy esetét. Előadó a bántalom elnevezését illetőleg a „seborrhoea congestiva“ nevet sokkal czélszerűbbnek tartaná, melyet Hebra használt midőn e bántalmat legelőbb leírta. Utána

2. Purjesz Zsigmond értekezett „A tetaniáról“ Előadását jelen füzet közli.

Az 1881. május hó 27-én tartott orvosi szakülésen.

1. Géber Ede tett jelentést a folliculorum acarust illető vizsgálatiról. Ő egy 7 éves gyermeknél az arczon előforduló molluscum epithelioma (Virchow) bennéke megvizsgálása alkalmával a follic. acarust illetőleg az eddigi ismeretektől eltérő leletet nyert, mi előadót arra indította, hogy az állat természetrajzi viszonyait tanulmányozza. — Beható foglalkozás e tárggyal tényleg kedvező eredményre vezetett. Ez alkalommal a szakülés figyelmét csak a különböző, egymástól eltérő nézetekre hívja fel, fenntartva magának a tárgy kimerítő ösmertetését. Előadó heveny atka készítményeket is mutatott be. Utána

2. Klug Nándor értekezett, a „békaszív idegeiről“. Értekezését jelen füzet közli.

— Az erdélyi muzeum-egylet természettudományi szakosztálya és a kolozvári orvos-természettudományi társulat választmányja vegyes bizottságot küldöttek ki javaslattétel végett az iránt, hogy a közlönyünkben megjelenő cikkek miként részesítenének írói díjakban az 1881-ik év folyamán. A közösen megállapított költségvetési javaslatot mindkét társulat magáévá tévén, ennek értelmében cikkeink f. év jan. 1-jétől díjazásban részesülnek.

