

MAGYARORSZÁGI MADARAK MÉRETEI

Írta : † *Dr. Vasvári Miklós*¹

A Madártani Intézetbe rendszeresen küldött madarak méreteit mindig gondosan felvettem, és munkatársaimat is biztattam a méretek felvételére a preparálás alkalmával. Ezek a jegyzetek egy része az alábbiakban következik; ahol a mérést nem magam végeztem, ott a munkatárs nevét is feltüntetem. A méretek sorrendje a következő: testhossz, szárny (ha mind a két szárnyat mértem, akkor zárójelben utána a balszárny mérete), farok, csőr, csüd, súly, megjegyzés.

	milliméter	gramm
<i>Corvus cornix</i>		
Fűzfő, 1928. III. 27.	483, 330, 195, 55, 61	506
<i>Corvus frugilegus</i>		
Felsőméra, 1929. III. 23.	440, 292, 182, 50, 55	416 part. alb.
<i>Corvus frugilegus</i>		
Lébény, 1932. XII. 24.	—, —, —, —, —	479
<i>Coloeus monedula</i>		
Mohács, 1933. IV. 17.	350, 240, 130, 30, 40	250 Fekete K.
<i>Coloeus monedula</i>		
Lébény, 1933. V. 24.	325, 220 (225), 127, 28, —	193
<i>Pica pica</i>		
Fűzfő, 1928. III. 27.	470, 190, 260, 34, 50	211
<i>Pica pica</i>		
Mezőhegyes, 1928. IV. 24.	481, 202, 277, 30, 55	209
<i>Pica pica</i>		
Balatonrendes, 1933. XII. 8.	455, 190 (190), 242, 27, 49	182
<i>Nucifraga caryocatactes</i>		
Zirc, 1931. X. 29.	337, 180, 129, 45, —	150

¹ *Vasvári Miklós* viszonylag kevés visszamaradt hagyatékában szép számmal találtunk jegyzeteket, melyek az általa tömegesen mért madarokról szólnak. A jegyzetek néha letépett újságpapírszelekre vagy más kis papírszeletkére íródtak. Mivel a jegyzetek közt számos súlymértet is található, melyek eddig az irodalomban csak szórványosan szerepelnek, és az újabb vizsgálatokban egyre több szükség van rájuk, indokoltnak találtuk, hogy ezeket a jegyzet-töredékeket összeállítsuk és közzétegyük, amit az is indokol, hogy lelőle sok faunisztikai adat is előkerül. (Keve)

	milliméter	gramm	
Garrulus glandarius			
Debrecen, 1928. II. 20.	346, 183, 163, 30, 45	—	
Garrulus glandarius			
Fűzfő, 1928. III. 27.	349, 170, 155, 35, 45	150	
Garrulus glandarius			
Diósjenő, 1928. III. 24.	325, 167, 138, 30, 42	—	
Garrulus glandarius			
Lébény, 1932. XII. 24.	—, —, —, —, —	175	
Garrulus glandarius			
Debrecen, 1934. I. 12.	350, 180 (180), 160, 25, 45	152	
Garrulus glandarius			
— 1934. IV. 14.	342, 184 (186), 155, 25, —	152	
Sturnus vulgaris			
Diósjenő, 1928. IV. 24.	224, 132, 71, 26, 35	77	
Sturnus vulgaris			
Diósjenő, 1928. IV. 24.	220, 134, 72, 25, 34	87	
Sturnus vulgaris			
Diósjenő, 1928. IV. 24.	220, 128, 71, 25, 35	84	
Sturnus vulgaris			
Diósjenő, 1928. IV. 24.	225, 134, 71, 26, 35	76	
Sturnus vulgaris			
Diósjenő, 1928. IV. 24.	224, 129, 70, 26, 34	74	
Sturnus vulgaris			
Lébény, 1933. VII. 3.	224, 130 (130), 68, 24, 30	65	
Sturnus vulgaris			
Lébény, 1933. VII. 3.	221, 125 (125), 65, 25, 30	66	
Sturnus vulgaris			
Lébény, 1933. VII. 3.	220, 128 (130), 67, 24, 25	61	
Sturnus vulgaris ♂			
Lébény, 1934. III. 14.	233, 130 (130), 69, 25, 30	80	Hegymeghy
Sturnus vulgaris ♀			
Lébény, 1934. III. 14.	223, 121 (122), 70, 25, 32	76	Hegymeghy
Pastor roseus ♀			
Fertőrákos, 1934. VI. 1.	225, 122 (124), 71, 17, 32	76	Hegymeghy
Coccothraustes c.			
Fűzfő, 1928. III. 27.	190, 105, 65, 20, 21	55	
Coccothraustes c.			
Diósjenő, 1928. IV. 24.	190, 108, 63, 20, 20	55	

	milliméter	gramm	
<i>Coccothraustes iuv.</i>			
Budapest, 1930. VII. 18.	180, 104, 56, 18, 20	48	
<i>Coccothraustes</i>			
Csibrák, 1931. II. 17.	181, 102, 60, 20, 21	39	
<i>Coccothraustes</i> ♀			
Budapest, 1933. XII. 2.	185, 100(102), 59, 20	52	
<i>Coccothraustes</i> ♂			
Budapest, 1936 IV. —	190, 105 (105), 57, 21, 25	58	
<i>Carduelis carduelis</i>			
Lébény, 1934. III. 30.	— — — —	16	Hegymeghy
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> ♀			
Leányfalu, 1928. III. 26.	167, 90, 68, 11, 21	35	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> ♀			
Leányfalu, 1928. III. 26.	163, 89, 69, 11, 20, —	30	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> ♂			
Budapest, 1928. III. 26.	175, 92, 73, 10, 20	—	
<i>Emberiza calandra</i>			
—, 1934. I.	195, 98 (98), 73, 13, 25	57	
<i>Emberiza calandra</i>			
Lébény, 1934. III. 30.	213, 104 (104), 82, 14, 27	58	Hegymeghy
<i>Emberiza calandra</i>			
Lébény, 1934. III. 30.	181, 92 (92), 76, 12, 28	44	Hegymeghy
<i>Emberiza citrinella</i>			
Diósjenő, 1928. IV. 25.	172, 95, 76, 11, 23	30	
<i>Emberiza citrinella</i>			
Diósjenő, 1928. IV. 25.	175, 90, 84, 11, 23	30	
<i>Emberiza schoeniclus</i> ♂			
Lébény, 1934. III. 30.	—, —, —, —, —	15	Hegymeghy
<i>Plectrophenax nivalis</i>			
Nyíregyháza, 1934. I. 9.	174, 103 (101), 75, 10, 21	27	
<i>Alauda arvensis</i> ♀			
Lébény, 1933. IV. 12.	180, 101 (102), 69, 11, 27	34	Hegymeghy
<i>Motacilla flava</i> ♂			
Lébény, 1934. IV. 17.	180, 81 (81), 76, 12, 26	17	Hegymeghy
<i>Motacilla flava</i> ♂			
Lébény, 1934. IV. 17	181, 81 (81), 81, 12, 24	16	Hegymeghy
<i>Motacilla flava</i> ♂			
Lébény, 1934. IV. 17.	168, 79 (80), 72, 11, 25	15	Hegymeghy
<i>Motacilla flava</i> ♂			
Szeged, 1934. V. 1.	160, 82 (82), 70, 12, 25	15	Hegymeghy
<i>Motacilla flava</i> ♂			
Békéscsaba, 1934. VII. 15.	165, 78 (78), 69, 10, 25	—	Hegymeghy

	milliméter	gramm	
<i>Motacilla flava</i> ♀ Zenta, 1934. VI. 6.	153, 74 (75), 61, 13, 25	15	Hegymeghy
<i>Motacilla cinerea</i> ♀ Pécsvárad, 1934. print.	190, — (81), 91, 14, —	15	Hegymeghy
<i>Motacilla alba</i> Paks, 1934. III. 16.	189, 90 (90), 91, 11, 25	19	Hegymeghy
<i>Motacilla alba</i> ♂ Márianosztra, 1934. III. 28.	197, 89 (90), 92, 13, 26	23	Hegymeghy
<i>Motacilla alba</i> ♂ Márianosztra, 1934. III. 21.	191, 86 (86), 86, 12, 25	23	Hegymeghy
<i>Motacilla alba</i> Szeged, 1934. IV. 28.	187, 83 (84), 87, 11, 23	21	Hegymeghy
<i>Motacilla alba</i> ♂ Békéscsaba, 1934. VII. 15.	195, 90 (90), 91, 14, 26	21	Hegymeghy
<i>Certhia familiaris</i> Diósjenő, 1928. III. 4.	124, 63, 61, 12, 17	8	
<i>Certhia familiaris</i> Diósjenő, 1928. III. 24.	124, 64, 61, 16, 16	8	
<i>Tichodroma muraria</i> ♂ Miskolc, 1933, XI. 29.	170, 97 (97), 56, 28, 24	—	
<i>Sitta europaea</i> ♂ Budapest, 1934. V. 9.	145, 88 (88), 47, 17, 22	19	Hegymeghy
<i>Parus maior</i> Mosonszentmiklós, 1932. X. 31.	145, 75 (76), 70, 12, 23	17	
<i>Parus maior</i> Rákosszentmihály, 1934. II. 6.	142, 74 (75), 64, 10, 20	16	Hegymeghy
<i>Parus ater</i> Diósjenő, 1928. III. 25.	113, 65, 50, 9, 19	9	
<i>Parus palustris</i> Diósjenő, 1928. III. 4.	120, 65, 56, 9, 17,	10	
<i>Parus palustris</i> Balatonrendes, 1928. III. 25.	121, 63, 56, 9, 15	10	
<i>Parus palustris</i> Balatonrendes, 1928. III. 25.	122, 66, 60, 9, —	11	
<i>Parus palustris</i> Diósjenő, 1928. III. 25.	120, 62, 53, 9, 16	10	
<i>Parus palustris</i> Diósjenő, 1928. III. 25.	120, 64, 56, 9, 18	10	

	milliméter	gramm	
<i>Parus palustris</i> Mosonszentmiklós, 1932. XI. 1.	—, 62 (63), —, 11, 21	10	
<i>Lanius excubitor</i> Csibrák, 1931. XII. 15.	253, 117 (115), 116, 17, 28	65	
<i>Lanius excubitor</i> ♀ Bártfa, 1933. IV. 1.	(duzzadt ovarium)		
<i>Lanius senator</i> ♀ Kistápé, 1933. VI. 21.	195, 95 (95), 82, 14, 12	34	
<i>Bombycilla garrulus</i> ♀ Diósgyőr, 1933. I. 21.	200, 120, 60, 12, 20		
<i>Turdus pilaris</i> Lébény, 1932. XII. 24.	—, —, —, —, —	99	
<i>Turdus ericetorum</i> ♀ W Csorna, 1933. III. 15.	221, 112 (112), 88, 17, 35	41	Hegymeghy
<i>Turdus ericetorum</i> ♂ Lébény, 1933. IV. 18.	(duzzadt herék)		Hegymeghy
<i>Turdus merula</i> ♂ Budapest, 1928. III. 3.	240, 126, 103, 21, 35	83	
<i>Turdus merula</i> ♀ Budapest, 1928. III. 6.	253, 127, 112, 21, 36	90	
<i>Turdus merula</i> iuv. Budapest, 1928. VI. 25.	162, 95, 49, 18, 36	—	
<i>Turdus merula</i> ♂ Budapest, 1930. III. 21.	260, 129, 116, 24, 32	79	Forgács
<i>Turdus merula</i> iuv. Budapest, 1930. VII. 28.	251, 123, 112, 20, 31	80	
<i>Turdus merula</i> ♂ Budapest, 1932. XI. 25.	249, 128 (129), 19, 36	86	
<i>Riparia riparia</i> (alb.) Balatonboglár 1930. III. 16.	123, 102, 53, 5, 9	7	
<i>Coracias garrulus</i> ♂ Mohács, 1933. IV. 25.	320, 200, 120, 27, 19	110	
<i>Picus viridis</i> Tóváros, 1928. IV. 17.	347, 163, 111, 40, 36	136	
<i>Picus canus</i> Bükszád, 1930. III.	319, 146, 105, 34, 28	119	
<i>Dryobates maior</i> Lébény, 1932. XII. 24.	—, —, —, —, —	77	
<i>Dryobates maior</i> Lébény, 1932. XII. 24.	—, —, —, —, —	78	

	milliméter	gramm	
Dryobates maior ♂ Mosonszentmiklós, 1933. III. 24.	246, 135 (134), 95, 28, 25	75	Hegymeghy
Dryobates minor Pécs, 1932. XII. 1.	140, 85 (86), 56, 12, 16	20	
Dryocopus martius ♀ Mohács, 1933. IV. 17.	460, 250, 185, 56, 32	300	Fekete K.
Jynx torquilla ♀ Budapest, 1933. V. 29.	—, —, —, —, —	37	
Cuculus canorus Káposztásmegyer, 1930. IX. 15.	336, 205, 166, 17, 24	110	
Asio flammeus Lébény, 1934. III. 27.	376, 292 (290), 153, 26, 45	322	Pátkai
Asio flammeus Debrecen, 1934. I. 12.	342, 297 (312), 147, 17, 46	296	
Asio otus Rákoskeresztur, 1934. I. 6.	350, 290 (290), 154, 25, 45	322	
Athene noctua Versec, 1928. IV. 24.	240, 171, 95, 16, 44	—	
Strix aluco Nagycsákány, 1928. XI. 6.	410, 287, 185, 22, 57	447	
Strix aluco ♀ Kisbödök, 1928. V. 15.	377, 281, 185, 19, 49	471	
Strix aluco ♀ Rácalmás, 1831. I. 19.	416, 297, 187, 21, 49	560	
Strix aluco ♀ Mohács, 1933. II. 26.	420, 312, 185, 22, 55	820	Fekete
Strix aluco ♂ Mohács, 1933. III. 2.	390, 300, 180, 18, 45	400	Fekete
Strix aluco ♂ Salgótárján, 1933. VI. 20.	420, 284 (283), 185, 17, —	348	
Falco peregrinus ♀ Cece, 1930. II. 24.	505, 366, 193, 24, 54	1157	
Falco cherrug ♀ Diósjenő, 1940. VI.	(4 hetes élő)	1030	
Falco vespertinus ♀ Mohács, 1933. IV. 22.	290, 265. —, 14, 43	130	Fekete

	milliméter	gramm	
Falco vespertinus ♂ Középhantos, 1933. V. 14.	285, 240 (241), 145, 17, 31	139	Hegymeghy
Falco vespertinus ♀ Ináncs, 1934. V. 18.	301, 240 (242), 137, 17, 31	197	Hegymeghy
Falco subbuteo Jászládány, 1928. IX. 3.	470, 345, 230, 16, 66	334	
Falco tinnunculus ♂ Nógrád, 1928. III. 4.	339, 250, 178, 18, 45	216	
Falco tinnunculus ♂ Csorna, 1933. III. 26.	335, 235 (238), 160, 14, 38	131	
Falco tinnunculus ♀ Mohács, 1933. IV. 27.	380, 275, 185, 14, 45	180	Fekete
Falco tinnunculus ♂ Mohács, 1933. V. 5.	330, 260, 170, 15, 45	170	Fekete
Aquila chrysaetus ♀ Báj (Szabolcs), 1928. XI. 19.	900, 635, 381, 42, 115	4800	
Aquila clanga 1930. IV.	703, 524, 290, 34, 105		
Aquila clanga iuv. Kistápé, 1931. V. 11.	695, 520, 265, 34, 97	1400	
Aquila clanga ♀ Mohács, 1933. IV. 13.	670, 520, 260, 30, 95	1820	Fekete
Aquila clanga Gyulavári, 1933. X. 20.	670, 500 (508), 280, 35, 100	—	
Aquila pomarina ♀ Tarpa, 1933. V. 25.	641, 485 (482), 257, 33, 91 (kettős petefészek)	1454	
Hieraetus pennatus ♀ Póka, 1928. V. 16.	553, 395, 231, 25, 71	1146	
Buteo rufinus ♀ 1927. XII. 2.	625, 482, 285, 34, 94	1760	
Buteo buteo Tóváros, 1928. II. 25.	535, 405, 225, —, 75	890	
Buteo buteo Szombathely, 1929. IX. 27.	550, 410, 240, 26, 75	935	
Buteo buteo ♂ —, 1932. XI.	533, 401, 248, 23, 75	795	Forgács

	milliméter	gramm	
<i>Buteo buteo</i> ♂			
—, 1932. XI.	520, 375 (370), 232, 21, 70	768	Forgács
<i>Buteo lagopus</i>			
Tóváros, 1928. II. 25.	522, 407, 212, —, 70	875	
<i>Buteo lagopus</i>			
Ajka, —	587, 455, 241, 24, 68	1031	
<i>Buteo lagopus</i> ♂			
Hortobágy, 1934. IV. 1.	545, 420 (421), 247, 30, 77	918	Hegymeghy
<i>Circus aeruginosus</i>			
Hortobágy, 1934. IV. 1.	549, 433 (433), 255, 26, 90	800	
<i>Circus aeruginosus</i>			
—, —	535, 405, 255, 25, 90	685	
<i>Circus cyaneus</i> ♀			
Fürged, 1928. II. 24.	535, 381, 260, 19, 75	540	
<i>Circus cyaneus</i> ♀			
Csibrák, 1931. XII. 9.	510, 355 (356), 246, 18, 74	467	
<i>Circus cyaneus</i> ♀			
Lébény, 1931. XII. 22.	515, 382 (380), 251, 18, 73	485	
<i>Circus cyaneus</i> ♀			
Lébény, 1933. XI. 3.	525, 360 (375), 254, 18, 68	426	
<i>Circus cyaneus</i> ♀			
Lébény, 1933. XI. 3.	480, 327 (330), 231, 15, 69	367	
<i>Circus cyaneus</i> ♀ ?			
Lébény, 1933. XI. 9.	525, 373, 272, 18, 74	444	
<i>Circus cyaneus</i> ♂ iuv.			
Lébény, 1933. XI. 9.	468, 334 (333), 238, 15, 67	368	
<i>Circus cyaneus</i> ♀			
Lébény, 1933. XI. 9.	528, 375 (376), 272, 18, 75	484	
<i>Circus cyaneus</i> ♀			
Lébény, 1933. XI. 9.	515, 364 (359), 264, 18, 73	450	
<i>Circus cyaneus</i> ♂ iuv.			
Lébény, 1933. XI. 9.	454, 318 (324), 225, 15, 66	346	
<i>Circus cyaneus</i>			
Lébény, 1934. II. 10.	510, 360 (363), 240, 18, 85	547	

	milliméter	gramm	
<i>Circus cyaneus</i> Lébény, 1934. II. 10.	540, 370 (370), 270, 19, 84	567	
<i>Circus cyaneus</i> Lébény, 1934. II. 10.	528, 378 (370), 252, 19, 82	617	
<i>Circus cyaneus</i> Lébény, 1934. II. 10.	525, 370 (365), 260, 18, 83	575	
<i>Circus cyaneus</i> Lébény, 1934. II. 10.	535, 373 (374), 267, 18, 83	562	
<i>Circus cyaneus</i> Lébény, 1934. II. 10.	515, 362, —, 252, 18, 83	592	
<i>Circus cyaneus</i> Lébény, 1934. II. 10.	521, 370 (378), 250, 19, 82	588	
<i>Circus cyaneus</i> ♀ Lébény, 1934. XII.	520, 372 (380), 270, 19, 73	571	Forgács
<i>Circus cyaneus</i> ♀ Lébény, 1934. III. 26.	505, 360 (358), 240, 26, 76	537	Pátkai
<i>Circus cyaneus</i> ♀ Lébény, 1934. III. 26.	478, 332 (330), 230, 20, 70	—	Pátkai
<i>Circus macrourus</i> ♂ Jászladány, 1928. IX. 3.	470, 345, 230, 16, 66	334	
<i>Circus macrourus</i> ♂ Kistápé, 1930. ?	460, 340 (343), 232, 16, 75	385	
<i>Circus pygargus</i> ♀ Lébény, 1933. VII. 11.	480, 384 (380), 262, 20, 64	319	
<i>Accipiter gentilis</i> ♂ Szomor, 1928. III. 23.	525, 307, —, 232, 21, 75	703	
<i>Accipiter gentilis</i> ♂ iuv. —, 1932. —	535, 303 (307), 255, 22, 75	672	
<i>Accipiter gentilis</i> ♂ Mohács, 1933. IV. 22.	530, 340, 250, 22, 80	700	Fekete
<i>Accipiter gentilis</i> ♂ Kistápé, 1933. IX. 5.	540, 320 (318), 253, 33, 83	780	Hegymeghy

	milliméter	gram m	
<i>Accipiter gentilis</i> ♀ Kenézlő, 1934. II. 6.	602, 330 (345), 285, 24, 80	1185	Forgács
<i>Accipiter gentilis</i> iuv. Kistápé, ? —	536, 315, 247, 22, 78	653	
<i>Accipiter gentilis</i> ♂ Győr, —	518, 312, 238, 22, 75	—	Forgács
<i>Accipiter nisus</i> ♀ Büdszentmihály, 1932. II. 16.	376, 230, 197, 14, 60	258	Forgács
<i>Accipiter nisus</i> Lébény, 1933. XI. 2.	325, 195 (197), 158, 12, 53	139	
<i>Accipiter nisus</i> ♀ Lébény, 1934. III. 14.	385, 234 (235), 187, 20, 67	221	Hegymeghy
<i>Accipiter nisus</i> —, 1934. III. .	382, 232 (228), 186, 13, 60	265	Forgács
<i>Accipiter nisus</i> Paks, —	375, 230, 184, 15, 67	—	
<i>Accipiter nisus</i> Pákozd ? —	390, 240, 190, —, 60		
<i>Pernis apivorus</i> ♀ Kenézlő, 1929. V. 20.	—, 400, —, 25, —		
<i>Pernis apivorus</i> ♀ Érsekcsanakád, 1932. VI. 29.	582, 405 (403), 275, 23, 47	699	
<i>Circaetus gallicus</i> ♀ Kelebia, 1928. V. 18.	730, 550, 315, 39, 95	1513	
<i>Circaetus gallicus</i> ♀ Vörs, 1932. VIII. 30.	698, 521, 306, 37, 87	1875	
<i>Pandion haliaetus</i> —, 1930. X. 18.	540, 440, 235, 32, 55		
<i>Pandion haliaetus</i> Kétútköz, 1928. IV. 25.	—, 483, 234, —, 60		
<i>Platalea leucorodia</i> Balatonlelle, —	880, 394, 136, 224, 149	1960	
<i>Ardea cinerea</i> Ábrahámhegy, 1931. IX. 28.	1010, 447, 170, 120, 162	1584	
<i>Ardea cinerea</i> —, —	—, 432 (420), 174, 112, 144	1437	

	milliméter	gramm
<i>Ardea cinerea</i>		
—, —	940, 435, 169, 108, 163	1310
<i>Egretta alba</i>		
Kisbalaton, 1934. VI. 13.	756, 329 (322), 124, 87, 135	608
<i>Ardeola ralloides</i>		
Ófehértó, 1929. V. 12.	514, 212, 72, 52, 64	240
<i>Nycticorax n.</i> ♀		
—, —	590, 295 (290), 115, 65, 78	475
<i>Nycticorax n.</i> ♀		
—, —	605, 288, 111, 73, 80	735
<i>Nycticorax n.</i> ♂		
—, —	630, 298, 119, 79, 75	668
<i>Nycticorax n.</i> ♂		
—, —	611, 305, 115, 75, 72	712
<i>Nycticorax n.</i> ♂ iuv.		
—, —	595, 283, 111, 72, —	592
<i>Nycticorax n.</i> ♀		
—, —	563, 285, 113, 70, 72	590
<i>Nycticorax n.</i> ♂ iuv.		
—, —	551, 280, 105, 80, —	458
<i>Nycticorax n.</i> iuv.		
—, —	582, 292, 108, 69, 79	670
<i>Nycticorax n.</i> iuv.		
—, —	574, 286, 107, 61, 75	501
<i>Nycticorax n.</i> iuv.		
—, —	560, —, 107, 63, 72	498
<i>Anser albifrons</i>		
—, —	755, 420 (427), 136, 52, 98	2645
<i>Anser fabalis</i> ♀		
Lébény, 1932. XI. 2.	695, 417 (415), 135, —, 70	2580
<i>Branta leucopsis</i>		
Gárdony, 1929. X. 17.	702, 415, 143, 35, 75	2250
<i>Branta ruficollis</i> ♂		
Hortobágy, 1933. III. 18.	582, 368, 138, 25, 48	1412
<i>Anas platyrhynchos</i> ♂		
Csibrák, 1932. II. 25.	595, 270, 105, 57, 45	1064
<i>Anas crecca</i> ♀		
Hortobágy, 1934. IV. 1.	358, 174 (176), 78, 33, 30	322

Warga

Forgács

Hegymeghy

	milliméter	gramm	
<i>Anas querquedula</i> ♂ Hercegfalva, 1928. IV. 18.	406, 193, 96, 41, 35	340	
<i>Spatula clypeata</i> ♂ Hercegfalva, 1928. IV. 18.	500, 254, 101, 63, 43	675	
<i>Somateria mollissima</i> iuv. Szabadegyháza, 1929. IX. 27.	612, 291, 94, 50, 51	1400	
<i>Oxyura leucocephala</i> iuv. Örkény, 1928. IX. 3.	413, 163, 100, 46, 39	607	
<i>Mergus merganser</i> Sonkád, 1931. XII. 22.	655, 279, 133, 53, 50	1458	
<i>Mergus serrator</i> ♀ Fürged, 1933. XI. 13.	515, 207 (206), 70, 51, 46	648	
<i>Phalacrocorax carbo</i> ♀ Mohács, 1933. X. 9.	800, 370, 156, 60, 55	1980	Fekete
<i>Phalacrocorax carbo</i> ♂ Gönyű, 1933. IV. 15.	—, —, —, —, —	2425	Keve
<i>Podiceps cristatus</i> ♀ Tolna, 1934. IV. 17.	550, —, (184), —, 46, 72	907	Hegymeghy
<i>Colymbus arcticus</i> Tiszaigar, 1932. XI. 2.	620, 270 (276), 95, —, —	908	Pátkai
<i>Columba palumbus</i> ♂ Mosonszentmiklós, 1933. III. 8.	415, 253 (256), 184, 22, 34	433	Hegymeghy
<i>Burhinus oedienemus</i> ♂ iuv. Gyótapuszta (Nagy- kanizsa), 1929. IX. 3.	430, 230, 125, 42, 78	464	
<i>Burhinus oedienemus</i> ♀ Mezőlak	401, 242, 121, 34, 71	426	
<i>Burhinus oedienemus</i> ♀ Sövényháza, 1934. VIII. 26.	415, — (240), 116, 35, 72	464	
<i>Burhinus oedienemus</i> ♂ Sövényháza, 1939. VI. 12.	422, 237 (238), 129, 40, 85	413	Hegymeghy
<i>Charadrius apricarius</i> (Nyírség?), 1934. XII. 23.	285, 187 (188), 78, 22, 44	245	
<i>Philomachus pugnax</i> ♀ Bócsa, 1928. V. 6.	257, 160, 65, 32, 48	103	
<i>Philomachus pugnax</i> ♀ Bócsa, 1928. V. 6.	250, 159, 63, 28, 45	113	
<i>Philomachus pugnax</i> ♀ Bócsa, 1928. V. 6.	251, 163, 62, 30, 45	95	

	milliméter	gramm
Philomachus pugnax ♀ Zsáka, 1934. VI. 10.	260, 146 (146), 57, 30, 43	97
Tringa erythropus ♂ Bócsa, 1928. V. 6.	—, 161, 80, 55, 59, —	
Tringa erythropus ♀? Hortobágy, 1934. VIII. 25.	359, 176 (175), 73, 66, 64	169
Tringa erythropus ♀ Szeged—Fehértó, 1937. IV. 16.	—, —, —, —, —, —,	161
Tringa erythropus ♂ Szeged—Fehértó, 1937. IV. 16.	—, —, —, —, —, —,	167
Tringa erythropus ♂ Szeged—Fehértó, 1937. VIII. 29.	—, —, —, —, —, —,	135
Tringa erythropus — Szeged—Fehértó, 1937. VIII. 29.	—, —, —, —, —, —,	125
Tringa erythropus ♂ Szeged—Fehértó, 1937. X. 4.	—, —, —, —, —, —,	156
Tringa erythropus ♀ Szeged—Fehértó, 1937. X. 4.	—, —, —, —, —, —,	169
Tringa erythropus ♂ Szeged—Fehértó, 1938. IX. 21.	—, —, —, —, —, —,	129
Tringa erythropus ♀ Szeged—Fehértó, 1938. IX. 21.	—, —, —, —, —, —,	143
Tringa erythropus ♀ Szeged—Fehértó, 1939. V. 5.	—, 165 (170), —, —, —	205
Tringa erythropus ♀ Szeged—Fehértó, 1939. V. 5.	—, 174 (177), —, —, —	192
Tringa erythropus ♀ Szeged—Fehértó, 1939. V. 5.	—, 166 (166), —, —, —	166
Tringa erythropus ♂ Szeged—Fehértó, 1939. VIII. 13.	—, 165, —, —, — —,	142

	milliméter	gramm
Tringa erythropus ♂ Szeged—Fehértó, 1939. IX. 24.	—, 151, —, —, —	153
Tringa erythropus ♀ Szeged—Fehértó, 1936. IV. 5.	—, 170 (172), —, —, —	160
Tringa erythropus ♀ Szeged—Fehértó, 1938. IX. 25.	—, —, —, —, —	148
Tringa erythropus ♂ Szeged—Fehértó, 1938. III. 25.	—, —, —, —, —	134
Tringa erythropus — Szeged—Fehértó, 1938. III. 25.	—, —, —, —, —	148
Tringa totanus ♀ Nyíregyháza, 1934. IV. 14.	295, 161 (162), 69, 44, 54	148
Tringa totanus ♂ Dinnyés, 1937. III. 20.	—, —, —, —, —	108
Tringa totanus ♀ Szeged—Fehértó, 1938. IX. 21.	—, —, —, —, —	129
Tringa stagnatilis ♀ Fehértemplom, 1938. IV. 19.	255, 135 (139), 60, 41, 55	63
Tringa stagnatilis ♂ Fehértemplom, 1938. IV. 24.	253, 135, 60, 42, 57	68
Tringa stagnatilis ♀ Fehértemplom, 1938. V. 1.	255, 139 (140), 60, 41, 49	75
Tringa stagnatilis ♂ Fehértemplom, 1939. IV. 19.	—, 137 (142), —, —, —	67
Tringa stagnatilis — Fehértemplom, 1939. IV. 23.	—, 135 (140), —, —, —	52
Tringa stagnatilis ♀ Fehértemplom, 1939. IV. 23.	—, 134 (137), —, —, —	70
Tringa stagnatilis ♀ Sárszentágota, 1939. IV. 30.	255, 142 (141), 62, 37, 52	80

	milliméter	gramm
<i>Tringa stagnatilis</i> — Szeged—Fehértó, 1939. VIII. 6.	254, 138 (140), 58, 41, 50	72
<i>Tringa stagnatilis</i> ♂ Szeged—Fehértó, 1939. VIII. 15.	255, 134 (136), 63, 40, 53	73
<i>Tringa stagnatilis</i> — Fehértemplom, 1939. IV. 19.	255, 137 (142), 59, 40, 54	67
<i>Tringa stagnatilis</i> — Fehértemplom, 1939. IV. 19.	258, 135 (140), 65, 42, 55	52
<i>Tringa stagnatilis</i> ♀ Fehértemplom, 1939. IV. 19.	254, 134 (137), 60, 40, 55	70
<i>Tringa nebularia</i> — Nagykanizsa, 1929. IX. 25.	340, 186, 79, 53, 57	153
<i>Tringa nebularia</i> ♂ Zenta, 1936. VIII. 25.	—, —, —, —, —	184
<i>Tringa nebularia</i> — Zenta, 1936. VIII. 25.	—, —, —, —, —	161
<i>Tringa nebularia</i> — Szeged—Fehértó, 1937. VIII. 22.	—, —, —, —, —	154
<i>Tringa nebularia</i> — Szeged—Fehértó, 1937. VIII. 29.	—, —, —, —, —	197
<i>Tringa nebularia</i> — Szeged—Fehértó, 1937. X. 1.	—, —, —, —, —	189
<i>Tringa nebularia</i> — Szeged—Fehértó, 1937. X. 1.	—, —, —, —, —	196
<i>Tringa nebularia</i> — Szeged—Fehértó, 1937. X. 4.	—, —, —, —, —	151
<i>Tringa nebularia</i> ♂ Szeged—Fehértó, 1938. IX. 4.	—, —, —, —, —	193

	milliméter	gramm
<i>Tringa nebularia</i> ♂ Szeged—Fehértó, 1938. IX. 25.	—, —, —, —, —	169
<i>Tringa nebularia</i> ♀ Szeged—Fehértó, 1938. IX. 25.	—, —, —, —, —	245
<i>Tringa nebularia</i> — Szeged—Fehértó, 1939. VIII. 31.	—, 185 (185), —, —, —	202
<i>Tringa nebularia</i> ♂ Szeged—Fehértó, 1939. VIII. 31.	—, 176, —, —, —	173
<i>Tringa nebularia</i> ♂ Szeged—Fehértó, 1936. IV. 30.	—, 177 (183), —, —, —	159
<i>Tringa nebularia</i> ♂ Szeged—Fehértó, 1936. IV. 30.	—, —, —, —, —	171
<i>Tringa glareola</i> ♀ Űrbő, 1938. VI. 21.	—, —, —, —, —	92
<i>Tringa glareola</i> — Sárszentágota, 1938. VIII. 31.	—, —, —, —, —	81
<i>Tringa glareola</i> ♀ Sárszentágota, 1938. IX. 9.	—, —, —, —, —	83
<i>Tringa glareola</i> — Sárszentágota, 1938. IX. 9.	—, —, —, —, —	83
<i>Tringa glareola</i> — Sárszentágota, 1938. IX. 9.	—, —, —, —, —	85
<i>Tringa glareola</i> ♂ Szeged—Fehértó, 1939. VI. 25.	—, 125 (128), —, —, —	79
<i>Phalaropus fulicarius</i> Mohács, 1931. X. 18.	222, 130 (135), 75, 24, 22	37
<i>Himantopus himantopus</i> ♂ Bócsa, 1928. V. 6.	375, 251, 99, 66, 138	182
<i>Numenius arquatus</i> ♀ Nyíregyháza, 1928. X. 7.	—, 275, 120, 128, 80	—
<i>Numenius arquatus</i> ♂ Nyíregyháza, 1933. III. 30.	579, 289 (295), 146, 130, 91	789

	milliméter	gramm	
Numenius arquatus ♂ Dab, 1933. IV. 5.	555, 310 (306), 130, 122, 91	947	
Numerius arquatus ♂ Debrecen, 1934. IX.	530, 300 (300), 110, 115, 80	670	
Numenius arquatus ♀ Lébény, 1933. III. 24.	605, 310 (313), 131, 152, 92	791	Hegymeghy
Numenius arquatus Szanád, 1933. VIII. 19.	605, 270 (270), 120, 159, 96	850	
Numenius arquatus Szanád, 1933. VIII. 19.	560, 305 (306), 117, 128, —	640	
Numenius arquatus iuv. Lébény, 1934. IX. 7.	—, —, —, —, —	670	
Numenius arquatus ♀ Lébény, 1934. V. 24.	600, 300 (307), 133, 147, 88	731	
Scolopax rusticola ♀ Gyarmat, 1928. IV. 16.	—, 195, —, 78, 42, —		
Scolopax rusticola — Budapest, 1930. XI. 23.	350, 186, 83, 71, 35	270	
Lymnocryptes minimus ♀ Nyíregyháza, 1934. IV. 14.	202, 109 (110), 39, 41, 26	48	Hegymeghy
Chlidonias nigra ♀ Tokaj, 1934. VI. 10.	262, 211 (213), 85, 29, 16	55	
Chlidonias nigra ♂ Tokaj, 1934. VI. 10.	261, 212 (211), 86, 28, 17	56	
Chlidonias nigra ♂ Tokaj, 1934. VI. 10.	262, 218 (220), 84, 28, 17	60	
Chlidonias nigra ♂ Tokaj, 1934. VI. 10.	260, 205 (209), 81, 28, 17	57	
Chlidonias nigra — Tokaj, 1934. VI. 10.	260, 208 (210), 80, 26, 16	53	
Larus ridibundus — Ábrahámhegy, 1932. XI. 29.	—, 315 (315), 130, 35, 47	305	

	milliméter	gramm
Otis tarda ♂ iuv.		
Lébény, 1932. V. 2.	916, —, (555), —, 46, 165	5550
Otis tarda ♂ iuv.		
Ódalmánd, 1933. XII. 21.	970, 550 (558), 275, 48, 150	4080
Otis tarda ♂ iuv.		
Lébény, 1934. XI. 7.	912, 552 (552), 250, 38, 160	5136
Otis tetrax ♀		
Áldófalva, 1921. XII. 15.	430, 260, 115, 25, 64	—
Otis tetrax —		
Bácsalmás, 1930. X. 20.	444, 249, 116, 23, 66	725
Porzana porzana ♀		
—, —	230, 117 (120), 50, 19, 35	82
Porzana parva ♂		
Budzsák, 1933. VIII. 20.	105 (104), 55, 18, 36	40
Gallinula chloropus ♀		
—, —	320, 160, 80, 24, 45	206
Tetrastes bonasia		
Bükszád, 1930. III.	380, 181, 127, 15, 45	394
Phasianus colchicus ♂ iuv.		
Lébény, 1932. XI. 2.	—, —, —, —, —	736

Measurements of Hungarian Birds

By † *Dr. Miklós Vasvári**

I have always precisely taken the measurements of all birds that have been regularly sent to the Ornithological Institute and encouraged my cooperators too, to do so when skinning the birds. A part of these notes is listed below. Where measurements were not taken by the author himself, the cooperator's name is recorded as well. The succession of the measurements is as follows: full length of body, wing (if both wings were measured, that of the left wing is put in brackets), tail, bill, leg (tarsus); weight, note.

*The late *Miklós Vasvári* left but comparatively few notes. Among those found after his early death there are, however, quite a number recording measurements of the great number of birds he measured. These notes were often written on narrow strips of paper or even sometimes on the margin of torn-off newspaper. As there are many weight-records to be found among those notes that are rather scarce in literature and are getting more and more valuable for recent scientific work, it has been found necessary to compile and publish them. Moreover they include many valuable faunistic data.

(*Keve*)