

A Magyarországon előforduló Microlepidoptera fajok névjegyzéke, 2024

Checklist of the Microlepidoptera species occurring in Hungary, 2024 (Lepidoptera)

Buschmann Ferenc & Pastorális Gábor

Abstract. The authors, revised, and updated a new checklist of Microlepidoptera, with comprehensive, checked references. So far, a total of 2.339 species have been identified from the country's geographical area. The book provides a detailed analysis of species of uncertain occurrence. In addition to a critical literature review, the authors have examined Hungary's major Lepidoptera collections. Several specialist experts engaged in the work.

Keywords. Lepidoptera, Microlepidoptera, checklist, notes, faunistic, references, Hungary

Citation. Buschmann F. & Pastorális G. 2024: A Magyarországon előforduló Microlepidoptera fajok névjegyzéke, 2024 | Checklist of the Microlepidoptera species occurring in Hungary, 2024 (Lepidoptera). – e-Acta Naturalia Pannonica 26: 1–195.

Author's addresses.

Buschmann Ferenc | 5100 Jászberény, Apponyi tér 2., I/1., Hungary | e-mail: busman.ferenc@gmail.com
Pastorális Gábor | Košická 22/39, 94501 Komárno, Slovakia | e-mail: pastoralisg@gmail.com

Summary. This checklist is an updated version of the Hungarian checklist of micro-moth species published in 2018. The new checklist is based on the latest faunistic and taxonomic research. Literature sources are given with exact numbers after the species' names. A Hungarian name is also suggested for each species. Only species identified by experts have been included in the checklist. We have added numbered comments at the end of the checklist for uncertain, mostly doubtful species. So far, a total of 2.339 species have been confirmed in Hungary. Our work is a faunistic report, the primary aim of which is to provide information on the number of moth species recorded in Hungary, from the beginning of the last century to the present. The structure of the list follows the previous versions. Unfortunately, the unclear occurrence of some species persists. Especially those that have been published in various foreign literature. Most of these are older records, where it is unclear whether the locality "Hungarian" refers to the former so-called historical Hungary or the present territory of the country as delineated in Trianon after 1920. After the species list, there is a separate chapter with notes on some of the families, genera, or species highlighted. These are of an occurrence or taxonomic nature. Also listed are species that, although published in Hungarian or foreign literature as occurring in Hungary, have been omitted from this list for assorted reasons until new data or specimens are available. This checklist was closed on December 31 2024.

Zusammenfassung. Diese Checkliste ist eine aktualisierte Version der 2018 veröffentlichten ungarischen Checkliste der Mikromottenarten. Die neue Checkliste basiert auf den neuesten faunistischen und taxonomischen Forschungen. Die Literaturquellen sind mit genauen Nummern hinter den Artnamen angegeben. Für jede Art wird auch ein ungarischer Name vorgeschlagen. Nur von Experten eindeutig identifizierte Arten wurden in die Checkliste aufgenommen. Für unsichere, meist zweifelhafte Arten haben wir nummerierte Kommentare am Ende der Checkliste hinzugefügt. Bisher wurden in Ungarn insgesamt 2.339 Arten

nachgewiesen. Bei unserer Arbeit handelt es sich um einen faunistischen Bericht, dessen Hauptziel es ist, Informationen über die Anzahl der in Ungarn nachgewiesenen Nachtfalterarten vom Beginn des letzten Jahrhunderts bis zur Gegenwart zu liefern. Der Aufbau der Liste folgt den früheren Versionen. Leider ist das Vorkommen einiger Arten nach wie vor unklar. Dies gilt insbesondere für die Arten, die in der ausländischen Literatur veröffentlicht wurden. Bei den meisten handelt es sich um ältere Aufzeichnungen, bei denen unklar ist, ob sich die Ortsangabe "ungarisch" auf das ehemalige so genannte historische Ungarn oder auf das heutige, nach 1920 in Trianon festgelegte Staatsgebiet bezieht. Nach der Artenliste gibt es ein separates Kapitel mit Anmerkungen zu einigen der hervorgehobenen Familien, Gattungen oder Arten. Dabei handelt es sich um Hinweise zum Vorkommen oder zur Taxonomie. Ebenfalls aufgeführt sind Arten, die zwar in der ungarischen oder ausländischen Literatur als in Ungarn vorkommend publiziert wurden, aber aus verschiedenen Gründen von dieser Liste ausgenommen wurden, bis neue Daten oder Exemplare verfügbar sind. Dieses Register wurde Anfang Dezember 31 2024 geschlossen.

Résumé. Cette liste est une version mise à jour de la liste hongroise des espèces de micro-mites publiée en 2018. La nouvelle liste est basée sur les dernières recherches faunistiques et taxonomiques. Les sources bibliographiques sont indiquées avec les numéros exacts après les noms des espèces. Un nom hongrois est également proposé pour chaque espèce. Seules les espèces clairement identifiées par les experts ont été incluses dans la liste. Pour les espèces incertaines, le plus souvent douteuses, nous avons ajouté des commentaires numérotés à la fin de la liste. Jusqu'à présent, un total de 2.339 espèces a été confirmé en Hongrie. Notre travail est un rapport faunistique dont l'objectif principal est de fournir des informations sur le nombre d'espèces de papillons de nuit recensées en Hongrie, du début du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. La structure de la liste suit les versions précédentes. Malheureusement, certaines espèces ne sont toujours pas clairement identifiées. En particulier celles qui ont été publiées dans divers ouvrages étrangers. Il s'agit pour la plupart d'anciennes mentions, où l'on ne sait pas si la localité "hongroise" se réfère à l'ancienne Hongrie dite historique ou au territoire actuel du pays tel qu'il a été délimité à Trianon après 1920. Après la liste des espèces, un chapitre séparé contient des notes sur certaines familles, certains genres ou certaines espèces mis en évidence. Il s'agit de notes relatives à l'occurrence ou à la taxonomie. On y trouve également des espèces qui, bien que publiées dans la littérature hongroise ou étrangère comme étant présentes en Hongrie, ont été omises de cette liste pour diverses raisons jusqu'à ce que de nouvelles données ou de nouveaux spécimens soient disponibles. Ce registre a été clôturé au début de Décembre 31 2024.

Bevezetés – Introduction

Ez a névjegyzék a legutóbbi, Magyarországon előforduló molylepke-fajok (Pastoralis & Buschmann 2018) frissített változata, amelynek megjelenése óta a külföldi szakirodalmakból tudomást szereztünk több jelentős taxonómiai, rendszertani és nevezéktani változásról, továbbá a különféle hazai közleményekben ismertetett, faunánkra új vagy bizonyos okok miatt helyesbített illetve törölt fajokról. Ezek következtében az említett lista több szempontból is elvesztette aktualitását, ezért szükségesnek látjuk jelen összefoglaló munka keretében e változások megjelentetését a hazai és külföldi lepidopterológusok számára.

Munkánk alapján véve egy faunisztikai kimutatás, melynek elsődleges célja az, hogy az érdeklődőknek tájékoztatást nyújtson arról, Magyarországon hány molylepke faj előfordulása van bizonyítottan nyilvántartva, nagyjából a múlt század elejétől napjainkig, a lista lezárásának időpontjáig. Ez a szám 2024. december 31-ig 2.339. A névjegyzék szerkezeti formája alapján követi az előző változatokat. Az egyes családok jelenlegi, itt követett sorrendjénél a legutóbbi szlovák (Pastoralis 2022) és cseh (Laštůvka et al. 2023) fajlistákat vettük alapul, de a Lepiforum.de weboldal családrendszere is fontos útmutatás volt számunkra. A családokon belül a nemek és fajok felsorolása a legújabb nemzetközi faunisztikai és taxonómiai kutatásokon alapul, a könnyebb tájékozódás és gyakorlati használhatóság érdekében azonban igyekeztünk az előző listával összhangban meghagyni. A fajok neve után – a teljesség igénye nélkül – fel van tüntetve néhány – vagy legalább egy(!) – irodalmi forrás, amely az utóbbi évtizedekben a faj előfordulását közölte

Magyarország területéről. Ezek közül főleg azok lettek figyelembe véve, ahol az adott fajnál a szerzők a lelőhelycédulák konkrét adatait is közölték. A közönséges és az ország egész területén elterjedt, illetve kártevőként számon tartott s olykor tömegesen előforduló fajoknál természetesen nem vettünk (vehettünk) figyelembe minden publikált adatot.

Sajnos továbbra is fennáll néhány faj tisztázatlan előfordulása. Főleg olyanoké, amelyek különböző külföldi szakirodalomban voltak publikálva. Többnyire régebbi adatokról van szó, melyeknél nem egyértelmű, s nem tisztázható, hogy a „Hungary” helyhatározás a történelmi Magyarországot jelenti-e, vagy az ország 1920 utáni, jelenkori területét.

A fajok jegyzéke után külön fejezetben megjegyzések találhatók néhány kiemelt családhoz, egyes nemekhez vagy fajhoz. Ezek főleg előfordulási vagy taxonómiai jellegűek. Fel vannak sorolva továbbá azok a fajok, melyek bár voltak az általunk ismert, illetve elérhető hazai vagy külföldi szakirodalomban publikálva, mint Magyarországon (is) előforduló fajok, de itt a névjegyzékből különböző okokból újabb adat vagy példány előkerüléséig ki lettek hagyva.

A listában csak olyan szinonim neveket tüntetünk fel, amelyek valamely hazai periodikában az eltelt évtizedekben megjelent. Az egyes fajok magyar nevei a Gozmány (1968) magyar neveit követő Szabóky et al. (2002) listából vannak átvéve, amelyek közül néhány indokoltan meg lett változtatva (Pastorális 2012, Pastorális et al. 2016, Pastorális & Buschmann 2018, Buschmann 2022a) és kiegészítve az újabban előkerült molylepke fajok magyar neveivel.

Megjegyzések és rövidítések – Notes and abbreviations:

– a magyar név utáni szám az irodalmi forrás sorszáma, melyben a faj magyarországi előfordulása említésre került.

– a [00] szögletes zárójelbe tett irodalmi forrás téves információt vagy adatot közöl.

– *¹ a csillaggal és számmal jelölt családokhoz, nemekhez és fajokhoz a névjegyzék után megjegyzés van fűzve.

V – Magyarország területén védett faj.

FV – Magyarország területén fokozottan védett faj.

RM – rendszeres migráns, vándor.

E – egyedi lelet, távol a faj rendszeres előfordulásának területétől.

Am – adventív, az utóbbi néhány évtizedben behurcolt és megtelepedett faj.

Inv – invazív megtelepedett faj.

Szn – synantrop vagy részben synantrop faj, melynek a fennmaradása a temperált környezettől függő (lakás, raktár, üvegház stb.), a szabadban nem képes áttelelni.

INT^{1,2},... – az interneten található forrás konkrét magyar vonatkozású adatokat, ill. fotókat közöl a fajhoz. Az egyes források jegyzéke az irodalmak után a lista legvégén található.

erroneous – hibás, téves.

incorrectly used name – helytelenül használt név

name wrongly used – hibásan használt név

misidentification – téves határozás

A családok jegyzéke az észlelt fajok számával

Micropterigidae 4. o.	7	Alucitidae 31. o.	7
Eriocraniidae 5. o.	5	Pterophoridae 31. o.	61
Hepialidae 5. o.	7	Schreckensteiniidae 34. o.	1
Nepticulidae 6. o.	119	Epermeniidae 35. o.	11
Opostegidae 10. o.	4	Tortricidae 35. o.	472
Prodoxidae 10. o.	5	Autostichidae 58. o.	12
Incurvariidae 10. o.	7	Lecithoceridae 59. o.	2
Heliozelidae 11. o.	7	Oecophoridae 59. o.	40
Adelidae 11. o.	28	Depressariidae 61. o.	88
Tischeriidae 12. o.	8	Cosmopterigidae 65. o.	23
Meessiidae 13. o.	2	Gelechiidae 66. o.	268
Psychidae 13. o.	41	Elachistidae 77. o.	88
Tineidae 15. o.	66	Coleophoridae 80. o.	216
Yponomeutidae 19. o.	21	Batrachedridae 87. o.	5
Argyresthiidae 20. o.	22	Scythrididae 88. o.	33
Plutellidae 21. o.	8	Blastobasidae 89. o.	7
Glyphipterigidae 21. o.	18	Stathmopodidae 89. o.	1
Ypsolophidae 22. o.	21	Momphidae 89. o.	16
Praydidae 23. o.	4	Pterolonchidae 90. o.	1
Heliodinidae 23. o.	1	Lypusidae 90. o.	9
Bedelliidae 23. o.	2	Limacodidae 90. o.	3
Scythropiidae 23. o.	1	Zygaenidae 91. o.	26
Lyonetiidae 23. o.	14	Brachodidae 92. o.	2
Roeslerstammiidae 24. o.	2	Cossidae 92. o.	7
Bucculatricidae 24. o.	23	Castniidae 93. o.	1
Gracillariidae 25. o.	129	Sesiidae 93. o.	47
Douglasiidae 30. o.	5	Thyrididae 95. o.	1
Choreutidae 30. o.	9	Pyralidae 95. o.	132
Urodidae 31. o.	1	Crambidae 102. o.	170
Carposinidae 31. o.	2	Összesen:	2339

A családok, nemek és fajok jegyzéke
Checklist of families, genera and species

Micropterigoidea

Micropterigidae – Aranyszárnyú-ősmolyfélék

Micropterix Hübner, 1825

mansuetella Zeller, 1844 – feketefejű ősmoly – 6, 119

aruncella (Scopoli, 1763) – ezüstfoltos ősmoly – 6, 15, 22, 45, 52, 78, 119, 142, 167, 178, 189, 197, 235, 386

aureatella (Scopoli, 1763) – aranyszárnyú ősmoly – 6, 15, 119, 167, 297, 396

- = *ammanella* Hübner, 1813 – 13
schaefferi Heath, 1975 – ibolyás ősmoly – 29, 68
 = *anderschella* Herrich-Schäffer, 1855 – 26, 31, 68
calthella (Linnaeus, 1761) – törpe ősmoly – 6, 22, 36, 51, 70, 78, 126, 142, 167, 178, 189, 197, 235, 294, 385, 386, 396
myrtetella Zeller, 1850 – apró ősmoly – 6, 31, 36, 51, 52, 134, 167, 178, 189, 235, 280, 294, 297, 385, 396
tunbergella (Fabricius, 1787) – vöröses ősmoly – 31, 45, 52, 78, 142, 167, 178, 197, 280, 297, 310, 321, 386, 396
 = *thunbergella* auct. – 6, 22

E r i o c r a n i o i d e a

Eriocraniidae – Ősmolyfélék

Dyseriocrania Spuler, 1910

- subpurpurella* (Haworth, 1828) – tölgyaknázó ősmoly – 6, 22, 35, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 99, 119, 122, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396
 = *fastuosella* (Zeller, 1839) – 6

Heringocrania Kuznetzov, 1941

- unimaculella* (Zetterstedt, 1839) – egyfoltos ősmoly – 340

Eriocrania Zeller, 1851

- sparmannella* (Bosc, 1791) – nyíraknázó ősmoly – 6, 13, 15, 25, 32, 35, 51, 59, 77, 119, 122, 142, 178, 235, 294, 385, 386, 396
semipurpurella (Stephens, 1835) – nyírlakó ősmoly – 142, 146, 324, 396
cicatricella (Zetterstedt, 1839) – aranyárga ősmoly – 324

H e p i a l o i d e a

Hepialidae – Gyökérrágó őslépkék

Triodia Hübner, 1820

- sylvina* (Linnaeus, 1761) – kis gyökérrágólepke – 6, 13, 15, 17, 22, 23, 36, 42, 45, 51, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
amasinus (Herrich-Schäffer, [1851])*¹ – balkáni gyökérrágólepke – 27a, 177, 189 – V (10 000 Ft)

Korscheltellus Börner, 1920

- lupulina* (Linnaeus, 1758) – keleti gyökérrágólepke – 6, 13, 15, 41, 51, 53, 69, 119, 167, 174, 189, 197, 263, 294, 385, 396
fusconebulosa (De Geer, 1778) – északi gyökérrágólepke – 15, 68, 119 – V (10 000 Ft)

Pharmacis Hübner, 1820

- carna* ([Denis & Schiffmüller], 1775)*² – pirosas gyökérrágólepke – 43

Phymatopus Wallengren, 1869

- hecta* (Linnaeus, 1758) – aranyló gyökérrágólepke – 6, 15, 36, 45, 53, 78, 119, 142, 167, 189, 197, 235, 294, 297, 385, 386, 396

Hepialus Fabricius, 1775

- humuli* (Linnaeus, 1758) – nagy gyökérrágólepke – 6, 36, 51, 77, 99, 167, 178, 189, 235, 260, 262, 263, 294, 333, 385, 387, 396

N e p t i c u l o i d e a

Nepticulidae – Törpemolyfélék*³

Nepticulinae – Nepticulini

Enteucha Meyrick, 1915

acetosae (Stainton, 1854) – mezeisóska-törpemoly – 151

Simplimorpha Scoble, 1983

promissa (Staudinger, 1871) – cserszömörce-törpemoly – 6, 14, 16, 25, 33, 35, 36, 49, 50, 51, 189, 235, 294, 385, 396, 421

Stigmella Schrank, 1802

freyella (Heyden, 1858) – szulákrágó törpemoly – 6, 14, 25, 34, 35, 49, 50, 51, 77, 184, 294, 385, 396

prunetorum (Stainton, 1855) – kőkenyes törpemoly – 6, 14, 16, 20, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 64, 77, 189, 235, 294, 385, 396

aceris (Frey, 1857) – juharaknázó törpemoly – 6, 14, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 60, 64, 77, 189, 235, 274, 294, 307, 385, 396, 442

= *szoecsi* Klimesch, 1956 – 6, 14, 35

ulmiphaga (Preissecker, 1942) – szilaknázó törpemoly – 20, 34, 35, 47, 49, 294, 385

ulmivora (Fologne, 1860) – ezüstsávós törpemoly – 6, 14, 25, 33, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 64, 77, 184, 189, 235, 294, 385, 386, 396

= *ulmifoliae* (Hering, 1931) – 6, 14, 33, 35, 36

= *ulmicola* (Hering, 1932) – 6, 14, 25, 33, 35, 36, 51

viscerella (Stainton, 1853) – szillevél-törpemoly – 6, 14, 33, 35, 36, 49, 50, 189, 235, 294, 385

naturcella (Klimesch, 1936) – szőrösnyír-törpemoly – 20, 25, 26, 35, 51, 386, 396

tiliae (Frey, 1856) – hársaknázó törpemoly – 6, 14, 16, 20, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 52, 60, 178, 189, 235, 280, 294, 297, 385, 396

alnetella (Stainton, 1856) – mézgáséger-törpemoly – 6, 34, 35, 36, 39, 64, 77, 189, 235, 386

betulicola (Stainton, 1856) – nyíraknázó törpemoly – 6, 14, 32, 35, 49, 50, 64, 294, 385

glutinosae (Stainton, 1858) – égeraknázó törpemoly – 6, 19, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 77, 189, 235, 386, 387

= *rubescens* (Heinemann, 1871) – 6, 14

luteella (Stainton, 1857) – sárgasávú törpemoly – 6, 14, 25, 32, 35, 50, 51, 60, 64, 294, 385, 396

microtheriella (Stainton, 1854) – mogyorós törpemoly – 6, 14, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 60, 64, 77, 184, 189, 235, 294, 385, 396

nivenburgensis (Preissecker, 1942) – fehérfűz-törpemoly – 34, 35, 36, 47, 49, 184, 189, 235

sakhalinella Puplensis, 1984 – nyírlevél-törpemoly – 294, 385, 396

= *distinguenda* auct., nec Heinemann, 1862 – 6, 14, 20, 25, 35, 50, 51

cathartica (Stainton, 1853) – bengeaknázó törpemoly – 6, 14, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 40, 49, 50, 51, 64, 77, 189, 235, 294, 385, 396

rhamnella (Herrich-Schäffer, 1860) – varjútövis-törpemoly – 6, 14, 16, 32, 33, 35, 36, 49, 189, 235

rolandi van Nieukerken, 1990 – jajrózsalevél-törpemoly – 243, 396

= *spinosissimae* auct., sensu Klimesch, 1951 – 6, 14, 25, 32, 35, 39, 49, 51,

sanguisorbae (Wocke, 1865) – vérfűrágó törpemoly – 6, 14, 35, 50, 64, 77, 294, 385, 387

thuringiaca (Petty, 1904) – türengiai törpemoly – 6, 14, 20, 25, 35, 49, 50, 51, 77, 294, 310, 385, 396

confusella (Wood & Walsingham, 1894) – ködössávú törpemoly – 6, 20, 25, 35, 51, 396

malella (Stainton, 1854) – almalevél-törpemoly – 6, 14, 20, 25, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 184, 189, 235, 294, 385, 386, 396, 421

assimilella (Zeller, 1848) – nyáaraknázó törpemoly – 6, 14, 32, 35, 39, 49, 50, 64, 294, 385

benanderella (Wolff, 1955) – cinegefűz-törpemoly – 20, 26, 35, 49,

obliquella (Heinemann, 1862) – fűzfalevél-törpemoly – 6, 14, 35, 36, 39, 49, 184, 189, 235, 387, 396

salicis (Stainton, 1854) – fűzaknázó törpemoly – 6, 14, 20, 32, 35, 36, 39, 49, 50, 60, 77, 184, 189, 235, 294, 385

- trimaculella* (Haworth, 1828) – hárompettyes törpemoly – 6, 14, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 64, 77, 184, 189, 235, 294, 385, 387
- vimineticola* (Frey, 1856) – kosárfonófüz-törpemoly – 6, 14, 25, 35, 49, 51, 64, 77
- anomalella* (Goeze, 1783) – vadrózsalevél-törpemoly – 6, 14, 16, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 189, 235, 294, 333, 385
 = *aeneella* (Heinemann, 1862) – 6, 14, 33, 35, 36
 = *fletcheri* (Tutt, 1899) – 6, 14, 35, 36
 = *zermattensis* Weber, 1936 – 35
- centifoliella* (Zeller, 1848) – rózsaknázó törpemoly – 6, 14, 32, 35, 36, 50, 189, 235, 294, 385
- hybnerella* (Hübner, 1796) – galagonya-törpemoly – 6, 14, 32, 35, 36, 49, 50, 51, 64, 184, 189, 235, 294, 310, 385, 396
 = *ignobilella* (Stainton, 1849) – 6, 32, 33, 35, 36
- mespilicola* (Frey, 1856) – aranyzöld törpemoly – 20, 35, 50, 189, 235, 294, 385
 = *ariella* (Herrich-Schäffer, 1860) – 6, 14, 16, 33, 35, 36, 49, 184
- paradoxa* (Frey, 1858) – ibolyatövű törpemoly – 49, 50, 64, 77, 184, 189, 235, 294, 310, 385, 396
 = *nitidella* (Heinemann, 1862) – 6, 14, 20, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 51
- incognitella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – almaaknázó törpemoly – 189, 235, 294, 385
 = *pomella* (Vaughan, 1858) – 6, 16, 20, 33, 35, 36, 39, 49, 50
 = *mali* (Hering, 1932) – 6, 33, [35], 36, 189
- perpygmaeella* (Doubleday, 1859) – galagonyarágó törpemoly – 184, 189, 235, 294, 310, 385
 = *pygmaeella* (Haworth, 1828) – 6, 14, 32, 35, 36, 39, 49,
- crataegella* (Klimesch, 1936) – rézfényű törpemoly – 6, 14, 25, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 64, 77, 189, 235, 294, 385, 396
 = *crataegi* auct. – 33
- desperatella* (Frey, 1856) – vadalma-törpemoly – 6, 14, 25, 35, 39, 49, 51, 184, 189, 235, 294, 385, 396
 = *pyricola* (Wocke, 1877) – 6, 35, 36, 50
- hahniella* (Wörz, 1937) – patinás törpemoly – 6, 14, 16, 25, 34, 35, 36, 40, 49, 50, 51, 184, 189, 235, 294, 385, 396
- magdalenae* (Klimesch, 1950) – madárberkenye-törpemoly – 32, 35, 184
- minusculella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – körtelevél-törpemoly – 6, 14, 16, 33, 35, 36, 39, 49, 50, 184, 189, 235, 294, 385
- nylandriella* (Tengström, 1848) – berkenyelevél-törpemoly – 5, 20, 32, 35, 68
 = *aucupariae* (Frey, 1857) – 20, 35
- oxyacanthella* (Stainton, 1854) – ibolyavörös törpemoly – 6, 35, 39, 40, 50, 64, 184, 189, 235, 294, 385
 = *cotoneastri* auct., nec Sorhagen, 1922, sensu Klimesch, 1948 – 20, 26, 35, 49, 50
- pyri* (Glitz, 1865) – vadvörte-törpemoly – 6, 14, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 49, 51, 64, 77, 189, 235, 396
- regiella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – királyi törpemoly – 6, 14, 20, 25, 35, 39, 49, 50, 51, 184, 294, 385, 396
- speciosa* (Frey, 1858) – hegyijuhar-törpemoly – 6, 14, 32, 33, 35, 49, 64, 189, 442
 = *pseudoplatanella* (Weber, 1936) – 6,
- lonicerarum* (Frey, 1857) – loncanknázó törpemoly – 6, 14, 35, 49, 167
- aurella* (Fabricius, 1775) – aranyszárnú törpemoly – 6, 14, 16, 25, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 60, 184, 189, 235, 294, 385, 396
 = *nitens* (Fologne, 1862) – 6, 14, 35, 50
 = *fragariella* (Heinemann, 1862) – 6, 14, 16, 25, 35, 36, 51, 184,
 = *gei* (Wocke, 1871) – 6, 14, 35
- filipendulae* (Wocke, 1871) – legyezőfü-törpemoly – 6, 14, 35, 49, 294, 385
- poterii* (Stainton, 1858) – vérfű-törpemoly – 6, 35, 50, 49, 51, 64, 77, 294, 385, 396
 = *comari* (Wocke, 1862) – 35
 = *geminella* (Frey, 1870) – 6, 77
 = *diffinis* (Wocke, 1874) – 25, 35
 = *serella* (Stainton, 1888) – 20, 26, 35
 = *elisabethella* Szöcs, 1957 – 6, 35

- splendidissimella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – ékes törpemoly – 6, 14, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 60, 64, 77, 189, 235, 294, 385, 396
= *dulcella* (Heinemann, 1862) – 6, 35, 36
- tormentillella* (Herrich-Schäffer, 1860) – pimpóaknázó törpemoly – 6, 14, 35
- plagicolella* (Stainton, 1854) – kökénylevél-törpemoly – 6, 14, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 60, 64, 77, 184, 189, 235, 274, 294, 385, 386, 396
- continuella* (Stainton, 1856) – nyírfalevél-törpemoly – 6, 20, 25, 35, 50, 51, 294, 385, 396
- lemniscella* (Zeller, 1839) – tündér-törpemoly – 189, 235, 294, 385, 396
= *marginicolella* (Stainton, 1853) – 14, 25, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 184
= *fulvomacula* auct., nec Skala, 1936 – 14
- carpinella* (Heinemann, 1862) – gyertyánragó törpemoly – 6, 14, 16, 20, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 184, 189, 235, 294, 385, 396
- floslactella* (Haworth, 1828) – gyertyánlevél-törpemoly – 6, 20, 25, 32, 34, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 184, 189, 235, 294, 385, 396
- tityrella* (Stainton, 1854) – bükklevél-törpemoly – 6, 14, 16, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 60, 189, 235, 294, 385
- hemargyrella* (Kollar, 1832) – bükkaknázó törpemoly – 6, 14, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 189, 235, 294, 385, 396
- atricapitella* (Haworth, 1828) – feketefejű-törpemoly – 6, 33, 34, 35, 36, 49, 189, 235, 294, 385
- basiguttella* (Heinemann, 1862) – foltostövű törpemoly – 6, 20, 33, 35, 36, 40, 49, 60, 64, 184, 189, 235, 294, 310, 385
= *cerricolella* (Klimesch, 1946) – 20, 35, 40, 49, 50
- dorsiguttella* (Johansson, 1971) – foltos törpemoly – 154, 294, 385
- eberhardi* (Johansson, 1971) – tölgylevél-törpemoly – 34, 35, 47, 49,
- roborella* (Johansson, 1971) – hegyespotrohú törpemoly – 34, 35, 47, 49,
- ruficapitella* (Haworth, 1828) – vörösfajú törpemoly – 6, 14, 16, 34, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 60, 64, 189, 235, 294, 385
- samiatella* (Zeller, 1839) – gesztenyelevél-törpemoly – 6, 34, 35, 49, 294, 385
- svenssoni* (Johansson, 1971) – mocsártölgy-törpemoly – 34, 35, 47, 49
- szoecsiella* (Borkowski, 1972) – magyar törpemoly – 34, 35, 47, 49, 50, 280, 294, 385
- zangherii* (Klimesch, 1951) – rozsdásszárnyú törpemoly – 20, 25, 35, 39, 49, 50, 51, 60, 294, 385, 396

Nepticulinae – Trifurculini

Bohemannia Stainton, 1859

- pulverosella* (Stainton, 1849) – lisztes törpemoly – 6, 20, 25, 35, 36, 49, 46, 184, 189, 235, 310, 396

Glaucolepis Braun, 1917

- melanoptera* (van Nieukerken & Puplensis, 1991) – sötét törpemoly – 110, 321
- bleonella* (Chrétien, 1904) – len-törpemoly – 238, 294, 385
- headleyella* (Stainton, 1854) – gyíkfűaknázó törpemoly – 6, 14, 35, 49
- magna* (Laštůvka & Laštůvka, 1997) – melegkedvelő törpemoly – 238, 396
- thymi* (Szöcs, 1965) – kakukkfű-törpemoly – 6, 35, 49, 50, 294, 385

Trifurcula Zeller, 1848

- cryptella* (Stainton, 1856) – koronafürt-törpemoly – 6, 14, 35, 36, 49, 50, 189, 235, 294, 385, 396
- eurema* (Tutt, 1899) – szarvaskerep-törpemoly – 6, 14, 35, 49, 189, 235, 294, 385
= *dorycniella* (Suire, 1928) – 6, 14, 35, 36, 49
= *gozmanyi* (Szöcs, 1959) – 6, 14, 35, 49, 50
- ortneri* (Klimesch, 1951) – okkerszárnyú törpemoly – 6, 14, 35, 49
- josefklimeschi* van Nieukerken, 1990 – Klimesch törpemolya – 154, 182, 294, 385
- subnitidella* (Duponchel, 1843)*⁴ – kerepszár-törpemoly – 409
- beirnei* Puplensis, 1984 – rekettye-törpemoly – 279, 294, 385

- chamaecytisi* Laštůvka & Laštůvka, 1994 – zánót-törpemoly – 131, 154
pallidella (Duponchel, 1843) – zánótrágó törpemoly – 6, 35, 184, 310
- Fomoria** Beirne, 1945
septembrella (Stainton, 1849) – orbáncfű-törpemoly – 6, 14, 16, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 64, 77, 189, 235, 294, 385, 387, 396
- Parafomoria** van Nieukerken, 1983
helianthemella (Herrich-Schäffer, 1860) – tetemtoldó-törpemoly – 6, 14, 16, 35, 36, 49, 50, 189, 235, 294, 385
- Etainia** Beirne, 1945
decentella (Herrich-Schäffer, [1855]) – juhartermés-törpemoly – 6, 35, 49, 310
louisella (Sircom, 1849) – juharmagtrágó törpemoly – 274, 396
= *sphendamni* (Hering, 1937) – 6, 14, 25, 35, 49, 51
sericopeza (Zeller, 1839) – juharmag-törpemoly – 6, 14, 35, 39, 49, 50, 51, 167, 184, 280, 294, 310, 321, 385, 396
- Acalyptis** Meyrick, 1921
loranthella (Klimesch, 1937) – fagyöngy-törpemoly – 6, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 189, 235, 294, 385, 396
- Zimmermannia** M. Hering, 1940
amani Svensson, 1966 – Aman törpemolya – 154, 278, 279, 294, 385
atrifrontella (Stainton, 1851) – tölgykéreg-törpemoly – 68
liebwerdella (Zimmermann, 1940) – bükkfakéreg-törpemoly – 6, 35, 39, 49, 280, 297, 386, 396
longicaudella Klimesch, 1953 – tölgyfakéreg-törpemoly – 6, 36, 189, 235
- Ectoedemia** Busck, 1907
intimella (Zeller, 1848) – kecskefűz-törpemoly – 6, 14, 32, 35, 36, 39, 40, 50, 60, 189, 235, 294, 385
hannoverella (Glitz, 1872) – nyárfalevél-törpemoly – 6, 14, 35, 39, 49, 50, 60, 64, 77, 294, 310, 385
turbidella (Zeller, 1848) – szürkenyár-törpemoly – 6, 14, 35, 36
= *populialbae* (Hering, 1935) – 49, 64, 77
klimeschi (Skala, 1933) – osztrák törpemoly – 6, 14, 35, 36, 49, 64, 77, 189, 235
argyropeza (Zeller, 1839) – fehérnyár-törpemoly – 6, 14, 32, 35, 39, 49, 60, 77, 189, 235
preisseckeri (Klimesch, 1941) – nyírlevélaknázó törpemoly – 20, 34, 35, 36, 47, 49, 189, 235
gilvipennella (Klimesch, 1946) – csertölgylevél-törpemoly – 20, 26, 35, 49, 385
rufifrontella (Caradja, 1920) – molyhostölgy-törpemoly – 294, 385
= *nigrosparsella* (Klimesch, 1940) – 30, 35, 47, 49,
albifasciella (Heinemann, 1871) – fehérsavós törpemoly – 6, 20, 25, 32, 35, 49, 50, 51, 60, 64, 77, 184, 294, 310, 385, 396
contorta van Nieukerken, 1985 – szilrágó törpemoly – 68, 294, 385
cerris (Zimmermann, 1944) – cserfarágó törpemoly – 20 25,26,35,39,40,49, 50, 51, 60, 294, 385,396
subbimaculella (Haworth, 1828) – sárgapettyes törpemoly – 6, 35, 49, 278, 294, 385
heringi (Toll, 1934) – okkerképű törpemoly – 6, 14, 20, 35, 49, 51, 60, 189, 235, 294, 385, 396
= *sativella* (Klimesch, 1936) – 33, 35, 36, 68
= *zimmermanni* (Hering, 1942) – 6, 14, 35, 49, 50, 51
= *quercifoliae* (Toll, 1943) – 6, 20, 35
liechtensteini (Zimmermann, 1944) – cserlevél-törpemoly – 20, 26, 33, 35, 39, 40, 49, 50, 60, 189, 294, 385
caradjai (Groschke, 1944) – balkáni törpemoly – 6, 14, 20, 25, 32, 35, 49, 50, 51, 294, 385, 396
spiraeae Gregor & Povolný, 1983 – gyöngyvessző-törpemoly – 20, 32, 35
hexapetalae (Szöcs, 1957) – budai törpemoly – 6, 14, 35, 49, 294, 310, 385
agrimoniae (Frey, 1858) – párlófű-törpemoly – 6, 14, 25, 35, 39, 40, 49, 50, 51, 294, 385, 396
occultella (Linnaeus, 1767) – nyíres törpemoly – [31], 294, 385, 396
= *argentipedella* (Zeller, 1839) – 6, 14, 25, 32, 35, 49, 50, 51, 60

- angulifasciella* (Stainton, 1849) – hajlottsávú törpemoly – 6, 14, 16, 32, 33, 35, 36, 40, 49, 50, 189, 235, 294, 310, 385
arcuatella (Herrich-Schäffer, [1855]) – eperlevél-törpemoly – 6, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 39, 40, 50, 46, 60, 294, 385, 396
atricollis (Stainton, 1857) – naspolyafa-törpemoly – 6, 14, 25, 32, 34, 35, 36, 49, 50, 46, 184, 189, 235, 294, 385, 396
 = *staphyleae* (Zimmermann, 1944) – 6, 14, 16, 25, 33, 35, 36, 39, 49, 51
rubivora (Wocke, 1860) – szederlevél-törpemoly – 6, 14, 20, 35, 49, 64, 77, 178
spinosella (De Joannis, 1908) – fekete törpemoly – 6, 14, 16, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 49, 50, 51, 64, 77, 184, 189, 235, 294, 385, 396
mahalebella (Klimesch, 1936) – törökmeggy-törpemoly – 6, 14, 25, 33, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 189, 235, 294, 385, 396

Opotegidae – Aprómolyfélék

***Opotega* Zeller, 1839**

- salaciella* (Treitschke, 1833) – ezüstfehér aprómoly – 6, 22, 31, 36, 51, 174, 178, 184, 189, 235, 294, 297, 301, 385, 386, 387, 396
spatulella Herrich-Schäffer, [1855] – szalmaszínű aprómoly – 6, 15, 31, 36, 52, 77, 119, 177, 178, 189, 232, 235, 260, 274, 280, 297, 301, 321, 386, 387, 396

***Pseudopostega* Kozlov, 1985**

- auritella* (Hübner, [1813]) – gólyahírnázó aprómoly – 6, 35, 77, 184, 274, 297, 386, 387, 396
crepusculella (Zeller, 1839) – tarka aprómoly – 6, 36, 45, 52, 62, 77, 142, 167, 178, 184, 189, 235, 243, 274, 280, 297, 301, 386, 387, 396

A d e l o i d e a

Prodoxidae – Sárgás-virág-molyfélék

***Lampronia* Stephens, 1829**

- corticella* (Linnaeus, 1758) – málnarágó virág-moly – 119, 135, 297, 386, 396
 = *rubiella* (Bjerkander, 1781) – 6, 11, 31, 52, 78
morosa Zeller, 1852 – rózsarágó virág-moly – 6, 53, 184, 260, 294, 385, 396
flavimitrella (Hübner, [1817]) – sárgafejű virág-moly – 6, 51, 52, 78, 99, 122, 126, 167, 178, 197, 260, 297, 301, 396
rupella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hegyi virág-moly – 6, 52, 178
fuscatella (Tengström, 1848) – nyírfalakó virág-moly – 396
 = *tenuicornis* (Stainton, 1854) – 69

Incurvariidae – Ércfényű-virág-molyfélék

***Vespina* Davis, 1972**

- slovaciella* (Zagulajev & Tokár, 1990) – szlovák virág-moly – 225, 231, 386

***Incurvaria* Haworth, 1828**

- pectinea* Haworth, 1828 – nyírnázó virág-moly – 6, 22, 35, 52, 77, 178, 184, 197, 235
mascullella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgynázó virág-moly – 87, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396
 = *muscalella* (Fabricius, 1787) – 6, 13, 15, 22, 23, 35, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78
oehlmanniella (Hübner, [1796]) – áfonyás virág-moly – 6, 15, 31, 35, 45, 51, 52, 59, 77, 119, 167, 177, 178, 189, 235, 260, 297, 321, 386, 387, 396
praelatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szamócarágó virág-moly – 6, 35, 45, 52, 142, 167, 178, 260, 386, 396
koernerella (Zeller, 1839)*⁵ – bükkös virág-moly – 188, 195

Phylloporia Heinemann, 1870

bistrigella (Haworth, 1828)*⁶ – nyírlevél-virágmoly – 188, 195

Heliozelidae – Fényesszárnyú-molylepkék

Antispila Hübner, 1825

metallella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyűrűssom-fényesmoly – 178, 333, 423, 396

= *pfeifferella* (Hübner, [1813]) nom. praeocc. – 6, 25, 34, 35, 40, 45, 49, 51, 52

treitschkiella (Fischer v. Röslerstamm, 1843) – somaknázó fényesmoly – 6, 16, 25, 33, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 52, 167, 177, 178, 189, 235, 280, 294, 310, 321, 375, 384, 385, 386, 423, 396

petryi Martini, 1898*⁷ – Petry fényesmolya (fekete fényesmoly) – 16, 25, 34, 35, 36, 40, 49, 51, 375, 384, 424

Heliozela Herrich-Schäffer, 1853

sericiella (Haworth, 1828) – tölgyaknázó fényesmoly – 68, 174, 294, 385, 396

= *stanneella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – 68

resplendella (Stainton, 1851) – égeraknázó fényesmoly – 6, 35, 77

Coptodisca Walsingham, 1895

lucifluella (Clemens, 1860) – dióaknázó fényesmoly – 376, 386, 388, 396, 404, 421

juglandiella (Chambers, 1874) – feketedió-fényesmoly – 404, 421

Adelidae – Hosszúcsápú-törösmolyfélék

Adelinae

Nemophora Hofmannsegg, 1798

degeerella (Linnaeus, 1758) – pompás törösmoly – 6, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

ochsenheimerella (Hübner, [1813]) – jegenyefenyő-törösmoly – 55, 142

raddaella (Hübner, 1793) – levantei törösmoly – 6, 13, 15, 36, 178, 386

= *latreillella* (Fabricius, 1798) – 119

metallica (Poda, 1761) – fém színű törösmoly – 77, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 178, 197, 263, 294, 301, 363, 385, 386, 396, 421

= *scabiosella* (Scopoli, 1763) – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 53

pfeifferella (Hübner, [1813]) – cifra törösmoly – 6, 266, 386

cupriacella (Hübner, [1819]) – réz színű törösmoly – 6, 13, 15, 51, 119, 197, 263, 294, 385, 396

viollellus (Herrich-Schäffer in Stainton, 1851) – vastagszápú törösmoly –

= *violaria* Razowski, 1978 – 133

[*viollella* Zeller, 1853 – 142 – erroneous, name wrongly used]

prodigellus (Zeller, 1853) – arany sárga törösmoly – 228, 294, 385

= *auricellus* (Ragonot, 1874) – 6, 52, 178, 197

fasciella (Fabricius, 1775) – feketesávú törösmoly – 6, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 122, 134, 142, 167, 184, 189, 235, 294, 301, 333, 385, 386, 396

mollella (Hübner, [1816])*⁸ – bíborsávú törösmoly – 6, 15, 119, 228

minimella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ördög szem-törösmoly – 6, 51, 52, 178, 294, 363, 385, 396

dumerilella (Duponchel, 1839) – balkáni törösmoly – 6, 15, 174, 294, 385

[*dumeriliellus* (Duponchel, 1839) – 13 – erroneous]

associatella (Zeller, 1839) – lucfenyő-törösmoly – 252

Adela Latreille, 1796

viollella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ibolya fényű törösmoly – 142, 167, 174, 177, 178, 189, 197, 232, 294, 385, 386, 396

[*viollella* (Treitschke, 1833) – 6, 13, 15, 36, 45, 51, 52, 78, 119 – erroneous]

- mazzolella* (Hübner, [1801]) – aranyfoltú törösmoly – 6, 167, 184, 294, 333, 385
 = *reskovitsiella* (Szent-Ivány, 1945) – 6, 13, 15, 228
- reaumurella* (Linnaeus, 1758) – smaragdfényű törösmoly – 99, 119, 135, 142, 167, 174, 177, 178, 184, 189, 197, 235, 260, 263, 280, 296, 294, 297, 301, 310, 333, 385, 386, 387, 396
 = *viridella* (Scopoli, 1763) – 6, 13, 15, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78
- cuprella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyzójú törösmoly – 6, 13, 15, 119, 387
- croesella* (Scopoli, 1763) – díszes törösmoly – 6, 13, 15, 36, 51, 52, 99, 119, 122, 134, 135, 167, 178, 184, 197, 263, 280, 294, 297, 310, 333, 363, 385, 386, 396
- Cauchas** Zeller, 1839
- rufifrontella* (Treitschke, 1833) – vöröshomlokú törösmoly – 6, 13, 15, 51, 52, 119, 122, 178, 184, 310, 333, 363, 386, 396
 [breviantennella Nielsen & Johansson, 1980 – 145 – erroneous; name wrongly used]
- fibulella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyfényű törösmoly – 6, 13, 15, 22, 45, 51, 52, 59, 78, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 178, 197, 294, 310, 385, 386, 396
- leucocerella* (Scopoli, 1763) – aranybarna törösmoly – 6, 52, 62, 78, 167, 174, 178, 197, 294, 301, 363, 385, 396
- rufimitrella* (Scopoli, 1763) – patinafényű törösmoly – 6, 13, 15, 53, 119, 167, 178, 197, 294, 301, 385, 386, 387, 396
 = *uhrik-meszarosiella* (Szent-Ivány, 1945) – 6, 13, 15, 119, 228

Nematopogoninae

Nematopogon Zeller, 1839

- pillella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hegyi bajszosmoly – 6, 13, 15, 51, 119, 167, 174, 177, 184, 189, 197, 232, 280, 294, 297, 301, 385, 386, 396
- schwarziellus* Zeller, 1839 – déli bajszosmoly – 6, 22, 23, 197, 386
- adansoniella* (de Villers, 1789) – gyűrűscsápú bajszosmoly – 167, 178, 189, 221, 235, 294, 385, 386, 396
 = *panzerella* (Fabricius, 1794) – 6, 13, 15, 23, 36, 51, 52, 53, 99, 119, 184
- metaxella* (Hübner, [1813]) – mocsári bajszosmoly – 6, 45, 51, 52, 77, 78, 119, 126, 142, 167, 174, 178, 197, 294, 301, 385, 386, 387, 396
- swammerdamella* (Linnaeus, 1758) – nagy bajszosmoly – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- robertella* (Clerck, 1759) – fenyvesjáró bajszosmoly – 77, 134, 142, 220, 280, 294, 310, 385, 386
 = *pilulella* (Hübner, [1813]) – 6

Tischeriidae

Tischeriidae – Foltaknás-sörtésmolyfélék

Tischeria Zeller, 1839

- ekebladella* (Bjerkander, 1795) – tölgyaknázó sörtésmoly – 6, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 64, 77, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 232, 235, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 396
- dodonaea* Stainton, 1858 – sárga sörtésmoly – 6, 20, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 49, 51, 52, 59, 60, 64, 77, 78, 119, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 263, 280, 294, 310, 321, 385, 386, 396
- decidua* Wocke, 1876 – sötétsárga sörtésmoly – 6, 22, 35, 40, 52, 178, 184, 189, 197, 235, 301
- Coptotriche** Walsingham, 1890 (= *Emmetia* Leraut, 1993)
- marginata* (Haworth, 1828) – szederaknázó sörtésmoly – 6, 14, 25, 33, 35, 36, 39, 49, 51, 52, 59, 60, 78, 99, 135, 142, 152, 167, 178, 184, 189, 235, 274, 280, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
- szoecsi* (Kasy, 1961) – magyar sörtésmoly – 6, 14, 25, 35, 49, 50, 51, 77, 294, 385, 396

- heinemanni* (Wocke, 1871) – kormos sörtésmoly – 6, 14, 25, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 60, 64, 77, 189, 235, 294, 385, 396
gaunacella (Duponchel, 1843) – kökényaknázó sörtésmoly – 6, 20, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 51, 52, 53, 64, 77, 99, 135, 178, 184, 189, 235, 260, 280, 310, 321, 330, 396
angusticollella (Duponchel, 1843) – rózsaknázó sörtésmoly – 6, 14, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 51, 53, 60, 178, 235, 189, 280, 294, 301, 385, 396

Tineoidea

Meessiidae – Zuzmólakó molyfélék*⁹

Eudarcia Clemens, 1880

- pagenstecherella* (Hübner, [1825])*¹⁰ – fali zuzmómoly
 = *vincella* (Herrich-Schäffer, 1850); *vinculella* (Zeller, 1852) – 6, 184
kasyi (Petersen, 1971) – nagytályai zuzmómoly – 444

Psychidae – Csózsákos-molyfélék*¹¹

Naryciinae – *Naryciini*

Narycia Stephens, 1836

- duplicella* (Goeze, 1783) – fehérűrszákcsőrdőlepké – 174, 294, 333, 344, 385, 396
 = *monilifera* (Geoffroy, 1785) – 6
astrella (Herrich-Schäffer, [1854]) – fehérűrszákcsőrdőlepké – 6, 51, 52, 178, 184, 344, 396

Diplodoma Zeller, 1852

- laichartingella* (Goeze, 1783) – fehérűrszákcsőrdőlepké – 167, 178, 184, 232, 344, 396
 = *herminata* (Fourcroy, 1785) – 135
 = *marginipunctella* (Stephens, 1835) – 6, 70, 78
adpersella Heinemann, 1870 – tarka szárűrdőlepké – 6, 15, 119, 344

Naryciinae – *Dahlicini*

Dahlica (subg. *Dahlica*) Enderlein, 1912

- triquetrella* (Hübner, [1813]) (bisex. f.)*¹² – hároműrszákcsőrdőlepké – 6, 37, 197, 344
lichenella (Linnaeus, 1761) (parth. f.)*¹³ – bűkkűs szűzűrszákcsőrdőlepké – 188, 195, 344
nickerlii (Heinemann, 1870) – Nickerl csűrszákcsűrdőlepké – 6, 15, 19, 22, 23, 45, 52, 119, 134, 167, 178, 197, 294, 344, 385, 386
wockii (Heinemann, 1870) – Wocke csűrszákcsűrdőlepké – 13, 353, 344, 396
sauteri (Hättenschwiler, 1977) – Sauter csűrszákcsűrdőlepké – 353, 344, 396

Dahlica (subg. *Brevantennia* Sieder, 1953)

- herrmanni* Weidlich, 1996*¹⁴ – Herrmann csűrszákcsűrdőlepké – 148, 231, 344

Dahlica (subg. *Siederia* Meier, 1953)

- listerella* (Linnaeus, 1758) – fenyűrszákcsűrdőlepké – 197, 344
 = *pineti* (Zeller, 1852) – 6, 37, 178

Dahlica (subg. *Eosolenobia* Filipjev, 1924)

- mannii* (Zeller, 1852) – északi csűrszákcsűrdőlepké – 6, 37, 52, 197, 344

Dahlica (subg. *Praesolenobia* Sieder, 1954)

- clathrella* (Fischer von Rűslerstamm, 1837) – hűrdűs csűrszákcsűrdőlepké – 6, 13, 15, 19, 23, 119, 134, 177, 189, 197, 294, 310, 321, 344, 385, 396

Dahlica (subg. *Postsolenobia* Meier, 1957)

- weidlichi* Arnsheid, 2020 – bűkki csűrszákcsűrdőlepké – 398

Taleporiinae – Taleporiini***Taleporia*** Hübner, 1825

tubulosa (Retzius, 1783) – közönséges csövesmoly – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 78, 119, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 235, 260, 280, 294, 297, 344, 385, 386, 396

politella (Ochsenheimer, 1816) – szürkéssárga csövesmoly – 6, 19, 23, 51, 52, 53, 59, 78, 99, 122, 134, 167, 178, 194, 197, 221, 232, 260, 294, 297, 310, 321, 344, 385, 396

Psychinae – Psychini***Psyche*** Schrank, 1801

casta (Pallas, 1767) – fényes zsákhordólepke – 6, 13, 15, 19, 22, 23, 36, 45, 51, 53, 77, 78, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 189, 197, 235, 260, 280, 296, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 344, 385, 386, 396

= *germanica* (Chapmann, 1900) – 6, 15, 22, 19, 23, 36, 119

crassiorella (Bruand, 1850) – vaskos zsákhordólepke – 6, 19, 23, 36, 51, 53, 122, 142, 189, 197, 235, 294, 344, 363, 385, 396

Proutia Tutt, 1899 (= *Bruandia* Tutt, 1900)

betulina (Zeller, 1839) – nyírfa-zsákhordólepke – 6, 119, 178, 344

comitella (Bruand, 1853) – fenyveslakó zsákhordólepke – 5, 26, 119, 178, 344

Bacotia Tutt, 1899

claustralla (Bruand, 1845)*¹⁵ – zuzmóevő zsákhordólepke – 188, 195, 344

Epichnopteryginae – Epichnopterygini***Epichnopteryx*** Hübner, 1825

plumella ([Denis & Schiffermüller], 1775)*¹⁶ – ólomszürke zsákhordólepke – 68, 178, 189, 197, 235, 294, 344, 363, 385

= *pulla* Esper, 1785 – 13

plumella ssp. *kovacsi* Sieder, 1955 – magyar zsákhordólepke – 6, 15, 19, 22, 23, 36, 37, 45, 51, 70, 77, 119, 134, 142, 167, 178, 183, 184, 189, 197, 235, 263, 294, 310, 344, 386, 396

Whittleia Tutt, 1900

undulella (Fischer von Röslerstamm, 1837) – rácsos zsákhordólepke – 6, 19, 77, 197, 344, 345, 348, 363

= *paveli* (Uhryk, 1898) – 6, 344

Bijugis Heylaerts, 1881

bombycella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – alkonyati zsákhordólepke – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 189, 194, 197, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 344, 385, 386, 387, 396

pectinella ([Denis & Schiffermüller], 1775)*¹⁷ – füstös zsákhordólepke – 6, 19, 36, [51], 122, 135, 197, 232, 235, 260, 310, 333, 344, 386, 396

[*Rebelia perlucidella* (Bruand, 1853) – átlátszó zsákhordólepke?; 5, 53, 167, 189, 308 – erroneous]

Rebelia Heylaerts, 1900*¹⁸

sapho (Millière, 1865)*¹⁹ – selyemfényű zsákhordólepke – [167], 235, 344

kruegeri Turati, 1914*²⁰ ssp. *danubiella* Loebel, 1941 – dunavidéki zsákhordólepke – 6, 19, 36, 167, 189, 308, 344

plumella (Ochsenheimer, 1810) – tollszárnyú zsákhordólepke – 13, 15, 22, 36, 45, 51, 53, 59, 87, 119, 122, 135, 308, 344, 385

= *plumella* (Herrich-Schäffer, 1853-1855) – 308

= *herrichiella* Strand, 1912 – 142, 167, 189, 232, 235, 260, 263, 294, 301, 310, 321, 386, 396

= ssp. *surientella* (Bruand, 1858) – 23, 197, 301

= ssp. *bavarica* Wehrli, 1926 – 6, 178, 337

Psychidea Rambur, 1866

nudella (Ochsenheimer, 1810) – póre zsákhordólepke – 6, 36, 51, 178, 189, 235, 294, 344, 385, 396

Acentra Burrows, 1932

subvestalis (Wehrli, 1933) – lisztes zsákhordólepke – 6,23,77,134,177, 189, 294, 301, 344, 385, 396
[*vestalis* (Staudinger, 1871) – 195, 197 – erroneous; incorrectly used name]

Oicetiinae – Acanthopsychini

Acanthopsyche Heylaerts, 1881

atra (Linnaeus, 1767) – fekete zsákhordólepke – 6, 23, 197, 280, 344

siedereri Szöcs, 1961 – budai zsákhordólepke – 6, 12, 19, 197, 301, 344

ecksteini (Lederer, 1855) – fenyőtűs zsákhordólepke – 6, 36, 189, 197, 235, 294, 310, 344, 363, 385, 387, 405

Canephora Hübner, 1822

hirsuta (Poda, 1761) – kormos zsákhordólepke – 142, 152, 167, 177, 178, 189, 194, 197, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 344, 385, 386, 396

= *unicolor* (Hufnagel, 1766) – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 99, 119, 122, 135

Pachythelia Westwood, 1848

villosella (Ochsenheimer, 1810) – nagy zsákhordólepke – 6, 22, 23, 36, 51, 77, 99, 122, 167, 178, 182, 189, 197, 221, 235, 260, 263, 294, 301, 321, 344, 385, 386, 387, 396

Oicetiinae – Oreopsychini

Ptilocephala Rambur, 1866

muscella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tollas zsákhordólepke – 6, 13, 15, 19, 51, 119, 167, 178, 197, 344, 396

plumifera (Ochsenheimer, 1810) – alföldi zsákhordólepke – 6, 19, 51, 77, 134, 182, 197, 294, 301, 310, 344, 385, 396

Oicetiinae – Phalacropzetigini

Megalophanes Heylaerts, 1881

viciella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – útszéli zsákhordólepke – 6, 13, 15, 19, 22, 23, 36, 42, 45, 51, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 344, 385, 386, 387, 396

Sterrhopterix Hübner, 1825

fusca (Haworth, 1809) – barna zsákhordólepke – 6, 23, 119, 126, 167, 177, 178, 189, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 344, 385, 386, 396

= *hirsutella* (Hübner, 1796) – 6

= *gozmanyi* Kovács, 1953 – 6, 15, 17, 36, 37, 42, 45, 51, 59, 119, 134, 142

Oicetiinae – Apteronini

Apteron Millière, 1857

helicoidella (Vallot, 1827) (parth. f.) – csigahéjas zsákhordólepke – 99, 119, 167, 178, 189, 235, 280, 294, 301, 321, 333, 344, 385, 387, 396

= *crenulella* sensu auct., et sensu Bruand, 1853 (partim) – 6, 13, 15, 20, 22, 23, 35, 36, 51, 59, 63, 77, 122, 197

Tineidae – Ruhamolyfélék*²¹

Euplocaminae

Euplocamus Latreille, 1809

anthracinalis (Scopoli, 1763) – fészűscsapú korhadékmoly – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 78, 99, 119, 122, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 263, 280, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Scardinae

Montescardia Amsel, 1952

tessulatellus (Zeller, 1846) – havasi óriásmoly – 6, 167, 177, 189, 294, 385, 387, 396

Scardia Treitschke, 1830

boletella (Fabricius, 1794) – korhadéklakó óriásmoly – 178, 297, 386, 396

= *polypori* (Esper, 1804) – 6, 15, 51, 119

Morophaga Herrich-Schäffer, 1853

choragella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges óriásmoly – 77, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 296, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *boleti* (Fabricius, 1776) – 6, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78

morellus (Duponchel, 1838) – mediterrán óriásmoly – 283, 309

Nemapogoninae**Triaxomera** Zagulajev, 1959

fulvimitrella (Sodoffsky, 1830) – vörösfajű gombamoly – 6, 15, 119

parasitella (Hübner, [1796]) – tarka gombamoly – 6, 13, 15, 22, 31, 36, 51, 53, 59, 77, 78, 119, 126, 135, 142, 167, 174, 177, 178, 184, 189, 194, 220, 232, 235, 243, 260, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Archinemapogon Zagulajev, 1962

yildizae Koçak, 1981^{*22} – korhadéklakó gombamoly – 178, 297, 396

= *laterella* (Thunberg, 1794) – 6

Nemaxera Zagulajev, 1964

betulinella (Paykull, 1785) – homályos gombamoly – 280, 294, 297, 385, 396

= *emortuella* (Zeller, 1839) – 6, 23, 52

Nemapogon Schrank, 1802

granella (Linnaeus, 1758) – raktári gabonamoly – 6, 13, 15, 17, 23, 36, 45, 51, 53, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396

cloacella (Haworth, 1828) – raktári gombamoly – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 235, 260, 296, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

koenigi Căpușe, 1967^{*23} – fehérpettyes gombamoly –

= *albipunctella* Haworth, 1828, nec Denis & Schiffermüller, 1775 – 100

= *wolffiella* Karsholt & Nielsen, 1976 – INT²

inconditella (D. Lucas, 1956) – hegyi gombamoly – 119, 184, 189, 232, 235, 297, 386, 387, 396

= *heydeni* G. Petersen, 1957 – 6, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 70, 77

variataella (Clemens, 1859) – fehérfejű gombamoly – 178, 294, 307, 385, 387, 396

= *personella* Pierce & Metcalfe, 1934 – 6, 51, 77, 119, 184

gravosaellus G. Petersen, 1957^{*24} – kövér gombamoly – 188, 195

hungaricus Gozmány, 1960 – magyar gombamoly – 6, 22, 23, 36, 174, 189, 197, 235, 280, 294, 297, 321, 385, 396

clematella (Fabricius, 1781) – ékes gombamoly – 119, 167, 178, 184, 189, 235, 280, 294, 297, 385, 386, 387, 396

= *arcella* auct., nec Fabricius 1776 – 6, 13, 15, 36, 52, 62, 77, 99

fungivorella (Benander, 1939) – erdei gombamoly – 293, 294, 385

picarella (Clerck, 1759) – nagy gombamoly – 38, 51, 119, 294, 385, 396

nigralbella (Zeller, 1839) – bükkfa-gombamoly – 118, 167, 294, 297, 385, 386, 396

falstriella (Bang-Haas, 1881) – északi gombamoly – 100, 294, 385

Triaxomasia Zagulajev, 1964

caprimulgella (Stainton, 1851)^{*25} – kis gombamoly – 6, 184

Neurothaumasia Le Marchand, 1934

ankerella (Mann, 1867) – magyarmoly – 6, 13, 15, 23, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 307, 310, 321, 333, 385, 387, 396

Matratinea Sziráki, 1990

rufulicaput Sziráki & Szöcs, 1990 – magyar fészekmoly – 105, 291, 310, 396

Infurcitinea Spuler, 1910

roesslerella (Heyden, 1865) – szürke zuzmómoly – 47

albicomella (Stainton, 1851) – fehérfejű zuzmómoly – 6, 36, 51, 70, 77, 99, 119, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

finalis Gozmány, 1959 – magyar zuzmómoly – 6, 174, 178, 184, 294, 385, 396

argentimaculella (Stainton, 1849)*²⁶ – ezüstös zuzmómoly – 6

Lichenotinea Petersen, 1957

pustulatella (Zeller, 1852) – zuzmófálómoly – 434

Stenoptinea Dietz, 1905

cyaneimarmorella (Millière, 1854) – tűszárnyú zuzmómoly – 142, 167, 178, 194, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

= *angustipennis* (Herrich-Schäffer, 1854) – 6, 52, 77, 78, 134, 184

Agnathosia Amsel, 1954

mendicella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – taplómoly – 320

Myrmecozela Zeller, 1852

ochraceella (Tengström, 1848) – hangyabolymoly – 69, 78, 167

Ateliotum Zeller, 1839

hungaricellum Zeller, 1839 – díszes hulladékmoly – 6, 13, 15, 31, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 134, 135, 167, 177, 183, 184, 189, 197, 221, 232, 260, 262, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Haplotinea Diakonoff & Hinton, 1956

ditella (Pierce, Metcalfe & Diakonoff, 1938)*²⁷ – avarlakó hulladékmoly – Szn – 188, 195

insectella (Fabricius, 1794) – kitinmoly – 6, 15, 22, 23, 51, 119, 184, 294, 333, 385, 396

Cephimallota Bruand, 1850

crassiflavella Bruand, 1850 – foltosszegélyű hulladékmoly – 189, [235], 292, 299, 338

= *simplicella* (Zeller, 1852) – 6, 36, 51, 53

angusticostella (Zeller, 1839)*²⁸ – rozsdás hulladékmoly – 77, 99, 134, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 263, 292, 294, 297, 299, [301], 307, 338, 385, 396

Tineinae

Reisserita Agenjo, 1952

relicinella (Zeller, 1839) – barna hulladékmoly – 6, 178, 184, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 396

Trichophaga Ragonot, 1894

tapetzella (Linnaeus, 1758) – takácmoly (kárpitomoly) – Szn – 6, 13, 15, 52, 77, 119, 134, 178, 197, 232, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 396

scandinaviella Zagulajev, 1960 – skandináv fészekmoly – 392

Elatobia Herrich-Schäffer, 1853

fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)*²⁹ – fenyves korhadékmoly – 88, 184

Tineola Herrich-Schäffer, 1853

bisselliella (Hummel, 1823) – ruhamoly – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 53, 78, 99, 119, 122, 126, 167, 178, 189, 197, 235, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 396

Tinea Linnaeus, 1758

pellionella Linnaeus, 1758 – szücsmoly – 6, 13, 15, 22, 23, 52, 53, 77, 119, 126, 167, 178, 184, 197, 262, 296, 297, 321, 333, 396

- translucens* Meyrick, 1917 – homályos ablakosmoly – Szn – 119, 301
dubiella Stainton, 1859*³⁰ – gyapjúmoly – 88, 184
pallescentella Stainton, 1851 – nagy szarumoly – Szn – 6, 13, 15, 36, 53, 189, 235
steueri G. Petersen, 1966 – Steuer hulladékmolya – 283
omichlopi Meyrick, 1928 – keleti ablakosmoly – 330, 385
= *nonimella* (Zagulajev, 1955) – 5, 51, 88, 182, 184, 280, 294, 396
columburiella Wocke, 1877 – sárgásszürke fészekmoly – 77, 184
semifulvella Haworth, 1828 – fényes hulladékmoly – 6, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 275, 296, 294, 297, [301], 385, 386, 396
trinitella Thunberg & Wenner, 1794 – hárompettyes fészekmoly – 6, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
= *lapella* Hübner, 1796 – 13
Niditinea G. Petersen, 1957
fuscella (Linnaeus, 1758) – pettyes fészekmoly – 119, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 294, 296, 297, 301, 307, 310, 321, 330, 333, 385, 396
= *fuscipunctella* (Haworth, 1828) – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 53, 77, 122
striolella (Matsumura, 1931)*³¹ – szarumoly
= *piercella* (Bentinck, 1935) – 6
Monopis Hübner, 1825
laevigella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hulladékmoly – 119, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 235, 260, 274, 280, 294, 296, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
= *rusticella* (Hübner, 1796) – 6, 13, 15, 17, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78, 134
neglecta Šumpich & Liška, 2011 – cseh hulladékmoly – 301, 306, 385
weaverella (Scott, 1858) – foltos hulladékmoly – 26, 294, 330, 385
obviella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges ablakosmoly – 119, 126, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 232, 260, 280, 294, 296, 297, 301, 307, 310, 321, 385, 386, 387, 396
= *ferruginella* (Hübner, 1813) – 6, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 99, 122, 134
crociacipitella (Clemens, 1860) – sárgás ablakosmoly – 6, 15, 31, 36, 119, 189, 235, 294, 301, 385, 396
imella (Hübner, [1813]) – szarurágó ablakosmoly – 6, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 262, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
monachella (Hübner, [1796]) – apácamoly – 6, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 42, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 387, 386
fenestratella (Heyden, 1863) – korhadéklakó ablakosmoly – 6, 178, 197, [301]
Pelecystola Meyrick, 1920*³²
fraudentella (Zeller, 1852) – korhadéklakó foltosmoly – 366

Hieroxestinae

Opogona Zeller, 1853

sacchari (Bojer, 1856) – banánmoly – An – 157, 231, 428

Wegneria Diakonoff, 1951

panchalcella (Staudinger, 1871) – zöldfénnyű törmelékemoly – 299, 311, 387

Oinophila Stephens, 1848

v-flava (Haworth, 1828)*³³ – dugómoly – An; Szn – 6, 53,

Teichobiinae

Psychoides Bruand, 1850

verhuella Bruand, 1850 – zuzmóevőmoly – 6, 14, 35,
= *verhuelella* Stainton, 1854 – 39

Yponomeutoidea

Yponomeutidae – Pókhálós-molyfélék

Yponomeuta Latreille, 1796

evonymella (Linnaeus, 1758) – pókhálós májusfamoly – 1, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 296, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

padella (Linnaeus, 1758) – pókhálós szilvamoly – 1, 24, 51, 53, 77, 122, 126, 134, 167, 197, 232, 260, 262, 280, 294, 297, 310, 333, 385, 387, 396

cagnagella (Hübner, [1813]) – pókhálós kecskerágómoly – 77, 119, 126, 178, 183, 189, 197, 235, 280, 294, 297, 301, 333, 363, 385, 396

= *cognatella* auct. [Hübner, 1822, nec Treitschke, 1832] – 1, 13, 14, 15, 35, 36, 51, 52, 53, 184

malinellus Zeller, 1838 – pókhálós almamoly – 1, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 31, 35, 36, 51, 119, 122, 126, 177, 183, 184, 189, 197, 235, 296, 294, 310, 321, 333, 385, 386, 396

rorrella (Hübner, [1796]) – pókhálós füzemoly – 1, 35, 51, 52, 70, 74, 77, 99, 122, 142, 177, 178, 189, 194, 232, 235, 260, 263, 294, 321, 385, 387, 396

irrorella (Hübner, [1796]) – pókhálós kökénymoly – 1, 27, 51, 52, 70, 77, 78, 134, 178, 184, 197, 260, 263, 280, 296, 301, 294, 310, 321, 333, 385, 387, 396

plumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pókhálós bengemoly – 1, 13, 15, 17, 22, 23, 27, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396

[*limbella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 296 – typo; name wrongly used]

sedella Treitschke, 1832 – húszpettyes pókhálósmoly – 142, 167, 177, 178, 189, 194, 197, 232, 235, 243, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 386, 387, 396

= *vigintipunctata* (Retzius, 1783) – 1, 15, 20, 22, 23, 25, 31, 35, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 134, 184

Zelleria Stainton, 1849

hepariella Stainton, 1849 – téglavörös pókhálósmoly – 281

Kessleria Nowicki, 1864

saxifragae (Stainton, 1868) – kötöröfű-pókhálósmoly – 357

Pseudoswammerdamia Friese, 1960

combinella (Hübner, 1786) – szemfoltos tarkamoly – 1, 22, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 284, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396

Swammerdamia Hübner, 1825

caesiella (Hübner, [1796]) – nyírlevélfonó tarkamoly – 77, 119, 142, 178, 189, 197, 235, 284, 301, 386, 396

= *heroldella* Hübner, [1825] – 1, 36

pyrella (De Villiers, 1789) – almalevél-tarkamoly – 1, 15, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 274, 280, 284, 296, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

compunctella (Herrich-Schäffer, [1855]) – berkenyefonó tarkamoly – 1, 31, 36, 45, 51, 77, 78, 119, 184, 189, 197, 235, 284, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

Paraswammerdamia Friese, 1960

albicapitella (Scharfenberg, 1805) – kökényfonó tarkamoly – 189, 235, 283, 284, 294, 301, 307, 321, 333, 385, 396

= *caesiella* (Hübner, 1813) – 1, 13, 15, 22, 23, 36, 52

= *spinella* (Hübner, 1809) – 184

nebulella (Goeze, 1783) – galagonyafonó tarkamoly – 284, 301, 396

= *lutarea* (Haworth, 1828) – 1, 184

Cedestis Zeller, 1839

gysseleniella (Zeller, 1839) – hamvas fenyőtűmoly – 59, 99, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 220, 232, 235, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396
 = *gysselinella* (Duponchel, 1840) – 2, 35, 36, 45, 51, 52, 59, 78
subfasciella (Stephens, 1834) – szürke fenyőtűmoly – 77, 99, 134, 142, 184, 220, 232, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 396
 = *farinatella* (Duponchel, 1840) – [2], 38, 51, 53, 78

***Ocnerostoma* Zeller, 1847**

piniariella Zeller, 1847 – fényes fenyőtűmoly – 261, 281, 301

friesei Svensson, 1966 – szürkecsápú fenyőtűmoly – 281

***Niphonympha* Meyrick, 1914**

dealbatella (Zeller, 1847) – aranyfoltos havasmoly

= *albella* (Zeller, 1847) – 15, 26, 31, 45, 51, 52, 70, 78, 119, 167, 178, 184, 197, 280, 297, 321, 386, 396

Argyresthiidae – Fémesmolyfélék

***Argyresthia* Hübner, 1825**

laevigatellus (Heydenreich, 1851) – vörösfenyő-ezüstmoly – 26, 62, 70, 77, 78, 99, 119, 178, 386

praecocella Zeller, 1839 – borókamagrágó aranymoly – 43, 51, 59, 99, 178, 178, 396

arceuthina Zeller, 1839 – borókafűró ezüstmoly – 2, 51, 59, 99, 167, 178, 396

trifasciata Staudinger, 1871 – háromsávós boróka-ezüstmoly – 172, 231, 260, 310, 321, 387, 396

thuiella (Packard, 1871) – tuja-fűró ezüstmoly – 165, 231, 297, 396

dilectella Zeller, 1847 – borókahajtás-aranymoly – 43, 51, 142, 178, 396

abdominalis Zeller, 1839 – borókatű-aranymoly – 2, 35, 43, 51, 59, 77, 99, 167, 178, 321, 387, 396

ivella (Haworth, 1828) – almarügyfűró aranymoly – 89, 167

brockeella (Hübner, [1813]) – nyírrügyfűró aranymoly – 26, 45, 51, 70, 78, 167, 178, 184, 197, 274, 294, 385, 386, 396

goedartella (Linnaeus, 1758) – égerbarka-aranymoly – 2, 15, 31, 45, 51, 52, 70, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 178, 183, 184, 194, 197, 221, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

pygmaeella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kecskefűzbarka-aranymoly – 2, 15, 51, 78, 126, 142, 167, 197, 301, 396, 421

= *rudolphella* (Esper, 1791) – 119

sorbiella (Treitschke, 1833) – madár-birs-aranymoly – 43, 45, 167

curvella (Linnaeus, 1761) – almabimbófűró aranymoly – 99, 134, 142, 167, 194, 197, 294, 297, 385, 396
 = *cornella* auct., nec Fabricius, 1775 – 2, 51, 78

retinella Zeller, 1839 – nyírfahajtás-aranymoly – 43, 51, 78, 142, 152, 167, 184, 220, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396

glaucinella Zeller, 1839 – tölgyfűró aranymoly – 2, 78, 142, 167, 178, 310, 386, 396

spinosella Stainton, 1849 – kökényvirág-aranymoly – 142, 152, 167, 177, 178, 189, 194, 294, 297, 310, 321, 363, 385, 386, 396, 421

= *mendica* auct., nec Hübner, 1796 – 2, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 119, 122, 134, 184

conjugella Zeller, 1839 – berkenyevirág-aranymoly – 11, 22, 26, 45, 51, 63, 78, 119, 142, 152, 167, 197, 232, 260, 274, 297, 310, 386, 396

semifusca (Haworth, 1828) – májusfa-aranymoly – 63, [301], 310

= *spiniella* Zeller, 1839 – 26, 31, 62

pruniella (Clerck, 1759) – meggyvirág-aranymoly – 5, 36, 45, 51, 52, 53, 63, 78, 119, 126, 142, 167, 178, 182, 184, 189, 197, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 310, 385, 386, 387, 396

= *ephippella* (Fabricius, 1777) – 2, 13, 15, 22, 23,

bonnetella (Linnaeus, 1758) – galagonya-fűró aranymoly – 119, 135, 142, 152, 167, 174, 177, 178, 184, 189, 220, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, [301], 310, 321, 333, 385, 386, 396

= *nitidella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 2, 13, 15, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 78

albistria (Haworth, 1828) – kökényfűró aranymoly – 2, 15, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 70, 77, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 310, 330, 385, 386, 387, 396

semitestacella (Curtis, 1833) – bükkfűró aranyfű – 5, 26, 45, 51, 63, 167, 294, 385, 386, 396

Plutellidae – Tarkamolylek

Plutella Schrank, 1802

xylostella (Linnaeus, 1758) – káposztamoly – 51, 52, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 296, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *maculipennis* Curtis, 1832 – 2, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 35, 36, 42, 45, 53, 59

porrectella (Linnaeus, 1758) – estikerágó tarkamoly – 2, 13, 15, 22, 23, 51, 119, 152, 167, 184, 221, 296, 386, 396

Rhigognostis Zeller, 1857

senilella (Zetterstedt, 1839) – ikravirág-tarkamoly – 15, 119, 193

incarnatella (Steudel, 1873)*³⁴ – hagymarágó tarkamoly – 63

kovacsi (Gozmány, 1952) – magyar tarkamoly – 2, 52, 70, 126, 178

hufnagelii (Zeller, 1839) – keresztes tarkamoly – 2, 13, 15, 22, 31, 51, 53, 77, 99, 119, 126, 134, 167, 184, 197, 221, 232, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 396

Eidophasia Stephens, 1842

messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840) – kakukktormamoly – 2, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 243, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

zukowskyi Amsel, 1938*³⁵ – ritka tarkamoly – 69, 360

Glyphipterigidae – Szakállas molyfélék

Orthoteliinae

Orthotelia Stephens, 1829

sparganella (Thunberg & Wenner, 1788) – békabuzogánymoly – 2, 35, 42, 51, 52, 59, 77, 134, 152, 178, 184, 197, 263, 274, 294, 301, 321, 385, 386, 387, 396

Glyphipteriginae

Glyphipterix Hübner, 1825

loricatella (Treitschke, 1833) – budai szakállasmoly – 1, 147, 166, 390 – FV (100 000 Ft)

thrasonella (Scolopi, 1763) – szittyófűró szakállasmoly – 1, 13, 15, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 122, 126, 142, 167, 178, 184, 220, 235, 301, 386, 387, 396

bergstraesserella (Fabricius, 1781) – perjeszittyó-szakállasmoly – 1, 13, 15, 22, 45, 52, 77, 78, 119, 178, 197, 386, 396

equitella (Scopoli, 1763) – varjúháj-szakállasmoly – 1, 35, 36, 77, 167, 177, 184, 189, 235, 280, 387, 396
= *majorella* Heinemann, 1876 – 1

haworthana (Stephens, 1834) – gyapjúsás-szakállasmoly – 1, 119

forsterella (Fabricius, 1781) – homoki szakállasmoly – 1, 45, 51, 52, 119, 167, 178, 301, 386, 396
= *albimaculella* Heinemann, 1877 – 1

pygmaeella Rebel, 1896*³⁶ – sötét szakállasmoly – 188, 195

simpliciella (Stephens, 1834) – ebir-szakállasmoly – 188, 195, 274

= *cramerella* auct., nec Fabricius 1781 – 1, 5, 51, 52, 78

= *nattani* Gozmány, 1954 – 1, 5, 52

Acrolepiinae

Digitivalva Gaedike, 1970

valeriella (Snellen, 1878) – peremizsevő tarkamoly – 2, 31, 35, 62, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 294, 297, 301, 385, 396

- arnicella* (Heyden, 1863)*³⁷ – árnikarágó tarkamoly – 26
reticulella (Hübner, [1796])*³⁸ – szalmagyopár-tarkamoly – 188, 195
 = *cariosella* (Treitschke, 1835) – [2]
perlepidella (Stainton, 1849)*³⁹ – látványos tarkamoly – 188, 195
pulicariae (Klimesch, 1956) – homályos tarkamoly – 26, 31, 51, 99, 174, 177, 178, 189, 232, 260, 280, 294, 297, 321, 385, 386, 396
granitella (Treitschke, 1833) – ökörszemlevél-tarkamoly – 2, 35, 184
Acrolepiopsis Gaedike, 1970
assectella (Zeller, 1839) – hagymavirág-tarkamoly (hagymamoly) – 26, 35, 51, 99, 126, 177, 183, 184, 189, 232, [301], 321, 385, 386, 396
tauricella (Staudinger, 1871)*⁴⁰ – fehérfoltos tarkamoly – 20, 25, 26, 35, 51, 396
 = *karolyii* (Szöcs, 1969) – 18
Acrolepia Curtis, 1838
autumnitella Curtis, 1838 – ebszőlő-tarkamoly – 178, 386
 = *pygmaeana* (Haworth, 1811) – 2, 13, 15, 20, 35, 49, 52, 77, 119

Ypsolophidae – Íveltszárnyú tarkamolyfélék

Ypsolophinae

Ypsolopha Latreille, 1796

- mucronella* (Scopoli, 1763) – kecskerágómoly – 2, 13, 15, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 333, 385, 386, 396
nemorella (Linnaeus, 1758) – csíkos loncmoly – 357
dentella (Fabricius, 1775) – fahéjszínű loncmoly – 99, 119, 126, 167, 184, 197, 280, 297, 301, 310, 386, 396
 = *xylostella* auct., nec Linnaeus, 1758 – 2, 22, 51, 53, 78
falcella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgarácú loncmoly – 2, 22, 23, 31, 78, 119, 135, 167, 197, 297, 396
asperella (Linnaeus, 1761) – levélfonó tarkamoly – 2, 13, 15, 31, 52, 119, 142, 167, 178, 263, 294, 301, 333, 385, 387, 396
scabrella (Linnaeus, 1761) – körtelevél-tarkamoly – 2, 13, 15, 22, 24, 31, 36, 45, 51, 53, 77, 78, 99, 119, 134, 142, 152, 167, 177, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
horridella (Treitschke, 1835) – kormos tarkamoly – 2, 15, 22, 62, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 184, 189, 197, 262, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396
lucella (Fabricius, 1775) – tölggyfonó tarkamoly – 2, 15, 42, 45, 51, 52, 99, 119, 167, 174, 178, 220, 280, 294, 310, 321, 333, 385, 386, 396
persicella (Fabricius, 1787) – őszibarack-tarkamoly – 2, 13, 15, 17, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 119, 134, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 385, 386, 396
alpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – okkersárga tarkamoly – 2, 24, 42, 45, 51, 53, 134, 135, 142, 167, 184, 197, 280, 294, 310, 321, 333, 385, 386, 396
sylvella (Linnaeus, 1767) – erdei tarkamoly – 2, 31, 36, 51, 52, 78, 134, 135, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 262, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396
parenthesella (Linnaeus, 1761) – gyertyánfonó tarkamoly – 2, 13, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 78, 119, 134, 135, 142, 167, 178, 189, 194, 197, 235, 262, 280, 294, 297, 385, 386, 396
ustella (Clerck, 1759) – csíkos tarkamoly – 119, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 194, 197, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396
 = *radiatella* (Donovan, 1794) – 2, 13, 15, 23, 31, 45, 51, 52, 59, 78
sequella (Clerck, 1759) – ligeti tarkamoly – 2, 13, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 53, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 396

vittella (Linnaeus, 1758) – füstös tarkamoly – 2, 13, 15, 45, 51, 53, 119, 134, 167, 184, 189, 197, 235, 243, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 396
chazariella (Mann, 1866) – juharfonó tarkamoly – 2, 13, 15, 22, 23, 52, 53, 78, 119, 135, 167, 178, 194, 197, 280, 301, 310, 321, 386, 396
leuconotella (Snellen, 1884) – fehérfejű tarkamoly – 252

Ochsenheimeriinae

***Ochsenheimeria* Hübner, 1825**

capella Möschler, 1860^{*41} – keleti vaskosmoly – 188, 195
taurella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsgyökér-vaskosmoly – 6, 13, 15, 51, 69, 119, 122, 178, 280, 294, 385, 396
urella Fischer von Röslerstamm, 1842^{*42} – alföldi vaskosmoly
= *bisontella* (Lienig & Zeller, 1846) – 6
vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842^{*43} – homoki vaskosmoly – 6, 77

Praydidae – Rügymolyfélék

***Atemelia* Herrich-Schäffer, 1853**

torquatella (Lienig & Zeller, 1846) – fehérfoltos nyírmoly – 1, 34, 35, 49, 51, 52, 122, 178, 294, 385, 396

***Prays* Hübner, 1825**

fraxinella (Bjerkander, 1784) – fehér kőrisrügymoly – 77, 119, 134, 142, 152, 167, 184, 194, 197, 294, 297, 301, 307, 310, 321, 385, 386, 387, 396
= *curtisella* (Donovan, 1793) – 1, 15, 22, 31, 45, 51, 52, 78
ruficeps (Heinemann, 1854) – sötét kőrisrügymoly – 175, 260, 280, 297, 301, 310, 321, 396
citri (Millière, 1873) – citromvirág-rügymoly (citromrügymoly, citromvirágmoly) – 389, 417

Heliodinidae – Aranyszárnyú-molylepkefélék

***Heliodines* Stainton, 1854**

roesella (Linnaeus, 1758)^{*44} – parajszövőmoly – 1, [13, 15], 51, 52, 178, 333, 396

Bedelliidae – Szulákmolyfélék

***Bedellia* Stainton, 1849**

ehikella Szöcs, 1967 – magyar szulákmoly – 20, 26, 35, 49, 50, 52, 182, 189, 235, 294, 385
somnulentella (Zeller, 1847) – közönséges szulákmoly – 2, 14, 20, 25, 31, 35, 36, 39, 45, 49, 51, 52, 53, 77, 119, 142, 167, 183, 184, 189, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Scythropiidae – Hálószerű molyfélék^{*45}

***Scythropia* Hübner, 1825**

crataegella (Linnaeus, 1767) – galagonya-pókhálómoly (pókhálós gyümölcsfamoly) – 1, 15, 22, 31, 35, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Lyonetiidae – Ezüstös fehér molyfélék^{*46}

Cemiostominae

***Leucoptera* Hübner, 1825**

lotella (Stainton, 1859) – lednekaknázó fehér moly – 2, 14, 35, 36, 39, 49, 50, 64, 189, 235, 294, 385, 430
onobrychidella Klimesch, 1937 – baltacimaknázó fehér moly – 20, 26, 35, 49, 430
lustratella (Herrich-Schäffer, [1855]) – orbáncfűragó fehér moly – 20, 26, 35, 50, 294, 385, 430

cytisiphagella Klimesch, 1938*⁴⁷ – erdeilednekező fehér moly – 2, 35, 36, 132, 189, 235, 430
laburnella (Stainton, 1851) – aranyesőrágó fehér moly – 2, 14, 35, 49, 280, 294, 301, 385, 430
 = *wailesella* (Stainton, 1858) – 2, 32, 34, 35, 39, 40, 50
spartifoliella (Hübner, [1813]) – seprőzanótevő fehér moly – 2, 35, 45, 51, 52, 59, 178, 386, 396, 430
genistae (M. Hering, 1933) – rekettyerágó fehér moly – 132, 430
lathyrifoliella (Stainton, 1866) – angol fehér moly – 301, 306, 430
malifoliella (O. Costa, 1836) – lombosfalakó fehér moly – 77, 126, 135, 167, 184, 189, 235, 310, 321, 330, 333, 386, 430
 = *scitella* (Zeller, 1839) – 2, 14, 20, 33, 34, 35, 36, 49, 60, 64, 78
heringiella Toll, 1938*⁴⁸ – zánótnázó fehér moly – 2, 35, 178, 430
aceris (Fuchs, 1903) – juharaknázó fehér moly – 14, 25, 26, 35, 49, 51, 310, 396, 430
sinuella (Reutti, 1853) – nyáaraknázó fehér moly – 2, 20, 32, 35, 52, 64, 77, 178, 430

Lyonetiinae

***Lyonetia* Hübner, 1825**

clerkella (Linnaeus, 1758) – kígyóaknás ezüstmoly – 6, 14, 20, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 60, 77, 126, 167, 184, 189, 232, 235, 274, 294, 297, 301, 310, 333, 385, 386, 387, 396
prunifoliella (Hübner, [1796]) – rózsalevél-ezüstmoly – 6, 35, 36, 51, 189, 235, 280, 297, 310, 321, 396

Gracillarioidae

Roeslerstammiidae – Bronzmolyfélék

***Roeslerstammia* Zeller, 1839**

erxlebelli (Fabricius, 1787) – zöldes bronzmoly – 119, 134, 167, 178, 197, 232, 262, 294, 297, 385, 386, 396
 [„*erxlebeniella* F.” – 1, 5, 23, 31, 35, 51, 52, 78 – erroneous]
pronubella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnaöves bronzmoly – 1, 5, 13, 15, 22, 45, 51, 52, 119, 178, 197, 294, 297, 385, 386, 396

Bucculatricidae – Szemtakarós-bordásmolyfélék

***Bucculatrix* Zeller, 1839**

crisatella (Zeller, 1839) – cickafark-bordásmoly – 20, 26, 35, 49, 280, 294, 310, 385
nigricomella (Zeller, 1839) – feketefejű bordásmoly – 2, 35, 386
benacicolella Hartig, 1937 – selymes bordásmoly – 16, 20, 26, 35, 36, 50, 174, 189, 235, 294, 385, 396
artemisiella Herrich-Schäffer, [1855] – ürömrágó bordásmoly – 20, 35, 77, 183, 184, 301
 = *artemisiae* auct. – 2, 49, 64
frangutella (Goeze, 1783) – mocsári bordásmoly – 178, 184, 189, 235, 280, 294, 301, 385, 386, 387, 396
 = *frangulella* Herrich-Schäffer, 1855 – 2, 16, 20, 25, 32, 33, 35, 36, 49, 51, 59, 64, 77
albedinella (Zeller, 1839) – szilaknázó bordásmoly – 2, 20, 33, 35, 36, 40, 49, 51, 52, 53, 99, 134, 142, 152, 167, 178, 184, 189, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 396
demaryella (Duponchel, 1840) – mogyorós bordásmoly – 33, 34, 35, 40, 47, 189, 235
bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805) – galagonya-bordásmoly – 2, 16, 20, 25, 32, 34, 36, 51, 52, 134, 178, 189, 235, 294, 301, 307, 385, 396
 = *crataegi* (Zeller, 1839) – 33, 35, 40, 49, 50, 64, 77
maritima Stainton, 1851 – sziki bordásmoly – 2, 34, 35, 49, 77, 178, 183, 184, 301
argentsignella Herrich-Schäffer, [1855] – ezüstmintás bordásmoly – 261
ratibonensis Stainton, 1861*⁴⁹ – homályos bordásmoly – 2
pannonica Deschka, 1982 – pannon bordásmoly – 261, 301
nottei Petry, 1912 – feketeüröm-bordásmoly – 20, 26, 35, 39, 40, 49, 50, 64, 152, 178, 184, 294, 307, 385
absinthii Gartner, 1865 – fehérüröm-bordásmoly – 2, 35, 152, 184, 301

- gnaphaliella* (Treitschke, 1833) – homoki bordásmoly – 2, 35, 184, 294, 385
cidarella (Zeller, 1839) – égerrágó bordásmoly – 2, 20, 35, 40, 52, 64, 77, 178, 387
cantabricella Chrétien, 1898 – szulákrágó bordásmoly – 14, 16, 25, 26, 35, 36, 49, 50, 51, 189, 235, 294, 385, 396
thoracella (Thunberg & Wenner, 1794) – hársaknázó bordásmoly – 2, 20, 25, 33, 35, 36, 39, 45, 49, 51, 52, 53, 78, 99, 134, 167, 178, 189, 235, 263, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396
ulmella Zeller, 1848 – erdei bordásmoly – 2, 20, 34, 35, 39, 51, 52, 53, 78, 142, 178, 184, 301, 310, 321, 333, 396
ulmifoliae M. Hering, 1931 – szilrágó bordásmoly – 2, 20, 33, 35, 49, 50, 189, 294, 385
ulmicola Kuznetzov, 1962 – hegyiszilfa-bordásmoly – 432
regaella Chrétien, 1907*⁵⁰ – déli bordásmoly – 385
 [herbalbella Chrétien, 1915 – 261, 294 – misidentification]
humiliella Herrich-Schäffer, [1855] – régensburgi bordásmoly – 306, 307

Gracillariidae – Keskenyszárnyú molylepkefélék

Gracillariinae

Parectopa Clemens, 1860

- ononidis* (Zeller, 1839) – iglicelevél-hólyagosmoly – 2, 5, 35, 36, 59, 78, 99, 142, 152, 167, 178, 184, 189, 235, 260, 280, 294, 301, 333, 385, 396
robiniella Clemens, 1863 – akáclevél-hólyagosmoly – 79, 99, 104, 126, 142, 167, 177, 178, 189, 194, 232, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 303, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Micrurapteryx Spuler, 1910

- kollariella* (Zeller, 1839) – zanótaknázó hólyagosmoly – 2, 14, 20, 25, 35, 36, 49, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 126, 167, 174, 178, 189, 235, 280, 294, 297, 307, 310, 321, 385, 387, 396

Aristaea Meyrick, 1907

- pavoniella* (Zeller, 1847) – őszirózsa-hólyagosmoly – 320

Caloptilia Hübner, 1825

- honoratella* (Rebel, 1914) – sárgafejű keskenymoly – 68, 178, 301
cuculipennella (Hübner, [1796]) – fagyalaknázó keskenymoly – 2, 35, 52, 167, 178, 232, 297, 307, 387, 396
populetorum (Zeller, 1839) – nyírfa-keskenymoly – 225, 231, 301
roscipennella (Hübner, [1796]) – diógöngyölő keskenymoly – 2, 14, 22, 31, 35, 36, 51, 53, 77, 126, 167, 184, 189, 194, 220, 232, 235, 260, 274, 297, 301, 310, 321, 386, 387, 396
elongella (Linnaeus, 1761) – égerrágó keskenymoly – 2, 35, 36, 45, 52, 70, 142, 167, 178, 184, 189, 235, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396
falconipennella (Hübner, [1813]) – égergöngyölő keskenymoly – 20, 26, 35, 45, 52, 77, 142, 167, 178, 189, 235, 297, 386, 387, 396
 = *oneratella* (Zeller, 1847) – 2, 36, 59,
rufipennella (Hübner, [1796]) – juharlevél-keskenymoly – 26, 35, 52, 178, 386, 396
alchimiella (Scopoli, 1763) – tölgögöngyölő keskenymoly – 2, 22, 23, 31, 35, 36, 45, 51, 52, 59, 78, 87, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
azaleella (Brants, 1913)*⁵¹ – hangarózsa-keskenymoly – Am – 309, 310, 321, 333, 363, 387, 396
 = *rhodinella* Herrich-Schäffer, 1855 (pirosas keskenymoly) – 195, 224
robustella Jäckh, 1972 – kerekfoltú keskenymoly – 119, 294, 297, 385, 396
semifascia (Haworth, 1828) – mezeijuhar-keskenymoly – 2, 35, 52, 152, 178, 294, 310, 321, 385, 396
 = *onustella* auct., nec Hübner [1813]

- stigmatella* (Fabricius, 1781) – függőgyölő keskenymoly – 2, 14, 31, 35, 36, 45, 49, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 122, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- fribergensis* (Fritzsche, 1871) – szélesfoltú keskenymoly – 2, 13, 14, 15, 35, 36, 45, 51, 119, 178, 184, 189, 235, 307, 386, 396
- hemidactylella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – juhargöngyölő keskenymoly – 2, 15, 35, 51, 52, 53, 77, 119, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 260, 280, 294, 297, 307, 310, 321, 333, 385, 386, 396
- fidella* (Reutti, 1853) – komlógöngyölő keskenymoly – 2, 35, 36, 51, 53, 77, 152, 178, 184, 189, 220, 232, 235, 260, 297, 301, 307, 310, 321, 396
- jurateae* Bengtsson, 2010 – korai-juhar keskenymoly – 447
- hauderi* (Rebel, 1906) – sárgatükrű keskenymoly – 2, 35, 52, 167, 178, 260, 296, 386, 396
- Gracillaria*** Haworth, 1828
- loriolella* (Frey, 1881) – északi keskenymoly – 30, 321, 396
= *norvegiellum* (Wocke, 1893) – 26
- syringella* (Fabricius, 1794) – orgona-keskenymoly – 2, 14, 15, 99, 119, 126, 134, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 235, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
= *anastomosis* Haworth, 1828 – 5, 31, 33, 35, 36, 39, 49, 51, 52, 53, 64, 77, 78
- Aspilapteryx*** Spuler, 1910
- limosella* (Duponchel, 1844) – gamandor-keskenymoly – 2, 15, 20, 31, 35, 49, 50, 51, 52, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 280, 294, 297, 310, 321, 330, 385, 387, 396
- tringipennella* (Zeller, 1839) – útifű-keskenymoly – 2, 31, 35, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 142, 152, 167, 178, 184, 189, 194, 221, 232, 235, 260, 274, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- Euspilapteryx*** Stephens, 1835
- auroguttella* Stephens, 1835 – orbáncfű-keskenymoly – 2, 20, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 45, 49, 51, 52, 59, 78, 99, 142, 152, 167, 178, 184, 189, 194, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- Calybites*** Hübner, 1822
- phasianipennella* (Hübner, [1813]) – lóromaknázó keskenymoly – 2, 14, 17, 22, 31, 35, 36, 39, 51, 52, 64, 70, 77, 99, 119, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
- quadrisignella* (Zeller, 1839) – bengeaknázó keskenymoly – 33, 47, 62, 126, 134, 167, 189, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 307, 321, 333, 385, 387, 396
- Povolnya*** Kuznetsov, 1979
- leucapennella* (Stephens, 1835)*⁵² – kénszínű keskenymoly – 178, 188, 195
= *sulphurella* (Haworth, 1828) – 2, 5
- Sauterina*** Kuznetsov, 1979
- hofmanniella* (Schleich, 1867) – lednekaknázó hólyagosmoly – 2, 35, 36, 51, 52, 152, 178, 189, 220, 235, 301, 396
- Acrocercops*** Wallengren, 1881
- brongniardella* (Fabricius, 1798) – tölgyaknázó hólyagosmoly – 2, 13, 15, 35, 49, 52, 99, 119, 142, 177, 178, 189, 232, 297, 310, 321, 333, 386, 396
- Dialectica*** Walsingham, 1897
- imperialella* (Zeller, 1847) – nadálytő-hólyagosmoly – 2, 35, 36, 51, 52, 77, 167, 178, 189, 235, 260, 297, 301, 386, 387, 396
- soffneri* (Gregor & Povolný, 1965) – délvidéki hólyagosmoly – 151
- scalariella* (Zeller, 1850) – kígyószisz keskenymoly – 447
- Spulerina*** Vári, 1961
- simploniella* (Fischer von Röslerstamm, 1840) – tölgyhajtás-keskenymoly – 2, 14, 35, 36, 49, 52, 62, 142, 178, 189, 235, 301, 396
- Leucospilapteryx*** Spuler, 1910
- omissella* (Stainton, 1848) – ürömaknázó hólyagosmoly – 2, 14, 35, 77, 184, 321, 386, 396

Orniginae***Ornixola*** Kuznetzov, 1979

caudulatella (Zeller, 1839) – farkos keskenymoly – 2, 35, 36, 51, 52, 59, 126, 142, 167, 178, 177, 184, 189, 194, 197, 235, 260, 262, 274, 297, 301, 321, 386, 387, 396

Callisto Stephens, 1834

denticulella (Thunberg & Wenner, 1794) – almalevél-hólyagomoly – 2, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 49, 51, 52, 53, 59, 99, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 232, 235, 280, 297, 301, 310, 321, 386, 396

Parornix Spuler, 1910

anguliferella (Zeller, 1847) – körteráncoló keskenymoly – 2, 14, 31, 32, 33, 35, 36, 45, 49, 51, 52, 53, 78, 142, 167, 177, 178, 189, 220, 235, 260, 280, 310, 321, 333, 386, 396

tenella (Rebel, 1919) – sötétbarna keskenymoly – 68, 174, 184, 294, 385, 396

finitimella (Zeller, 1850) – kökényráncoló keskenymoly – 2, 32, 35, 39, 49, 52, 60, 119, 178, 184, 274, 301, 385

szoecsi Gozmány, 1952 – magyar keskenymoly – 2, 33, 34, 49, 184, 189, 294, 385, 386

fagivora (Frey, 1861) – bükkráncoló keskenymoly – 2, 13, 15, 35, 36, 119, 189, 235

carpinella (Frey, 1863) – gyertyánráncoló keskenymoly – 5, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 52, 178, 189, 235, 294, 301, 385

= *eppelsheimi* (Fuchs, 1901) – [2]

anglicella (Stainton, 1850) – galagonya-keskenymoly – 2, 14, 15, 32, 35, 36, 49, 50, 52, 64, 77, 119, 126, 134, 167, 178, 184, 189, 235, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396

devoniella (Stainton, 1850) – mogyoró-keskenymoly – 189, 294, 385, 396

= *avellanella* (Stainton, 1854) – 2, 14, 25, 32, 33, 35, 36, 50, 51, 60, 235,

betulae (Stainton, 1854) – nyírráncoló keskenymoly – 2, 20, 25, 32, 35, 45, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 78, 142, 167, 178, 184, 294, 301, 385, 386, 396

scoticella (Stainton, 1850) – berkenye-keskenymoly – 2, 15, 35, 36, 51, 52, 53, 77, 126, 167, 178, 184, 189, 235, 301, 396

petiolella (Frey, 1863) – almalevél-keskenymoly – 2, 15, 20, 33, 35, 36, 45, 49, 52, 119, 178, 182, 189, 235, 294, 307, 385, 386

torquillella (Zeller, 1850) – almaráncoló keskenymoly – 2, 14, 35, 36, 49, 52, 119, 178, 189, 235, 294, 301

Lithocolletinae***Phyllonorycter*** Hübner, 1822 (= *Lithocolletis* Hübner, 1825)

harrisella (Linnaeus, 1761) – tölgylevél-sátorosmoly – 5, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 64, 77, 167, 178, 184, 189, 235, 294, 310, 363, 385, 386, 396

= *cramerella* (Fabricius, 1777) – 2, 14

delitella (Duponchel, 1844) – fákó sátorosmoly – 2, 14, 25, 33, 35, 36, 40, 49, 51, 189, 235, 294, 385, 396

quercifoliella (Zeller, 1839) – közönséges sátorosmoly – 2, 14, 20, 22, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 63, 77, 78, 174, 178, 184, 189, 197, 235, 294, 321, 385, 386, 396

cerris (Gregor, 1952) – csertölgylevél-sátorosmoly – [35], 39, 420, 432

ilicifoliella (Duponchel, 1843) – magyalaknázó sátorosmoly – 2, 14, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 60, 189, 197, 235, 294, 385, 396

messaniella (Zeller, 1846) – gesztenye-sátorosmoly – 2, 14, 35, 36, 189, 235, 321

roboris (Zeller, 1839) – tölgyaknázó sátorosmoly – 2, 14, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 64, 77, 99, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 235, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396

abrasella (Duponchel, 1843) – cseraknázó sátorosmoly – 2, 13, 14, 15, 22, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 99, 119, 167, 178, 184, 189, 197, 235, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 396

distentella (Zeller, 1846) – tölglyfa-sátorosmoly – 20, 26, 35, 49, 280, 396

- mannii* (Zeller, 1846) – mogoró-sátorosmoly – 2, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 178, 184, 189, 235, 274, 294, 385
- maestingella* (Müller, 1764) – bükklevél-sátorosmoly – 77, 142, 167, 189, 235, 274, 321, 386, 396
= *faginella* (Zeller, 1846) – 2, 14, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 45, 49, 51, 60, 64
- lautella* (Zeller, 1846) – hegyi sátorosmoly – 20, 25, 26, 35, 36, 40, 49, 51, 178, 189, 235, 280, 396
- muelleriella* (Zeller, 1839) – tölgyfalevél-sátorosmoly – 2, 14, 12, 35, 51, 178, 189, 396
- heegeriella* (Zeller, 1846) – kocsányostölgy-sátorosmoly – 2, 32, 35, 178, 197
- scitulella* (Duponchel, 1843) – sárgafejű sátorosmoly – 2, 16, 20, 25, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 178, 178, 189, 235, 294, 385, 396
- parisiella* (Wocke, 1848) – kardsávú sátorosmoly – 2, 16, 20, 33, 35, 36, 49, 50, 51, 135, 167, 189, 235, 294, 297, 310, 385, 396
- kuhlweiniella* (Zeller, 1839) – tarka sátorosmoly – 235, 294, 301, 385
= *hortella* (Fabricius, 1794) – 2, 14, 20, 25, 35, 36, 49, 50, 51, 53
= *saportella* (Duponchel, 1840) – 174, 184, 189, 235, 297, 396
- tenerella* (De Joannis, 1915) – gyertyánaknázó sátorosmoly – 2, 14, 16, 35, 36, 39, 39, 40, 45, 49, 50, 51, 184, 189, 235, 274, 294, 310, 385, 386, 396
- strigulatella* (Zeller, 1846) – hamvaséger-sátorosmoly – 2, 35, 77, 231
- rajella* (Linnaeus, 1758) – enyveséger-sátorosmoly – 26, 32, 34, 35, 52, 59, 60, 77, 178
- coryli* (Nicelli, 1851) – mogorólevél-sátorosmoly – 2, 14, 32, 33, 35, 36, 40, 49, 184, 189, 235, 396
- esperella* (Goeze, 1783) – gyertyán-sátorosmoly – 189, 235, 294, 385, 396
= *quinnata* (Fourcroy, 1785) – 2, 14, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 50, 51, 60,
- corylifoliella* (Hübner, [1796]) – almalevél-sátorosmoly – 2, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 64, 77, 184, 189, 235, 263, 294, 297, 310, 321, 385, 396, 421
= *betulae* (Zeller, 1839) – 2, 53
- leucographella* (Zeller, 1850) – tűztövis-sátorosmoly – 111, 297, 386, 396, 421
- cavella* (Zeller, 1846) – szőrösnyr-sátorosmoly – 20, 26, 35, 60, 310
- ulmifoliella* (Hübner, [1817]) – nyírlevél-sátorosmoly – 2, 14, 20, 25, 32, 35, 36, 40, 49, 50, 51, 60, 189, 197, 235, 274, 294, 321, 385, 396
- stettinensis* (Nicelli, 1852) – égerlakó sátorosmoly – 2, 14, 35, 36, 39, 40, 60, 64, 77, 189, 235, 387
- klemannella* (Fabricius, 1781) – láperdei sátorosmoly – 2, 14, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 50, 51, 52, 60, 64, 70, 77, 167, 178, 184, 189, 235, 294, 321, 385, 387, 396
- froelichiella* (Zeller, 1839) – mocsári sátorosmoly – 2, 14, 32, 33, 35, 36, 50, 52, 60, 64, 77, 126, 178, 189, 235, 294, 385, 387, 396
- nicellii* (Stainton, 1851) – mogoróaknázó sátorosmoly – 2, 14, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 60, 64, 77, 78, 189, 235, 294, 385, 396
- schreberella* (Fabricius, 1781) – szilaknázó sátorosmoly – 2, 14, 33, 34, 35, 36, 39, 49, 51, 122, 184, 189, 235, 387, 396
- agilella* (Zeller, 1846) – füstös sátorosmoly – 2, 14, 19, 31, 49, 64, 77
- tristrigella* (Haworth, 1828) – háromsávú sátorosmoly – 2, 19, 25, 33, 35, 51, 77, 119, 126, 184, 189, 235, 321, 396
- acaciella* (Duponchel, 1843) – magyar sátorosmoly – 2, 14, 35, 51, 122, 396
- emberizaepennella* (Bouché, 1834) – loncanknázó sátorosmoly – 2, 14, 35, 36, 49, 51, 152, 178, 189, 235, 321, 396
- scabiosella* (Douglas, 1853) – ördög szem-sátorosmoly – 320, 321, 396
- cerasinella* (Reutti, 1853) – száraknázó sátorosmoly – 2
- lantanellella* (Schränk, 1802) – bangitárógó sátorosmoly – 2, 14, 16, 25, 35, 36, 49, 51, 189, 235, 274, 396
- spinicolella* (Zeller, 1846) – kökényes-sátorosmoly – 2, 16, 20, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 53, 60, 64, 189, 235, 274, 294, 385, 396
= *pomonella* sensu auct., nec Zeller, 1846 – 77, 126, 184, 310
- cerasicolella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – cseresznye-sátorosmoly – 2, 14, 29, 33, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 78, 294, 385

- = *persicella* (Steudel, 1882) – 2, 5,
blancardella (Fabricius, 1781) – almalevélnázó sátorosmoly – 16, 25, 26, 32, 33, 35, 36, 39, 40,
 49, 50, 51, 52, 68, 126, 135, 142, 178, 189, 235, 274, 294, 297, 310, 321, 385, 396
gerasimowi (M. Hering, 1930) – ékfoltos sátorosmoly – 95
 = *pyrifoliella* (Gerasimov, 1933) – 330
mespilella (Hübner, [1805]) – naspolya-sátorosmoly – 2, 5, 35, 119, 184, 294, 385, 386
 = *pomifoliella* (Zeller, 1839) – 2, 5, 13, 14, 15, 68
millierella (Staudinger, 1871) – ostorfa-sátorosmoly – 368
oxyacanthae (Frey, 1855) – kökénylevél-sátorosmoly – 2, 14, 16, 20, 25, 26, 32, 35, 36, 49, 50, 51,
 64, 77, 122, 189, 235, 274, 294, 321, 385, 396
cydoniella ([Denis & Schiff.], 1775) – birslevél-sátorosmoly – 2, 14, 35, 51, 52, 178, 301, 396
sorbi (Frey, 1855) – berkenye-sátorosmoly – 2, 16, 25, 32, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 63, 77, 178, 189,
 235, 294, 385, 396
 = *padella* (Glitz, 1863) – 51
populifoliella (Treitschke, 1833) – feketenyár-sátorosmoly – 2, 14, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 49, 51, 53,
 60, 64, 77, 122, 152, 167, 184, 189, 194, 235, 274, 297, 310, 386, 387, 396
pastorella (Zeller, 1846) – kormos sátorosmoly – 2, 14, 20, 35, 36, 39, 40, 49, 60, 64, 77, 152, 189,
 235, 274, 387
sagitella (Bjerkander, 1790) – rezgőnyár-sátorosmoly – 178, 294, 301, 385
 = *tremulae* (Zeller, 1846) – 2, 14, 25, 35, 49, 50, 52, 60
comparella (Duponchel, 1843) – fehérnyár-sátorosmoly – 2, 14, 35, 36, 39, 49, 64, 77, 126, 189,
 235, 274, 387, 396
apparella (Herrich-Schäffer, [1855]) – nyárfalevél-sátorosmoly – 20, 26, 35, 49, 51, 330, 396
connexella (Zeller, 1846) – lápi sátorosmoly – 2, 14, 20, 35, 39, 40, 49, 60, 64, 77, 184, 330, 386, 387
dubitella (Herrich-Schäffer, [1855]) – füzeslakó sátorosmoly – 2, 14, 25, 32, 34, 35, 39, 40, 50, 51,
 60, 178, 184, 294, 333, 385, 396
salictella (Zeller, 1846) – füzligeti sátorosmoly – 2, 20, 35, 36, 39, 49, 50, 60, 189, 235, 294, 385
 = *viminiella* (Sircom, 1848) – 20, 26, 35, 39
 [= *viminetorum* (Stainton, 1854) – 36, 189, 235 – erroneous; misidentification]
hilarella (Zetterstedt, 1839) – kecskefűzlevél-sátorosmoly – 189, 235, 294, 385, 396
 = *spinolella* (Duponchel, 1840) – 2, 14, 32, 35, 36, 39, 49, 50, 51, 78, 99
salicicolella (Sircom, 1848) – kecskefűz-sátorosmoly – 2, 14, 35, 64, 77, 387
quinqueguttella (Stainton, 1851) – cinegefűz-sátorosmoly – 2, 14, 35, 49, 57, 77, 387
platani (Staudinger, 1870) – platánlevél-sátorosmoly – 2, 14, 33, 35, 36, 39, 49, 51, 52, 178, 189,
 235, 260, 280, 387, 396
acerifoliella (Zeller, 1839) – juharaknázó sátorosmoly – 2, 14, 16, 25, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51,
 52, 53, 60, 64, 78, 126, 167, 178, 189, 232, 235, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 396
 = *sylvella* Haworth, 1828 – 77, 122, 184
joannisi (Le Marchand, 1936) – koraijuhar-sátorosmoly – 294, 385
 = *platanoidella* (Joannis, 1920) nec Braun, 1908 – 238
geniculella (Ragonot, 1874) – hegyjuhar-sátorosmoly
 = *acernella* Zeller, 1846 nec Duponchel, 1843 – 2, 14, 35, 39, 40, 49
issikii (Kumata, 1963) – hárslevél-sátorosmoly – 208, 214, 231, 280, 297, 307, 310, 321, 385, 386,
 387, 396
medicaginella (Gerasimov, 1930) – somkóró-sátorosmoly – 25, 26, 49, 50, 51, 274, 294, 385, 396
 = *medicaginis* auct. – 35, [50]
insignitella (Zeller, 1846) – lóhere-sátorosmoly – 25, 26, 35, 36, 40, 49, 51, 189, 235, 396
fraxinella (Zeller, 1846) – rekettyelevél-sátorosmoly – 2, 35, 36, 189, 235
staintoniella (Nicelli, 1853) – zanótlakó sátorosmoly
 = *desertella* (Gregor & Povolný, 1949) – 20, 26, 35, 49
eugregori A. & Z. Laštůvka, 2006 – közép-európai sátorosmoly – 229, 238
nigrescentella (Logan, 1851) – hereaknázó sátorosmoly – 2, 25, 35, 36, 39, 51, 184, 189, 235, 396

Macrosaccus Davis & De Prins, 2011

robiniella (Clemens, 1859) – akácleveél-sátorosmoly – 155, 161, 167, 177, 189, 194, 232, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Triberta De Prins, Davis, Coninck, Sohn & Triberti 2013

helianthemella (Herrich-Schäffer, 1860) – napvirág-sátorosmoly – 14, 26, 35, 49

Cameraria Chapman, 1902

ohridella Deschka & Dimić, 1986 – vadgesztenye-sátorosmoly – Inv – 137, 142, 152, 156, 174, 177, 178, 189, 194, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

Phyllocnistinae**Phyllocnistis** Zeller, 1848

saligna (Zeller, 1839) – kígyóaknás fűzmoly – 2, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 49, 77, 126, 178, 184, 189, 235, 274, 333, 387

labyrinthella (Bjerkander, 1790) – kígyóaknás rezgőnyármoly – 2, 35, 77, 126, 396, 421

xenia M. Hering, 1936 – kígyóaknás fehérnyármoly – 2, 14, 35, 36, 39, 49, 64, 189, 274

unipunctella (Stephens, 1834) – kígyóaknás feketenyármoly – 77, 152, 184, 189, 235, 274, 301, 333, 387, 396

= *suffusella* (Zeller, 1847) – 2, 14, 25, 35, 36, 39, 49, 51, 64

vitegenella Clemens, 1859 – kígyóaknás szőlőmoly – Am? – 323, 332, 334, 349, 385, 396, 421

citrella Stainton, 1856 – kígyóaknás citromlevélmoly – 402, 431

valentinensis M. Hering, 1936 – szegélyaknás fűzmoly – 408

Douglasiidae – Legyezősmoly-félék**Tinagma** Zeller, 1839

perdicella Zeller, 1839 – földieper-legyezősmoly – 1, 13, 14, 15, 35, 51, 52, 53, 78, 99, 119, 134, 178, 184, 189, 235, 260, 294, 385, 396

ocnerostomella (Stainton, 1850) – kígyószisz-legyezősmoly – 1, 182, 183, 184, 294, 301, 385

anchusella (Benander, 1936) – atracél-legyezősmoly – 275, 279

balteolella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – ólomszürke legyezősmoly – 1, 167, 174, 184, 294, 310, 385

Klimeschia Amsel, 1938

transversella (Zeller, 1839) – kakukkfű-legyezősmoly – 1, 13, 15, 119, 174, 184, 294, 301, 385, 396

Choreutidae**Choreutidae – Levélmolyfélék****Millierinae****Millieria** Ragonot, 1874

dolosalis (Heydenreich, 1851)*⁵³ – farkasalmamoly – 36, 126, 167, 189, 235, 260, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396

= *dolosana* (Herrich-Schäffer, 1854) – 1, 35, 49

Choreutinae**Anthophila** Haworth, 1811

fabriciana (Linnaeus, 1767) – lápréti levélmoly – 1, 13, 15, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 126, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 274, 294, 297, 385, 386, 387, 396, 421

Prochoreutis Diakonoff & Heppner, 1980

myllerana (Fabricius, 1794) – pompás levélmoly – 1, 13, 15, 22, 51, 52, 78, 119, 152, 178, 183, 184, 260, 301, 321, 386, 396, 421
sehestediana (Fabricius, 1776) – seprence-levélmoly – 119
 = *punctosa* (Haworth, 1811) – 1, 13, 15
stellaris (Zeller, 1847) – csukóka-levélmoly – 1, 294, 385

***Tebenna* Billberg, 1820**

bjer kandrella (Thunberg & Borgstroem, 1784) – fészkesviráglakó levélmoly – 104, 168, 385
micalis (Mann, 1857)*⁵⁴ – déli levélmoly – 1, 178

***Choreutis* Hübner, 1825**

pariana (Clerck, 1759) – őszi levélmoly (alma őszi-levélmoly) – 1, 14, 15, 31, 51, 52, 77, 119, 178, 235, 282, 333, 363, 396
nemorana (Hübner, [1799]) – füge-levélmoly (ligeti levélmoly) – 1, 282, 310, 342, 356, 393, 396, 421

U r o d o i d e a

Urodidae – Nyárfamolyfélék

***Wockia* Heinemann, 1870**

asperipunctella (Bruand, 1850) – szürke nyárfamoly – 61, 70, 142, 167, 178, 184, 211, 301, 330, 333, 387, 396

C a r p o s i n o i d e a

Carposinidae – Bogyórágómolyfélék

***Carposina* Herrich-Schäffer, 1853**

berberidella Herrich-Schäffer, [1854] – borbolyamoly – 5, 88, 134, 184, 294, 385, 396
scirrhosella Herrich-Schäffer, [1854] – közönséges csipkebogyómoly – 5, 14, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 53, 77, 78, 99, 119, 134, 167, 177, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

A l u c i t o i d e a

Alucitidae – Soktollúmolyfélék

***Alucita* Linnaeus, 1758**

cymatodactyla Zeller, 1852 – nagy soktollúmoly – 1, 31, 36, 184, 189, 235, 269
hexadactyla (Linnaeus, 1758) – kis soktollúmoly – 1, 15, 23, 35, 119, 211, 269
huebneri Wallengren, 1859 – imolavirág-soktollúmoly – 1, 31, 35, 269
grammodactyla Zeller, 1841 – ördögzem-soktollúmoly – 1, 13, 22, 23, 35, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 211, 232, 260, 269, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 321, 333, 385, 387, 396
palodactyla Zeller, 1847 – szicíliai soktollúmoly – 265, 269
desmodactyla Zeller, 1847 – tisztesfű-soktollúmoly – 1, 5, 13, 15, 36, 51, 52, 119, 126, 134, 167, 177, 178, 184, 189, 211, 235, 269, 294, 333, 385, 396
 = *flavidactyla* Toll, 1936 – (sárga soktollúmoly) – 1, 5, 15, 51

***Pterotopteryx* Hannemann, 1959**

dodecadactyla (Hübner, [1813]) – loncduzzasztó soktollúmoly – 1, 15, 35, 52, 119, 126, 269, 386

P t e r o p h o r o i d e a

Pterophoridae – Tollasmolyfélék

Agdistinae**Agdistis** Hübner, 1825

adactyla (Hübner, [1819]) – közönséges egytollúmoly – 4, 23, 51, 59, 74, 77, 119, 122, 123, 126, 142, 167, 170, 177, 178, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396

heydeni (Zeller, 1852) – Heyden egytollúmolya – 120, 170, 385

intermedia Caradja, 1920 – pusztai egytollúmoly – 170, 183, 204, 211, 301 – V (10 000 Ft)
= *hungarica* Amsel, 1955 – 4, 5

tamaricis (Zeller, 1847) – tamariska-egytollúmoly – 150, 170, 184

Platyptilinae**Platyptilia** Hübner, 1825

gonodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ékmintás tollasmoly – 4, 13, 15, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 78, 119, 123, 126, 167, 178, 184, 189, 194, 201, 211, 235, 262, 274, 280, 294, 297, 385, 386, 396

nemoralis (Zeller, 1841) – berki tollasmoly – 4, 15, 22, 35, 45, 52, 77, 119, 123, 167, 201, 211, 386, 387

farfarellus (Zeller, 1867) – aggófű-tollasmoly – 4, 152, 201, 294, 385, 396

tesseradactyla (Linnaeus, 1761) – barnásfehér tollasmoly – 4, 13, 15, 119, 123, 201, 386

Buszkoiana Koçak, 1981

capnodactylus (Zeller, 1841) – acsalapu-tollasmoly („*kocsordfonó tollasmoly*” – wrong name) – 167, 201

Gillmeria Tutt, 1905

pallidactyla (Haworth, [1811]) – fakósárga tollasmoly – 4, 15, 119, 123, 184, 201, 260, 294, 333, 385, 387, 396

ochrodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) – okkersárga tollasmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 78, 119, 123, 134, 135, 184, 274, 294, 385

= *tetradactyla* auct. – 126, 142, 167, 189, 201, 211, 232, 235, 280, 297, 310, 321, 386, 396

miantodactylus (Zeller, 1841) – balkáni tollasmoly – 4, 201, 301, 302

Amblyptilia Hübner, 1825

acanthadactyla (Hübner, [1813]) – díszes tollasmoly – 123, 178, 189, 201, 211, 235, 235, 333, 387

punctidactyla (Haworth, [1811]) – pettyesszárnú tollasmoly – 51, 52, 77, 178, 189, 201, 235, 235, 271, 296, 297, 396

= *cosmodactyla* (Hübner, 1819) – 4

Stenoptilia Hübner, 1825

pterodactyla (Linnaeus, 1761) – fahéjbarna tollasmoly – 4, 13, 15, 31, 36, 45, 51, 52, 77, 78, 119, 123, 134, 142, 167, 171, 178, 184, 189, 201, 211, 227, 235, 294, 385, 386, 387, 396

= *paludicola* Wallengren, 1862 – 67

stigmatodactylus (Zeller, 1852) – ördög szem-tollasmoly – 4, 22, 51, 53, 77, 123, 134, 167, 171, 184, 189, 201, 211, 227, 235, 280, 294, 310, 385, 386, 396

eborinodactyla Zagulajev, 1986 – csikorgófű-tollasmoly –

= *gratiolae* Gibeaux & Nel, 1990 – 112, 123, 170, 183, 184, 201, 211, 227

stigmatoides Sutter & Skyva, 1992 – kárpáti tollasmoly – 121, 123, 171, 174, 201, 211, 227, 294, 385

plagiodactylus (Stainton, 1851) – osztrák tollasmoly – 107, 184, 202, 227

annadactyla Sutter, 1988 – vértesi tollasmoly – 112, 167, 171, 174, 184, 189, 201, 227, 294, 385, 396

bipunctidactyla (Scopoli, 1763) – kétpontú tollasmoly – 4, 13, 15, 22, 36, 51, 52, 77, 119, 123, 142, 167, 171, 178, 184, 189, 201, 227, 235, 274, 301, 310, 387, 396

pelidnodactyla (Stein, 1837) – kötörőfű-tollasmoly – 4, 45, 51, 53, 77, 78, 134, 135, 142, 167, 171, 201, 227, 232, 294, 297, 385, 386, 396, 421

coprodactylus (Stainton, 1851) – tárnicsvirág-tollasmoly – 4, 171, 201, 227

pneumonanthus (Büttner, 1880) – tárnics-tollasmoly – 123, 150, 167, 171, 201, 211, 227, 301, 302

zophodactylus (Duponchel, 1840) – imolavirág-tollasmoly – 4, 35, 171, 189, 201, 202, 211, 227, 235, 301, 307

Cnaemidophorus Wallengren, 1862

rhododactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rózsabogyó-tollasmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 27, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 119, 122, 123, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 201, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Marasmarcha Meyrick, 1886

lunaedactyla (Haworth, [1811]) – félholdas tollasmoly – 4, 78, 119, 123, 167, 201, 211

Oxyptilus Zeller, 1841^{*55} (= *Crombrugghia* Tutt, 1906)

pilosellae (Zeller, 1841) – vörösbarna tollasmoly – 4, 22, 23, 51, 53, 77, 119, 122, 123, 134, 167, 178, 184, 189, 201, 211, 234, 235, 263, 274, 294, 301, 385, 386, 396

parvidactyla (Haworth, [1811]) – törpe tollasmoly – 4, 13, 15, 31, 52, 119, 123, 167, 184, 189, 201, 211, 234, 235, 296, 333, 385, 396

chrysodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) – arany szárnyú tollasmoly – 4, 36, 51, 52, 119, 123, 126, 134, 184, 189, 201, 211, 234, 235, 294, 385, 386, 396

distans (Zeller, 1847) – rozsdabarna tollasmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 53, 77, 78, 116, 119, 122, 123, 134, 167, 178, 184, 189, 201, 211, 235, 257, 263, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396

tristis (Zeller, 1841) – gyászos tollasmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 31, 36, 51, 59, 77, 119, 123, 126, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 201, 211, 232, 235, 243, 257, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Geina Tutt, 1907

didactyla (Linnaeus, 1758) – gyömbérgyökér-tollasmoly – 4, 13, 15, 23, 36, 51, 77, 119, 123, 174, 178, 184, 189, 201, 211, 235, 294, 385, 386, 396, 421

Capperia Tutt, 1905

celeusi (Frey, 1886) – gamandor-tollasmoly – 4, 51, 53, 77, 119, 123, 134, 152, 167, 184, 201, 211, 263, 273, 280, 294, 297, 301, 302, 321, 385, 387, 396

[„*britanniodactylus* Gregson, 1869” – 113, 201 – erroneous; incorrectly used name]

trichodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyöngyajak-tollasmoly – 123, 184, 189, 201, 294, 302, 385

fusca (O. Hofmann, 1898) – tisztessfü-tollasmoly – 235, 237, 378

Stangeia Tutt, 1905

siceliota (Zeller, 1847) – mediterrán tollasmoly – 164, 201, 396

Pterophorinae

Pterophorus Schäffer, 1766

pentadactyla (Linnaeus, 1758) – fehér tollasmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 119, 122, 123, 126, 134, 135, 142, 167, 170, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

ischnodactyla (Treitschke, 1835) – szulák-tollasmoly – 4, 23, 36, 51, 52, 134, 142, 170, 177, 184, 189, 235, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396

Porritia Tutt, 1905

galactodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tejfehér tollasmoly – 13, 23, 51, 52, 59, 77, 123, 134, 152, 167, 170, 178, 211, 221, 294, 385, 387, 396

Calyciphora Kasy, 1960

xanthodactyla (Treitschke, 1833) – hangyabogáncs-tollasmoly – [4], 22, 23, 52, 123, 170, 189, 235 – V (10 000 Ft)

= *klimeschi* Kasy, 1960 – 4, 36

albodactylus (Fabricius, 1794) – bábakalács-tollasmoly (csepeli tollasmoly) – 170

= *xerodactyla* (Zeller, 1841) – [4], 123

= *siculus* Fuchs, 1901 – 78

nephelodactyla (Eversmann, 1844) – sötétszegélyű tollasmoly – 120, 170, 184, 321, 396

Merrifieldia Tutt, 1905

tridactyla (Linnaeus, 1758) – sárgásbarna tollasmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 45, 51, 77, 78, 119, 122, 123, 142, 167, 170, 177, 183, 184, 189, 194, 235, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396
= *fuscolumbata* (Duponchel, 1844) – 183

leucodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnacsápú tollasmoly – 73, 74, 123, 167, 170, 174, 178, 184, 189, 211, 235, 263, 294, 301, 385, 386, 396

baliodactylus (Zeller, 1841) – kakukkfű-tollasmoly – 73, 74, 82, 123, 170, 184, 189, 211, 235, 385

malacodactylus (Zeller, 1847) – dunántúli tollasmoly – 66, 170, 178, 184, 189, 235, 385

Wheeleria Tutt, 1905

obsoletus (Zeller, 1841) – pemetefű-tollasmoly – 4, 67, 88, 122, 139, 170, 174, 184, 221, 263, 294, 301, 321, 385, 396

Pselnophorus Wallengren, 1881

heterodactyla (Müller, 1764) – kormos tollasmoly – 119, 123, 170, 386
= *brachydactyla* (Kollar, 1832) – 4, 15, 45,

Oidaematophorus Wallengren, 1862

lithodactyla (Treitschke, 1833) – sárgásszürke tollasmoly – 23, 77, 123, 134, 135, 152, 167, 170, 184, 294, 301, 385, 386, 396

= *septodactyla* (Treitschke, 1833) – 15, 22, 36, 51, 53, 59, [119]

constanti (Ragonot, 1875) – peremizsrágó tollasmoly – 4, 15, 22, 23, 113, 119, 123, 170, 184, 220, 280, 310, 321, 387, 396

Hellinsia Tutt, 1905

tephradactyla (Hübner, [1813]) – feketepontos tollasmoly – 4, 51, 52, 74, 77, 123, 142, 170, 178, 189, 235, 386, 396

didactylites (Ström, 1783) – hölgymálvirág-tollasmoly – 142, 170, 178, 184, 189, 211, 235, 386, 396
= *scarodactyla* Hübner, [1813] – 4, 13, 15, 23, 31, 35, 51, 59, 69, 119, 123

distinctus (Herrich-Schäffer, [1855])*⁵⁶ – gyopárvirág-tollasmoly – 4, 170

carphodactyla (Hübner, [1813]) – kénsárga tollasmoly – 4, 13, 15, 23, 36, 51, 53, 77, 119, 123, 170, 178, 183, 184, 211, 280, 294, 301, 385, 387, 396

inulae (Zeller, 1852) – peremizsvirág-tollasmoly – 4, 22, 31, 74, 87, 122, 123, 170, 178, 183, 184, 189, 211, 235, 301, 396

lienigianus (Zeller, 1852) – ürömszövő tollasmoly – 4, 13, 68, 77, 123, 142, 167, 170, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 260, 274, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

= *septodactyla* Tutt, 1905 (nec Treitschke) – 4, 5, 45, 52

osteodactylus (Zeller, 1841) – csontszínű tollasmoly – 4, 15, 23, 113, 119, 123, 170, 211

Adaina Tutt, 1905

microdactyla (Hübner, 1813) – sédkender-tollasmoly – 4, 35, 51, 52, 59, 74, 77, 119, 123, 152, 170, 178, 184, 189, 211, 235, 260, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

Emmelina Tutt, 1905

monodactyla (Linnaeus, 1758) – közönséges tollasmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 119, 122, 123, 126, 134, 135, 142, 167, 170, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

argoteles (Meyrick, 1922) – kínai tollasmoly (illír tollasmoly) – 170, 178, 184, 260, 297, 310, 321, 343, 387, 396

= *jezonicus* (Matsumura, 1931) – 77, 116

= *jezonica pseudojezonica* Derra, 1987 – 116

Schreckensteinioidae**Schreckensteiniidae – Csillagó molyfélék****Schreckensteinia** Hübner, 1825

festaliella (Hübner, [1819]) – fényes szederemoly – 1, 52, 70, 167, 178, 396

Epermeniidea

Epermeniidae – Íveltszárnyú molyfélék

Epermeninae

Phaulernis Meyrick 1895

dentella (Zeller, 1839) – baraboly-íveltömoly – 444

Epermenia Hübner, 1825

insecurella (Stainton, 1849) – ólomszínű íveltömoly – 2, 31, 51, 52, 68, 77, 78, 152, 167, 178, 184, 194, 211, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 387, 396

= *plumbeella* Rebel, 1915 – 2, 51, 77

iniquella (Wocke, 1867) – kocsordsodró íveltömoly – 283

= *dentosella* auct., nec Stainton, 1851, nec Herrich-Schäffer, 1854 – 2, 5, 68

strictellus (Wocke, 1867)*⁵⁷ – pirosszárnyú íveltömoly – 2, 386

aequidentellus (E. Hofmann, 1867) – angyalgyökér-íveltömoly – 2, 35, 178

= *daucellus* (Peyerimhoff, 1870) – 2

chaerophyllella (Goeze, 1783) – barabolysodró íveltömoly – 2, 35, 51, 52, 77, 99, 142, 152, 174, 178,

184, 232, 260, 274, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396

= *nigrostriatellus* (Heylarts, 1883) – 2

illigerella (Hübner, [1813]) – podagrafü-íveltömoly – 2, 45, 51, 52, 77, 78, 99, 126, 134, 142, 167,

177, 178, 184, 189, 194, 221, 260, 280, 294, 385, 386, 387, 396

falciformis (Haworth, 1828) – sárgás íveltömoly – 307

petrusellus (Heylarts, 1883) – buglyoskocsordfonó íveltömoly – 2, 77, 167, 177, 189, 321, 387

pontificella (Hübner, [1796]) – tarka íveltömoly – 2, 13, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 134,

142, 167, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

Ochromolopinae

Ochromolopis Hübner, 1825

ictella (Hübner, [1813]) – zsellérke-íveltömoly – 2, 36, 51, 52, 53, 70, 77, 78, 87, 99, 126, 134, 142,

167, 177, 178, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 396

Tortricidea

Tortricidae – Sodrómolyfélék

Tortricinae – Cochylini*⁵⁸

Phtheochroa Stephens, 1829

inopiana (Haworth, [1811]) – turjáni sárgamoly – 5, 15, 21, 36, 51, 52, 77, 119, 126, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 221, 232, 235, 260, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

schreibersiana (Frölich, 1828) – májusfa-fűrómoly – 5, 21, 45, 51, 52, 77, 78, 119, 128, 134, 141, 178, 184, 220, 294, 301, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

pulvillana (Herrich-Schäffer, [1851]) – spárgaszár-fűrómoly – 5, 21, 31, 45, 51, 52, 77, 126, 128, 130, 134, 141, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

sodaliana (Haworth, [1811]) – kutyabenge-fűrómoly – 5, 21, 126, 141, 184, 301, 396, 387, 415, 416, 441

fulvicinctana (Constant, 1893) – vörösszalagos fűrómoly (sárgásfehér fűrómoly) – 34, 77, 141, 210, 301, 415, 416, 441

procerana (Lederer, 1863)*⁵⁹ – fehér fűrómoly – 5, 21, 141, 310, 415, 441

rugosana (Hübner, [1799]) – földitök-fürómoly – 5, 21, 42, 51, 126, 134, 141, 210, 294, 301, 333, 385, 396, 415, 416, 441

annae Huemer, 1990 – erdei fürómoly – 106, 128, 141, 294, 385, 396, 415, 441

***Hysterothorax* Obraztsov, 1944**

maculosana (Haworth, [1811]) – karszti fürómoly – 21, 51, 53, 122, 141, 142, 210, 260, 294, 301, 310, 385, 396, 415, 416, 441

= *purgatana* (Treitschke, 1835) – 5, 22, 23

***Cochylimorpha* Razowski, 1959**

hilarana (Herrich-Schäffer, [1851]) – ürömszár-fürómoly – 5, 21, 35, 51, 52, 77, 99, 128, 141, 152, 167, 178, 184, 189, 235, 301, 396, 415, 416, 418, 429, 441

halophilana (Christoph, 1872)*⁶⁰ – szikiüröm-fürómoly – 210, 231, 301, 415, 416, 418, 429, 441

= *clavana* (Constant, 1888) – 185

[*jaculana* (Snellen, 1883)] – 118, [141], 167 – erroneous]

elongana (F. von Röslerstamm, 1839)*⁶¹ – karcshű fürómoly – 5, 21, 130, 141, 415, 416, 418, 429, 441

subwolniana (Danilevsky, 1962) – keleti fürómoly – 359, 415, 418, 429, 441

woliniana (Schleich, 1868) – ürömhajtás-fürómoly – 5, 21, 51, 122, 130, 141, 184, 415, 232, 380, 396, 418, 429, 441

obliquana (Eversmann, 1844) – magyar fürómoly – 5, 21, 77, 130, 141, 183, 184, 210, 301, 415, 416, 418, 429, 441

= *coenosana* Mann, 1867 – 5

jucundana (Treitschke, 1835)*⁶² – rozsdasávű fürómoly – 5, 21, 36, 128, 130, 141, 189, 235, 415, 418, 429, 441

straminea (Haworth, [1811]) – fakó sárgamoly – 5, 13, 15, 17, 21, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 418, 429, 441

alternana (Stephens, 1834) – homoki sárgamoly – 21, 74, 128, 130, 141, 152, 183, 184, 189, 235, 294, [301], 330, 385, 415, 416, 418, 429, 441

***Phalonidia* Le Marchand, 1933**

gilvicomana (Zeller, 1847) – sárgatövű fürómoly – 128, 141, 146, 159, 177, 189, 235, 280, 297, 321, 327, 386, 396, 415, 416, 441

curvistrigana (Stainton, 1859) – árnyéksávű fürómoly – 188, 195, 141, 327, 386, 415, 416, 441

udana (Guenée, 1845) – lizinka-fürómoly – [13], 327, 330, 415, 441

manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839) – turjánű fürómoly – 5, 15, 21, 45, 51, 77, 119, 122, 126, 128, 130, 141, 184, 189, 210, 235, 274, 280, 297, 301, 321, 327, 386, 387, 396, 415, 416, 441

affinitana (Douglas, 1846) – öszirózsa-fürómoly – 5, 21, 34, 35, 51, 77, 99, 122, 130, 134, 141, 142, 183, 184, 210, 294, 301, 327, 385, 387, 396, 415, 416, 441

= *inulana* Constant, 1884 – 5, 327

albipalpana (Zeller, 1847) – sóvirág-fürómoly – 5, 21, 141, 183, 210, 301, 327, 415, 416, 441

contractana (Zeller, 1847) – pipitér-fürómoly – 5, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 77, 119, 122, 128, 141, 152, 167, 178, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 327, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

***Gynnidomorpha* Turner, 1916**

luridana (Gregson, 1870) – fakósárga fürómoly – 128, 141, 182, 189, 235, 274, 294, 327, 385, 415, 416, 441

vectisana (Humphreys & Westwood, 1845) – szürke fürómoly – 21, 108, 128, 130, 141, 184, 189, 235, 327, 415, 416, 441

= *griseana* (Haworth, [1811]) – 5

minimana (Caradja, 1916) – apró fürómoly – 21, 77, 141, 210, 327, 415, 441

permixtana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – lápi fürómoly – 5, 21, 42, 51, 52, 70, 77, 99, 122, 126, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 301, 327, 385, 387, 396, 415, 416, 441

alissima (Ragonot, 1883) – hidőr-fürómoly – 130, 274, 327, 386, 395, 415, 416, 441

***Agapeta* Hübner, 1822**

hamana (Linnaeus, 1758) – közönséges sárgamoly – 5, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 128, 130, 134, 135, 141, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

largana (Rebel, 1906) – magyar sárgamoly – 5, 21, [141], 210, 294, 301, 321, 385, 387, 415, 416, 441

zoegana (Linnaeus, 1767) – barnacsíkos sárgamoly – 5, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 386, 387, 396, 415, 416, 441

***Fulvoclysia* Obraztsov, 1943**

nerminae Koçak, 1982 – tarka sárgamoly – 167, 210, 415, 416, 441

= *fulvana* (Fischer von Röslerstamm, 1836) nec ([Denis & Schiffermüller], 1775) auct. – 5, 21, 78, 141

***Eugnosta* Hübner, 1825**

lathoniana (Hübner, [1800]) – ezüstfoltos fürómoly – 5, 21, 31, 51, 52, 77, 130, 134, 141, 184, 221, 294, 296, 301, 385, 387, 396, 415, 416, 441

magnificana (Rebel, 1914)*⁶³ – ezüsttükrös fürómoly – 21, 51, 141, 396, 415, 441

= *margaritana* (Hübner, [1813]) – 5

***Prochlidonia* Razowski, 1960**

amiantana Hübner, [1799]) – fenyves sárgamoly – 5, 21, 22, 45, 53, 87, 130, 134, 141, 167, 184, 210, 294, 321, 385, 386, 396, 415, 416, 441

***Eupoecilia* Stephens, 1829**

angustana (Hübner, [1796–1799]) – közönséges virágfürómoly – 5, 13, 15, 21, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 126, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 298, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

= *fasciana* (Donovan, 1808) – 53

ambiguella (Hübner, [1796]) – nyerges szőlómoly – 5, 13, 15, 21, 31, 36, 51, 59, 77, 78, 99, 126, 128, 134, 141, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 243, 263, 294, 296, 301, 333, 385, 386, 396, 415, 416, 441

sanguisorbana (Herrich-Schäffer, [1856]) – vérfű-fürómoly – 141, 198, 210, 260, 297, 301, 386, 387, 396, 415, 416, 441

***Aethes* Billberg, 1820**

hartmanniana (Clerck, 1759) – ördög szem-fürómoly – 5, 15, 21, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 99, 115, 119, 122, 126, 128, 141, 142, 167, 178, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 242, 243, 246, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

[*piercei* auct. – 47, 115, 141, 167, 184, 235, 242, 246]

williana (Brahm, 1791) – gyopár-fürómoly – 5, 13, 15, 21, 31, 36, 51, 77, 119, 126, 128, 130, 141, 167, 183, 184, 189, 232, 235, 246, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

= *zephyrana* Treitschke, 1830 – 23

margarotana (Duponchel, 1836) – változékony fürómoly – 5, 13, 21, 51, 52, 53, 77, 119, 126, 128, 135, 141, 167, 178, 184, 189, 210, 221, 235, 246, 263, 280, 294, 301, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

moribundana (Staudinger, 1859) – sárgásszürke fürómoly – 5, 21, 141, 246, 415, 441

nefandana (Kennel, 1899) – parlagi sárgamoly – 5, 21, 77, 130, 141, 210, 246, 301, 415, 416, 441

margaritana (Haworth, [1811]) – fenyves fürómoly – 21, 36, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 178, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 246, 274, 280, 294, 297, 297, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416, 441

= *dipollata* (Hübner, [1813]) – 5, 13, 15, 22, 31, 45, 51, 53

triangulana (Treitschke, 1835) – tarka fürómoly – 21, 36, 78, 119, 128, 141, 142, 167, 189, 210, 235, 246, 301, 386, 387, 396, 415, 416, 441

= *kuhlweiniana* Fischer von Röslerstamm, 1836 – 5, 15, 22, 23, 31

- rutilana* (Hübner, [1817]) – aranyló sárgamoly – 5, 21, 36, 43, 51, 59, 77, 128, 130, 141, 167, 178, 189, 235, 246, 321, 387, 396, 415, 416, 441
- smeathmanniana* (Fabricius, 1781) – fészkesvirág-sárgamoly – 5, 13, 15, 21, 45, 51, 52, 74, 77, 119, 126, 128, 130, 135, 141, 142, 167, 178, 183, 184, 189, 220, 235, 243, 246, 260, 262, 274, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441
- tesserana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rácsos fűrómoly – 5, 13, 15, 21, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 128, 130, 134, 135, 141, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 246, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441
- sanguinana* (Treitschke, 1830) – vércsíkos sárgamoly – 5, 21, 23, 51, 52, 77, 122, 126, 128, 130, 141, 177, 178, 184, 189, 235, 246, 363, 387, 396, 415, 441
- dilucidana* (Stephens, 1852) – apró sárgamoly – 21, 77, 141, 210, 246, 387, 415, 441
- flagellana* (Duponchel, 1836) – mezei sárgamoly – 5, 13, 21, 22, 23, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 178, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 246, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441
- beatricella* (Walsingham, 1898) – angol sárgamoly – 5, 21, 126, 141, 184, 246, 415, 441
- francillana* (Fabricius, 1794) – réti sárgamoly – 5, 15, 21, 119, 130, 141, 184, 246, 294, 385, 396, 415, 416, 441
- bilbaensis* (Rössler, 1877) – csillámos sárgamoly – 5, 21, 36, 51, 53, 77, 126, 128, 134, 135, 141, 184, 189, 220, 235, 246, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441
- tornella* (Walsingham, 1898) – rozsdacsíkos sárgamoly – 5, 15, 21, 31, 36, 77, 119, 128, 141, 184, 189, 235, 246, 415, 416, 441
- cnicana* (Westwood, 1854) – bogáncsvirág-fűrómoly – 5, 21, 108, 115, 119, 128, 141, 184, 189, 235, 246, 262, 274, 280, 396, 415, 441
- rubigana* (Treitschke, 1830) – bojtörjánvirág-fűrómoly – 21, 36, 52, 53, 59, 77, 115, 119, 126, 128, 134, 141, 142, 167, 178, 184, 189, 235, 243, 246, 260, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441
- = *badiana* sensu Hübner, 1799 – 5, 13, 15, 45, 51
- kindermanniana* (Treitschke, 1830) – ürömvirág-sárgamoly – 5, 13, 15, 21, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 246, 263, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441
- Cochylidia** Obratzov, 1956
- rupicola* (Curtis, 1834) – sédkender-fűrómoly – 21, 134, 141, 167, 294, 301, 330, 333, 363, 380, 385, 396, 415, 416, 441
- subroseana* (Haworth, 1811) – rózsás fűrómoly – 5, 21, 52, 99, 119, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 178, 184, 210, 232, 294, 310, 321, 385, 396, 415, 441
- = *phaleratana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – 5, 31, 51
- richteriana* (Fischer von Röslerstamm, 1837) – ürömgöyökér-fűrómoly – 5, 141, 274, 415, 441
- moguntiana* (Rössler, 1864) – mezeiüröm-fűrómoly – 5, 21, 51, 53, 77, 126, 128, 130, 134, 141, 167, 189, 220, 235, 260, 294, 301, 321, 333, 380, 385, 396, 415, 416, 441
- heydeniana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – aranyvessző-fűrómoly – [5], 21, 51, 77, 119, 128, 130, 141, 184, 189, 235, 298, 307, 415, 416, 441
- implicitana* (Wocke, 1856) – kamilla-fűrómoly – 5, 20, 21, 23, 45, 52, 53, 77, 119, 126, 128, 130, 141, 167, 178, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 274, 294, 297, 301, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441
- = *coercitana* Staudinger, 1859 – 5
- Diceratura** Djakonov, 1929
- ostrinana* (Guenée, 1845) – bíborsávos fűrómoly – 21, 36, 51, 52, 59, 119, 126, 128, 130, 134, 141, 167, 177, 178, 184, 189, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 321, 333, 385, 396, 415, 416, 441
- = *purpuratana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – 5, 15, 23
- Thyralia** Walsingham, 1897
- nana* (Haworth, [1811]) – törpe fűrómoly – 5, 21, 35, 51, 70, 77, 128, 141, 178, 184, 274, 297, 310, 386, 396, 415, 416, 441

***Cochylis* Treitschke, 1829*⁶⁴**

roseana (Haworth, [1811]) – apró pirosmoly – 5, 21, 23, 31, 36, 51, 128, 141, 152, 167, 177, 183, 184, 189, 194, 220, 235, 280, 294, 297, 301, 310, 385, 386, 396, 415, 416, 441

flaviciliana (Westwood, 1854) – sárgarajtó fűrómoly – 21, 107, 128, 141, 189, 235, 274, 415, 441

***Longicornutia* Razowski, 1960**

epilinana Duponchel, 1842 – lentokmoly – 5, 13, 15, 21, 31, 36, 51, 52, 77, 78, 119, 126, 128, 130, 134, 141, 177, 178, 184, 189, 235, 280, 294, 296, 297, 307, 321, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

***Neocochylis* Razowski, 1960**

hybridella (Hübner, [1813]) – keserűgyökér-fűrómoly – 5, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

dubitana (Hübner, [1799]) – kis fűrómoly – 5, 13, 15, 21, 22, 23, 36, 78, 99, 119, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 177, 184, 189, 210, 235, 262, 274, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416, 441

***Cochylischroa* Obraztsov & Swatschek, 1958**

atricapitana (Stephens, 1852) – aggófű-fűrómoly – 188, 195, 294, 321, 385, 396, 415, 416, 441

***Brevicornutia* Razowski, 1960**

pallidana Zeller, 1847 – fakó fűrómoly – 5, 13, 21, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 128, 134, 141, 178, 184, 189, 210, 235, 280, 294, 297, 310, 333, 385, 386, 396, 415, 416, 441

***Pontoturania* Obraztsov, 1943**

posterana Zeller, 1847 – aszatvirág-fűrómoly (aszatvirágmoly) – 5, 13, 15, 21, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 126, 128, 130, 134, 135, 141, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

***Cryptocochylis* Razowski, 1960**

conjunctana (Mann, 1864) – budai fűrómoly – 5, 21, 141, 184, 280, 310, 415, 416, 441

***Falseuncaria* Obraztsov & Swatschek, 1958**

degreyana (Mc. Lachlan, 1869)*⁶⁵ – útifű-fűrómoly – 21, 141, 184, 415, 441

ruficiliana (Haworth, [1811]) – mezei fűrómoly – 5, 21, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 122, 128, 130, 134, 141, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416, 441

= *ciliella* (Hübner, 1796) – 13, 17, 22, 23

Tortricinae – Tortricini***Spatalistis* Meyrick, 1907**

bifasciana (Hübner, 1787) – hegyi levélmoly – 5, 13, 15, 45, 119, 142, 167, 177, 189, 210, 386, 396, 415, 416

***Tortrix* Linnaeus, 1758**

viridana Linnaeus, 1758 – tölgylonca – 5, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 28, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

***Aleimma* Hübner, 1825**

loeflingiana (Linnaeus, 1758) – tölgylevél-sodrómoly – 5, 13, 15, 22, 23, 24, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

***Acleris* Hübner, 1825**

holmiana (Linnaeus, 1758) – fehérfoltos levélmoly – 5, 13, 15, 23, 31, 45, 51, 78, 119, 134, 167, 184, 232, 260, 280, 294, 297, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416

forsskaleana (Linnaeus, 1758) – juharos levélmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 167, 178, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

- bergmanniana* (Linnaeus, 1758) – rozsdarácsos levélmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 53, 78, 99, 119, 122, 134, 135, 142, 167, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- laterana* (Fabricius, 1794) – gyöngyvessző-levélmoly – [210], 281, 297, 396, 415, 416
- abietana* (Hübner, [1822]) – jegenyefenyő-levélmoly – 261, 396, 415, 416
- sparsana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas levélmoly – 5, 15, 22, 31, 45, 52, 59, 78, 119, 126, 167, 178, 184, 210, 243, 294, 301, 385, 386, 396, 415, 416
- rhombana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – cifra levélmoly – 5, 15, 22, 23, 24, 36, 77, 99, 119, 122, 134, 135, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 301, 307, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *contaminana* (Hübner, 1799) – 13, 31, 45, 51, 52, 59, 78
- emargana* (Fabricius, 1775) – kivágottszegélyű levélmoly – 31, 45, 51, 78, 232, 386, 396, 415, 416
- schalleriana* (Linnaeus, 1761) – ostorménfa-levélmoly – 5, 14, 23, 35, 51, 52, 70, 77, 122, 142, 167, 178, 184, 210, 262, 280, 297, 386, 387, 396, 415, 416
- lorquiniana* (Duponchel, 1835) – moesári levélmoly – 5, 15, 31, 36, 42, 51, 52, 77, 119, 122, 178, 184, 189, 235, 274, 386, 387, 396, 415, 416
- umbrana* (Hübner, [1799]) – sötétsíkos levélmoly – 232, 297, 301, 387, 396, 415, 416
= *umbrosana* auct. – 47
- cristana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pamacsos levélmoly – 5, 15, 45, 51, 142, 167, 210, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *subfulvovittana* Clark, 1901 – 22
- variegana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarka levélmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 87, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- aspersana* (Hübner, [1814–1817]) – vérfű-levélmoly – 142, 220, 225, 231, 260, 297, 301, 321, 386, 396, 415, 416
- shepherdana* (Stephens, 1852) – ritka levélmoly – 47, 142, 260, 297, 396, 415, 416
- hastiana* (Linnaeus, 1758) – fűzfa-levélmoly – 5, 13, 15, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- permutana* (Duponchel, 1836) – díszes levélmoly – 5, 14, 15, 31, 36, 51, 52, 53, 99, 119, 142, 167, 174, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 294, 310, 321, 385, 396, 415, 416
- scabrana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fűzsodró levélmoly – 5, 184, 415
- ferrugana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdás levélmoly – 5, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 78, 99, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 235, 263, 280, 296, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- notana* (Donovan, 1806) – nyírfa-levélmoly – 77, 119, 134, 142, 167, 178, 184, 232, 274, 280, 294, 301, 321, 385, 386, 396, 415, 416
= *tripunctana* (Hübner, [1796–1799]) nom. praeocc. – 5, 31, 45, 51, 52, 59
- quercinana* (Zeller, 1849) – tölgyesodró levélmoly – 5, 51, 77, 122, 189, 235, 387, 396, 415, 416
- kochiella* (Goeze, 1783) – szürkés levélmoly – 177, 178, 189, 210, 235, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *boscana* (Fabricius, 1794) – 5, 15, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 119, 122, 126, 184
- logiana* (Clerck, 1759) – hőszinű levélmoly – 5, 52, 59, 62, 77, 126, 142, 178, 301, 386, 396, 415, 416
- roscidana* (Hübner, [1799]) – rezgőnyár-levélmoly – 5, 22, 45, 142, 386, 415, 416
- literana* (Linnaeus, 1758) – zöldesfehér levélmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 45, 51, 52, 77, 78, 119, 167, 178, 210, 235, 297, 301, 385, 386, 396, 415, 416
- lacordairana* (Duponchel, 1836) – szilfa-levélmoly – 215, 231, 297, 301, 396, 415, 416
- lipsiana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – lápi levélmoly – 5, 119, 297, 386, 396, 415
- rufana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörhenyes levélmoly – 167, 260, 262, 297, 321, 386, 396, 415, 416

= *apiciana* (Hübner, 1793) – 5, 45, 51, 78
fimbriana (Thunberg & Becklin, 1791)*⁶⁶ – áfonyasodró levélmoly – 5, 415

Tortricinae – Cnephasiini

***Xerocnephasia* Leraut, 1979**

rigana (Sodoffsky, 1829) – kökörcsinmoly – 5, 13, 15, 51, 119, 122, 184, 210, 260, 294, 310, 379, 180, 385, 387, 396, 415, 416

***Neosphaleroptera* Réal, 1953**

nubilana (Hübner, [1799]) – felhős sodrómoly – 5, 13, 15, 24, 28, 36, 42, 51, 5, 532, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

***Doloploca* Hübner, 1825**

punctulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fagyalevő sodrómoly (lonclakó sodrómoly) – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 87, 99, 119, 126, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396, 415, 416

***Tortricodes* Guenée, 1845**

alternella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tavaszi sodrómoly – 38a, 77, 99, 119, 134, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416

= *tortricella* (Hübner, 1796) – 5, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 59

***Eana* Billberg, 1820**

osseana (Scopoli, 1763) – csontszínű sodrómoly – 5, 51, 167, 310, 321, 396, 415

[*longana* (Haworth, 1811) – 122, 330 – erroneous, name wrongly used]

argentana (Clerck, 1759) – ezüstszárnú sodrómoly – 5, 13, 15, 45, 78, 119, 126, 167, 210, 386, 415, 416

canescana (Guenée, 1845) – fenyves sodrómoly – 15, 31, 119, 167, 415

= *hungariae* Razowski, 1958 – 5

incanana (Stephens, 1852) – hullámos sodrómoly – 15, 77, 119, 122, 178, 183, 184, 210, 235, 275, 294, 301, 307, 385, 396, 415, 416

derivana de La Harpe, 1858) – barackos sodrómoly – 48, 119, 183, 184, 294, 385, 415, 416

***Cnephasia* Curtis, 1826**

incertana (Treitschke, 1835) – márványos sodrómoly – 5, 15, 17, 22, 23, 31, 35, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 328, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

abrasana (Duponchel, 1843) – erdőszéli sodrómoly – 5, 13, 15, 22, 23, 51, 52, 77, 119, 122, 167, 178, 189, 235, 294, 328, 385, 396, 415

stephensiana (Doubleday, 1849) – hegyaljai sodrómoly – 74, 77, 122, 142, 152, 183, 184, 189, 210, 235, 294, 301, 328, 330, 333, 385, 396, 415, 416

alticolana (Herrich-Schäffer, [1851]) – gamandor-sodrómoly (havaslakó sodrómoly) – 5, 13, 22, 23, 36, 119, 152, 183, 189, 210, 235, 301, 328, 330, 386, 396, 415, 416

asseclana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyvessző-sodrómoly – 210, 294, 301, 333, 385, 396, 415, 416

= *interjectana* (Haworth, 1811) – 122, 184, 328

= *virgaureana* (Treitschke, 1835) – 5, 35, 119, 328

pasiuana (Hübner, [1799]) – réti sodrómoly – 220, 232, 262, 272, 274, 289, 294, 297, 301, 321, 328, 333, 385, 387, 396, 415, 416

= *pascuana* (Hübner, 1822) – 5, 333

pumicana (Zeller, 1847)*⁶⁷ – gabona-sodrómoly – 143, [272, 328], 415

genitalana Pierce & Metcalfe, 1915 – homályos sodrómoly – 44, 77, 183, 184, 294, 328, 385, 415

communana (Herrich-Schäffer, [1851]) – közönséges sodrómoly – 5, 13, 15, 17, 22, 31, 34, 36, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 328, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

- oxyacanthana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – galagonya-sodrómol – 44, 183, 184, 189, 274, 294, 328, 385, 415, 416
chrysanthæana (Duponchel, 1843) – margaréta-sodrómol – 5, 22, 23, 31, 34, 35, 36, 44, 77, 119, 122, 167, 184, 210, 235, 294, 328, 385, 396, 415, 416
ecullyana Réal, 1951*⁶⁸ – déli sodrómol – 44, 184, 301, 328, 330, 415
Oporopsamma Gozmány, 1954
wertheimsteini (Rebel, 1913) – nyúlparéj-sodrómol – 5, 77, 210, 256, 259, 301, 333, 387, 396, 415, 416

Tortricinae – Sparganothini

Sparganothis Hübner, 1825

- pillieriana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szőlőilonca – 5, 13, 15, 17, 23, 24, 31, 36, 51, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 167, 184, 189, 210, 221, 232, 294, 296, 297, 321, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

Tortricinae- Euliini

Eulia Hübner, 1825

- ministrana* (Linnaeus, 1758) – aranybarna sodrómol – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 189, 210, 232, 235, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 385, 386, 387, 396, 415, 416

Pseudargyrotoza Obraztsov, 1954

- conwagana* (Fabricius, 1775) – ezüstmintás sodrómol – 5, 13, 15, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

Tortricinae – Ramapesiini

Ditula Stephens, 1829

- angustiorana* (Haworth, 1811) – tiszafa-sodrómol – 434

Epagoge Hübner, 1825

- grotiana* (Fabricius, 1781) – bokorerdei sodrómol – 5, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
 = *artificana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – 5

Paramesia Stephens, 1829

- gnomana* (Clerck, 1759) – okkerszínű sodrómol – 5, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 38a, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 260, 262, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416

Periclepsis Bradley, 1977

- cinctana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – galériás sodrómol – 5, 31, 36, 51, 52, 53, 99, 122, 134, 142, 177, 178, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 310, 321, 385, 387, 396, 415, 416

Philedone Hübner, 1825

- gerningana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – erdei sodrómol – 5, 15, 22, 31, 45, 51, 52, 77, 99, 119, 134, 142, 167, 178, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 274, 294, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

Pseudeulia Obraztsov, 1954

- asinana* (Hübner, [1799]) – korai sodrómol – 5, 13, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 53, 77, , 99 119, 134, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 385, 386, 396, 415, 416

Capua Stephens, 1834

- vulgana* (Frölich, 1828) – sárgásszürke sodrómol – 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
 = *favillaceana* (Hübner, 1817) – 5, 15, 23, 31, 36, 45, 51, 53, 59, 78
 = *ochraceana* Stephens, 1834 – 13

Philedonides Obraztsov, 1954

- lunana* (Thunberg & Borgstroem, 1784) – pimpószöví sodrómolý – 167, 260, 294, 297, 310, 321, 385, 396, 415, 416
 = *prodromana* (Hübner, 1816) – 5
rhombicana (Herrich-Schäffer, [1851]) – rozsdasárga sodrómolý – 5, 15, 24, 51, 77, 119, 152, 167, 260, 280, 297, 321, 386, 396, 415, 416

Tortricinae – Archpini

***Archips* Hübner, 1822**

- oporana* (Linnaeus, 1758) – fenyő-sodrómolý – 99, 142, 178, 210, 267, 280, 297, 385, 386, 396, 415, 416
 = *piceana* (Linnaeus, 1758) – 5, 22, 35, 45, 51, 52, 59, 78
podana (Scopoli, 1763) – dudvárágó sodrómolý – 5, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
crataegana (Hübner, [1799]) – cseresznyeilonca – 5, 15, 17, 22, 23, 24, 45, 51, 52, 77, 78, 119, 122, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
xylosteana (Linnaeus, 1758) – kökényszöví sodrómolý – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
rosana (Linnaeus, 1758) – rózsailonca – 5, 13, 15, 23, 36, 51, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

***Choristoneura* Lederer, 1859**

- diversana* (Hübner, [1817]) – juharlevél-sodrómolý – 5, 13, 363, 396, 415
murinana (Hübner, [1799]) – jegenyefenyő-sodrómolý – 5, 15, 31, 52, 77, 119, 415
hebenstreitella (Müller, 1764) – mogyoró-sodrómolý – 77, 99, 119, 122, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 235, 260, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
 = *sorbiana* (Hübner, 1799) – 5, 13, 15, 22, 23, 28, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 78

***Argyrotaenia* Stephens, 1852**

- ljungiana* (Thunberg, 1797) – ékes sodrómolý – 119, 126, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 280, 286, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
 = *pulchellana* (Haworth, 1811) – 5, 14, 15, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 122, 134, 183

***Tosirips* Razowski, 1987**

- magyarus* Razowski, 1987 – magyar sodrómolý – 235, 236, 294, 385, 396, 415

***Ptycholomoides* Obraztsov, 1954**

- aeriferana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – vörösfenyő-sodrómolý – 5, 15, 22, 31, 45, 51, 52, 119, 142, 167, 210, 280, 297, 386, 396, 415, 416

***Ptycholoma* Stephens, 1829**

- lecheana* (Linnaeus, 1758) – ezüstszávos sodrómolý – 5, 13, 15, 22, 23, 24, 28, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416

***Pandemis* Hübner, 1825**

- cinnamomeana* (Treitschke, 1830) – fahéjszínű sodrómolý – 193, 415
corylana (Fabricius, 1794) – sárga sodrómolý – 5, 15, 22, 23, 27, 36, 45, 51, 52, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 243, 280, 294, 296, 297, 385, 386, 396, 415, 416
cerasana (Hübner, 1786) – kerti sodrómolý – 22, 23, 77, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
 = *ribeana* (Hübner, [1796–1799]) – 5, 13, 15, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 78

- heparana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ligeti sodrómoló – 5, 13, 15, 17, 22, 23, 28, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- dumetana* (Treitschke, 1835) – mocsári sodrómoló – 5, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 31, 36, 38a, 42, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- Syndemis** Hübner, 1825
- musculana* (Hübner, [1799]) – füstös sodrómoló – 5, 13, 15, 22, 31, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416
- Lozotaenia** Stephens, 1829
- forsterana* (Fabricius, 1781)*⁶⁹ – turjáni sodrómoló – 5, 396, 415
- Cacoecimorpha** Obraztsov, 1954
- pronubana* (Hübner, [1799]) – szegfű-sodrómoló – An – 196, 231, 285, 385, 394, 412, 415
- Aphelia** Hübner, 1825
- paleana* (Hübner, 1793) – sápadt sodrómoló – 5, 35, 51, 78, 99, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 232, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- ferugana* (Hübner, 1793) – okkersárga sodrómoló – 194, 210, 232, 235, 260, 280, 294, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- = *ochreana* (Hübner, 1799) – 5, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 122, 134, 167, 177, 178, 184, 189, 210
- viburnana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – parlagi sodrómoló – 5, 15, 28, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 71, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- Dichelia** Guenée, 1845
- histrionana* (Frölich, [1828]) – lucfenyő-sodrómoló – 5, 23, 35, 45, 51, 99, 122, 142, 152, 167, 184, 210, 274, 280, 296, 297, 386, 396, 415, 416
- Clepsis** Guenée, 1845
- senecionana* (Hübner, [1819]) – rozsdás sodrómoló – 119, 167, 174, 210, 232, 260, 294, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- = *helvolana* (Frölich, 1828) – 5, 15, 22, 23, 45, 51
- = *rusticana* Hübner [1796-1799] auct., nec Treitschke – 13
- rurinana* (Linnaeus, 1758) – fakó sodrómoló – 77, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- = *semialbana* (Guenée, 1845) – 5, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59
- spectrana* (Treitschke, 1830) – szalmaszínű sodrómoló – 5, 15, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 263, 274, 294, 296, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- = *costana* sensu auct., nec ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 13
- pallidana* (Fabricius, 1776) – aranyásárga sodrómoló – 77, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- = *strigana* (Hübner, 1799) – 5, 13, 15, 22, 23, 24, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 59
- dumicolana* (Zeller, 1847) – borostyánmoló – 401
- consimilana* (Hübner, [1817]) – fagyal-sodrómoló – 125, 126, 280, 297, 310, 321, 363, 396, 415
- Adoxophyes** Meyrick, 1881
- orana* (Fischer von Röslerstamm, 1834) – almalevél-sodrómoló (almailonca) – 5, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

= *reticulana* (Hübner, 1818-19) – 15

Chlidanotinae – Polyorthini

***Olindia* Guenée, 1845**

schumacherana (Fabricius, 1787) – fehérsávós sodrómoly – 5, 23, 45, 78, 386, 396, 415, 416

***Isotrias* Meyrick, 1895**

hybridana (Hübner, [1817]) – cifra sodrómoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 38a, 45, 51, 52, 53, 70, 78, 99, 119, 122, 134, 135, 142, 167, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416

rectifasciana (Haworth, [1811])*⁷⁰ – törtsávú sodrómoly – 5, [13, 15], [119], 415

stramentana (Guenée, 1845)*⁷¹ – homoki sodrómoly – 377, 415

Olethreutinae – Bactrini

***Bactra* Stephens, 1834**

lancealana (Hübner, [1799]) – lándzsás szittyómoly – 13, 77, 99, 122, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 210, 235, 260, 274, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *lanceolana* auct. – 5, 15, 17, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 119, 183

furfurana (Haworth, [1811]) – gyakori szittyómoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

lacteana Caradja, 1916 – magyar szittyómoly – 5, 36, 77, 184, 189, 210, 235, 301, 386, 415, 416

robustana (Christoph, 1872) – nagy szittyómoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 35, 45, 51, 52, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 178, 183, 184, 210, 274, 280, 294, 296, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *scirpicolana* Pierce, 1935 – 13, 15

suedana Bengtsson, 1989 – lápi szittyómoly – 340, 415, 416

Olethreutinae – Endotheniini

***Endothenia* Stephens, 1852**

gentianaeana (Hübner, [1799]) – mácsonya-tükrösmoly – 5, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 78, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 385, 386, 396, 415, 416

oblongana (Haworth, [1811]) – fészkesvirág-tükrösmoly – 5, 13, 15, 77, 99, 119, 122, 126, 142, 167, 177, 183, 184, 189, 194, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

marginana (Haworth, [1811]) – szegélyes tükrösmoly – 119, 134, 178, 189, 210, 235, 263, 294, 301, 333, 385, 396, 415, 416
= *sellana* (Frölich, 1828) – 5, 13, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 78

pullana (Haworth, [1811]) – szemfoltos tükrösmoly – 283, 301, 415, 416

ustulana (Haworth, [1811]) – sötét tükrösmoly – 119, 126, 167, 294, 330, 385, 386, 396, 415
= *carbonana* (Doubleday, 1849) – 51
= *fuligana* sensu auct., nec Hübner, 1825 – partim; 52

lapideana (Herrich-Schäffer, [1851]) – gyűszűvirág-tükrösmoly – 5, 15, 119, 184, 310, 415

nigricostana (Haworth, [1811]) – tisztessfü-tükrösmoly – 5, 42, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 134, 142, 167, 178, 184, 232, 280, 294, 297, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416

ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)*⁷² – menta-tükrösmoly – 392, 415

quadrimaculana (Haworth, [1811]) – mocsári tükrösmoly – 5, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 274, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

= *antiquana* (Hübner, 1822) – 13, 15, 17, 22, 23,

sororiana (Herrich-Schäffer, [1851])*⁷³ – macskahere-tükrösmoly – 5, 415

Olethreutinae – Olethreutini**Eudemis** Hübner, 1825

porphyra (Hübner, 1[799]) – porfirmoly – 5, 22, 330, 386, 396, 415, 416

profundana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérfoltos tükrösmoly – 5, 13, 15, 36, 42, 45, 51, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 152, 167, 177, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416

Aterpia Guenée, 1845

corticana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sisakvirág-tükrösmoly (sisakvirágmoly) – 5, 13, 15, 119, 142, 167, 177, 189, 235, 415

Selenodes Guenée, 1845

karelica (Tengström, 1875) – varfü-tükrösmoly (varfümoly) – 142, 167, 178, 396, 415
= *Frölichia textana* (Frölich, 1828) – 5, 22, 23, 51, 52

Pseudosciaphila Obraztsov, 1966

branderiana (Linnaeus, 1758) – homoki tükrösmoly – 5, 15, 34, 36, 45, 51, 77, 78, 99, 119, 142, 152, 167, 184, 189, 210, 235, 263, 280, 294, 301, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

Apotomis Hübner, 1825

semifasciana (Haworth, [1811]) – füzrügysodró tükrösmoly – 5, 52, 74, 77, 78, 126, 142, 178, 184, 189, 235, 301, 387, 396, 415, 416

infida (Heinrich, 1926) – fehérfüz-tükrösmoly – 369, 415, 416

lineana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – füz-sodró tükrösmoly – 5, 31, 36, 38a, 51, 52, 77, 99, 119, 126, 142, 178, 183, 189, 210, 235, 274, 294, 296, 385, 387, 396, 415, 416
= *hartmanniana* (Linnaeus, 1761) – 15
= *scriptana* Hübner, 1799 – 22, 23,

inundana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kormos tükrösmoly – 5, 15, 31, 45, 78, 119, 142, 167, 210, 297, 333, 386, 396, 415, 416

turbidana Hübner, [1825] – nyárfalevélsodró tükrösmoly – 5, 22, 45, 51, 52, 70, 78, 119, 142, 167, 178, 184, 194, 210, 232, 262, 280, 294, 297, 301, 385, 386, 396, 415, 416

betuletana (Haworth, [1811]) – nyírfalevélsodró tükrösmoly – 5, 22, 77, 142, 210, 274, 386, 396, 415, 416

capreana (Hübner, [1817]) – füzrügysodró tükrösmoly – 5, 13, 15, 31, 52, 119, 126, 134, 178, 184, 189, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416

sororculana (Zetterstedt, 1839) – nyíres tükrösmoly – 45, 51, 52, 59, 142, 167, 178, 183, 184, 220, 235, 260, 386, 396, 415, 416

sauciana (Frölich, 1828) – feketeáfonya-tükrösmoly – 5, 22, 119, 189, 235, 386, 415

Orthotaenia Stephens, 1829

undulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csalánsodró tükrösmoly – 5, 31, 51, 52, 77, 78, 119, 122, 135, 142, 167, 178, 183, 184, 210, 260, 274, 280, 297, 301, 321, 333, 386, 387, 396, 415, 416
= *urticana* (Hübner, 1796-99) – 15

Hedya Hübner, 1825

salicella (Linnaeus, 1758) – fehérhátú tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 52, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

nubiferana (Haworth, [1811]) – rügysodró tükrösmoly – 5, 24, 28, 31, 36, 38a, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 134, 135, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

= *dimidioalba* (Retzius, 1783) – 126, 142, 167, 221

= *variegana* Hübner, 1799 – nom. praeocc. – 5, 13, 15, 22, 23

pruniana (Hübner, [1799]) – szilvarügy-tükrösmoly (szilvarügymoly) – 5, 13, 15, 27, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 119, 122, 134, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

dimidiana (Clerck, 1759) – sárgásfoltú tükrösmoly – 15, 63, 119, 142, 152, 386, 415

ochroleucana (Frölich, 1828) – rózsalevélsodró tükrösmoly – 5, 15, 36, 119, 142, 189, 210, 235, 297, 307, 386, 396, 415, 416, 421

Metendothenia Diakonoff, 1973

atropunctana (Zetterstedt, 1839) – pettyes tükrösmoly – 5, 31, 36, 45, 51, 59, 77, 78, 99, 119, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396, 415, 416

Celypha Hübner, 1825

rufana (Scopoli, 1763) – ürömfűró tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 77, 119, 122, 126, 135, 142, 167, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416

striana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pitypangfűró tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

rurestrana (Duponchel, 1843) – hölgymál-tükrösmoly – 5, 22, 36, 38a, 51, 142, 189, 235, 386, 396, 415, 416

capreolana (Herrich-Schäffer, [1851]) – hölgymálmoly – 5, 22, 23, 31, 51, 52, 77, 78, 142, 178, 184, 210, 263, 294, 301, 310, 363, 385, 386, 396, 415, 416

flavipalpana (Herrich-Schäffer, [1851]) – öthorgú tükrösmoly – 5, 15, 51, 59, 77, 99, 119, 122, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 232, 235, 263, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416

cespitana (Hübner, [1817]) – mezei tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 31, 36, 51, 52, 77, 119, 126, 178, 183, 184, 189, 210, 235, 262, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396, 415, 416

woodiana (Barrett, 1882) – fagyöngy-tükrösmoly – 142, 146, 415

lacunana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vízparti tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 38a, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

siderana (Treitschke, 1835)*⁷⁴ – csillagos tükrösmoly – 5, 15, 119, 415

rivulana (Scopoli, 1763) – dudvasodró tükrösmoly – 5, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

doubledayana (Barrett, 1872) – lápréti tükrösmoly – 5, 31, 51, 52, 77, 99, 122, 126, 134, 178, 321, 392, 396, 415

aurofasciana (Haworth, [1811]) – moharágó tükrösmoly – 207, 231, 386, 415

Phiaris Hübner, 1825

umbrosana (Freyer, 1840) – árnyéklakó tükrösmoly – 5, 13, 15, 31, 51, 77, 119, 142, 386, 387, 396, 415, 416

stibiana (Guenée, 1845) – sárgavillás tükrösmoly – 5, 13, 15, 31, 51, 119, 210, 263, 294, 301, 385, 396, 415, 416

micana ([Denis & Schiffermüller], 1775)*⁷⁵ – ezüstös tükrösmoly – 195
= *olivana* Treitschke, in Ochsenheimer, 1830. – 142

Pristerognatha Obraztsov, 1960

penthinana (Guenée, 1845) – mimózamoly – 5, 36, 45, 142, 189, [235], 294, 385, 386, 415

[*fuligana* ([Den. & Schiff., 1775) – „bogáncsfűró tükrösmoly” – 189, 232, 235 280, 297, 321, 386, 396 erroneous]

Cymolomia Lederer, 1859

hartigiana (Ratzeburg, 1840) – havasi tükrösmoly – 5, 35, 119, 386, 396, 415, 416

Argyroploce Hübner, 1825

roseomaculana (Herrich-Schäffer, [1851])*⁷⁶ – körtikemoly – 5, 188, 189, 195, 330

Olethreutes Hübner, 1822

arcuella (Clerck, 1759) – avarevő tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

Piniphila Falkovitsh, 1962

bifasciana (Haworth, [1811]) – tobozragó tükrösmoly – 77, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 210, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 385, 387, 396, 415, 416
= *decrepitatus* (Herrich-Schäffer, [1851]) – 5, 36, 51, 59, 78

***Pseudohermenias* Obraztsov, 1960**

abietana (Fabricius, 1787) – fenyőtű-tükrösmoly – 119, 167, 189, 210, 235, 263, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
= *hercyniana* (Beckstein & Scharfenberg, 1804) – 72
= *clausalthiana* (Saxesen, 1840) – 5, 22, 45, 78

Olethreutinae – Lobesiini

***Lobesia* Guenée, 1845**

euphorbiana (Freyer, [1840]) – kutyatej-tükrösmoly – 5, 52, 77, 126, 178, 387, 415, 416
occidentis Falkovitsh, 1970 – sárkutyatej-tükrösmoly – 324, 415
botrana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szőlőragó tükrösmoly (tarka szőlőmoly) – 5, 13, 15, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 235, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
abscisana (Doubleday, 1849) – bogáncsfúró tükrösmoly (meredeksávós tükrösmoly) – 77, 119, 167, 210, 274, 280, 294, 301, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *fuligana* sensu (Haworth, 1811) nec ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 5, 22, 23, 31, 36, 51, 126
reliquana (Hübner, 1825) – erdei tükrösmoly – 5, 35, 45, 51, 52, 70, 99, 119, 134, 167, 178, 210, 232, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 385, 386, 396, 415, 416
bicinctana (Duponchel, 1844) – kétesikű tükrösmoly – 5, 13, 14, 15, 22, 31, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 126, 134, 167, 177, 178, 184, 210, 221, 232, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 330, 385, 396, 415, 416
artemisiana (Zeller, 1847) – atracél-tükrösmoly – 5, 15, 31, 51, 77, 119, 177, 183, 184, 189, 294, 301, 321, 333, 385, 387, 396, 415, 416

Olethreutinae – Eucosmini

***Eriopsela* Guenée, 1845**

quadrana (Hübner, [1813]) – ördögfü-tükrösmoly – 5, 36, 142, 189, 235, 294, 385, 415

***Thiodia* Hübner, 1825**

torridana (Lederer, 1859) – fehéröves tükrösmoly – 119, 167, 210, 260, 280, 301, 321, 386, 387, 396, 415, 416
= (*Foveifera*) *hastana* (Hübner, [1796–1799]) – 5, 14, 31, 51, 135, 184
lerneana (Treitschke, 1835) – piros tükrösmoly – 5, 53, 174, 210, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 396, 415, 416
citrana (Hübner, [1799]) – citromsárga tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
trochilana (Frölich, 1828) – dárdahere-tükrösmoly – 5, 51, 134, 167, 210, 221, 232, 263, 294, 310, 321, 385, 387, 396, 415, 416

***Rhopobota* Lederer, 1859**

myrtillana (Humphreys et Westwood, 1845) – áfonya-tükrösmoly – 5, 35, 45, 78, 142, 184, 386, 415
stagnana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – horpadtsávú tükrösmoly – 5, 23, 31, 35, 51, 53, 77, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 184, 189, 194, 210, 232, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *fractifasciana* (Haworth, 1811) – 13, 15
naevana (Hübner, [1817]) – márványos tükrösmoly – 5, 42, 45, 51, 59, 77, 78, 99, 119, 142, 167, 177, 178, 189, 274, 280, 294, 297, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *unipunctana* (Haworth, 1811) – 184

***Spilonota* Stephens, 1829**

ocellana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szemes tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 35, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 262, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

laricana (Heinemann, 1863) – vörösfenyő-tükrösmoly – 47, 52, 59, 62, 78, 119, 142, 167, 178, 274, 297, 386, 396, 415, 416

***Gibberifera* Obratzsov, 1946**

simplana (Fischer von Röslerstamm, 1836) – rezgőnyárfa-tükrösmoly – 5, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 210, 235, 274, 280, 301, 333, 386, 387, 396, 415, 416

***Epinotia* Hübner, 1825**

sordidana (Hübner, [1824]) – égersodró tükrösmoly – 5, 45, 77, 78, 167, 210, 294, 297, 385, 386, 387, 396, 415, 416

caprana (Fabricius, 1798) – kecskefűz-tükrösmoly – 231, 233, 294, 385, 415, 421

trigonella (Linnaeus, 1758) – nyírfalevél-tükrösmoly – 178, 189, 235, 274, 297, 386, 396, 415, 416
= *stroemiana* (Fabricius, 1781) – 5, 23, 45, 51, 70, 78

brunnichana (Linnaeus, 1767) – nagyfoltú tükrösmoly – 43, 45, 78, 142, 184, 363, 386, 415, 416

maculana (Fabricius, 1775) – fekete tükrösmoly – 5, 78, 386, 396, 415, 416

solandriana (Linnaeus, 1758) – égerlevél-tükrösmoly – 31, 45, 78, 167, 184, 386, 415, 416

abbreviana (Fabricius, 1794) – juharlevél-tükrösmoly – 167, 177, 184, 189, 274, 294, 385, 396, 415, 416
= *trimaculana* (Donovan, [1806]) – 5, 13, 15, 51

festivana (Hübner, [1799]) – barnatövű tükrösmoly – 5, 22, 23, 35, 36, 45, 51, 52, 99, 134, 142, 167, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416

granitana (Herrich-Schäffer, [1851]) – lucfenyőkéreg-tükrösmoly – 5, 52, 78, 119, 178, 294, 310, 385, 396, 415, 416

signatana (Douglas, 1845)*⁷⁷ – májusfa-tükrösmoly – 5, 23, 415

cruciana (Linnaeus, 1761)*⁷⁸ – szeder-tükrösmoly – 46, 78, 396, 415, 416

immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839) – lápréti tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 36, 45, 51, 77, 119, 126, 167, 183, 184, 189, 220, 235, 274, 294, 301, 385, 387, 415, 416

[*rhomboidella* (Geoffroy, 1785) – partim: 195, 210, 297, 386, 396 – erroneous, incorrectly used name]

thapsiana (Zeller, 1847) – édeskömény-tükrösmoly – 5, 142

kochiana (Herrich-Schäffer, [1851]) – zsályaszövő tükrösmoly – 5, 22, 134, 167, 177, 189, 294, 363, 385, 396, 415, 416

nanana (Treitschke, 1835) – fenyősovány-tükrösmoly – 5, 35, 77, 78, 134, 142, 167, 184, 210, 274, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416

demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840) – barkaszövő tükrösmoly – 5, 45, 51, 78, 184, 274, 294, 301, 321, 385, 386, 396, 415, 416

subocellana (Donovan, 1806) – füzlevélsodró tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 36, 51, 77, 78, 119, 167, 189, 210, 235, 274, 296, 297, 386, 396, 415, 416

tetraquetrana (Haworth, [1811]) – nyírfűró tükrösmoly – 5, 22, 35, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 142, 178, 184, 189, 235, 263, 274, 294, 301, 321, 385, 386, 396, 415, 416

pygmaeana (Hübner, [1799]) – fenyveslakó tükrösmoly – 133, 167, 415, 416

tenerana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyírbarka-tükrösmoly – 5, 45, 51, 78, 142, 167, 232, 274, 294, 297, 321, 385, 386, 396, 415, 416

ramella (Linnaeus, 1758) – ékfoltos tükrösmoly – 5, 45, 51, 70, 77, 78, 126, 142, 167, 178, 220, 294, 297, 301, 330, 385, 386, 396, 415, 416

nigricana (Herrich-Schäffer, 1851)*⁷⁹ – jegenyefenyő-tükrösmoly – 5, 333, 415

pusillana (De Peyerimhoff, 1863) – apró fenyőtűmoly – 5, 36, 189, 235, 415

tedella (Clerck, 1759) – fenyő-tükrösmoly – 5, 13, 15, 31, 35, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 126, 142, 167, 178, 183, 184, 210, 274, 297, 301, 310, 386, 387, 396, 415, 416

bilunana (Haworth, [1811]) – félholdas tükrösmoly – 5, 35, 36, 51, 52, 53, 78, 126, 184, 189, 220, 232, 235, 274, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416

nisella (Clerck, 1759) – nyárfabarka-tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 45, 51, 52, 77, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 194, 210, 232, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416

nigristriana Budashkin & Zlatkov, 2011 – tölgyjáró tükrösmoly – 331, 332, 335, 385, 396, 415, 421

***Lepteucosma* Diakonoff, 1971**

huebneriana Koçak, 1980 – málnalevélsodró tükrösmoly – 177, 189, 387, 415, 416, 396
= *ustulana* (Hübner, 1813) – 46

***Zeiraphera* Treitschke, 1829**

griseana (Hübner, [1799]) – fenyőtűszövő tükrösmoly – 23, 142, 152, 167, 178, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 274, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416

= *diniana* (Guenée, 1845) – 5, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 78, 99, 119, 122, 184

rufimitrana (Herrich-Schäffer, [1851]) – fenyőrügy-tükrösmoly – 5, 13, 15, 31, 51, 52, 77, 119, 178, 297, 294, 385, 396, 415

ratzeburgiana (Saxesen, 1840) – lucfenyő-tükrösmoly – 225, 231, 415, 416
= *bimaculana* (Schläger, 1848) – 5

isertana (Fabricius, 1794) – tölgyesodró tükrösmoly – 5, 22, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416

= *corticana* Hübner, 1813 – 13, 15

***Crociosema* Zeller, 1847**

plebejana Zeller, 1847 – déli tükrösmoly – 5, 36, 51, 53, 126, 142, 167, 184, 189, 232, 235, 260, 294, 297, 307, 321, 385, 386, 396, 415, 416

***Phaneta* Stephens, 1852**

pauperana (Duponchel, 1843) – gyepűrózsa-tükrösmoly – 5, 51, 53, 99, 122, 152, 167, 177, 184, 189, 210, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 396, 415, 416

***Pelochrista* Lederer, 1859**

decolorana (Freyer, 1840) – fakó tükrösmoly – 5, 23, 31, 52, 53, 77, 119, 167, 178, 183, 184, 210, 260, 280, 301, 307, 310, 321, 386, 387, 396, 415, 416

obscura Kuznetsov, 1978 – szikréti tükrösmoly – 340, 415, 416

griseolana (Zeller, 1847) – szemcsés tükrösmoly – 340, 415, 416

caecimaculana (Hübner, [1799]) – vakfoltú tükrösmoly – 5, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

mollitana (Zeller, 1847) – mediterrán tükrösmoly – 152, 167, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 280, 294, 297, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

= *tresignana* (Nolcken, 1870) – 5, 22, 36, 77

= *commodestana* (Rössler, 1877) – 5, 22, 77, 126, 184

modicana (Zeller, 1847) – sárgásszürke tükrösmoly – 5, 99, 142, 184, 294, 301, 307, 310, 321, 385, 396, 415, 416

subtiliana (Jäckh, 1960) – poros tükrösmoly – 5, 184, 210, 235, 256, 415

infidana (Hübner, [1824]) – mezeiüröm-tükrösmoly – 5, 51, 52, 77, 99, 126, 167, 178, 210, 263, 294, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 387, 396, 415, 416

latericana (Rebel, 1919) – pannon tükrösmoly – 5, 77, 184, 210, 301, 415, 416

hepatariana (Herrich-Schäffer, [1851]) – májszínű tükrösmoly – 5, 15, 23, 36, 119, 189, 210, 235, 260, 280, 294, 321, 385, 386, 396, 415, 416

arabescana (Eversmann, 1844) – arabeszkmoly – 5, 51, 134, 210, 294, 385, 396, 415, 416

lugubrana (Treitschke, 1830)*⁸⁰ – hagymarágó tükrösmoly – 5, 36, 51, 53, 77, 134, 167, 177, 184, 189, 210, 221, 235, 263, 294, 310, 321, 385, 387, 396, 415, 416

***Eucosma* Hübner, 1823**

obumbratana (Lienig & Zeller, 1846) – nádi tükrösmoly – 99, 119, 142, 152, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 260, 296, 297, 301, 333, 386, 387, 396, 415, 416

- = *expallidana* auct., nec Haworth, 1811 – 5, 13, 15, 17, 31, 42, 51, 52, 59,
cana (Haworth, [1811]) – aszatvirág-tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77,
 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 262, 263,
 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
hohenwartiana ([Denis & Schiffermüller], 1775)*⁸¹ – bogáncsvirág-tükrösmoly – 5, 22, 23, 31, 36,
 45, 51, 52, 53, 77, 87, 99, 119, 122, 134, 142, 152, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 209, 210, 221, 235,
 243, 260, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
 = *jaceana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – 5, 15, 51, 52, 119, 122, 184, 189
 = *scopoliana* (Haworth, [1811]) – 13, 15, 17,
 = *fulvana* (Stephens, 1834) – vörhenyes tükrösmoly; its species eligibility (validity) has not been proven – 5, 15,
 22, 36, 45, 51, 78, 52, 178, 189, 209, 333, 415, 416
flavispecula Kuznetsov, 1964 – imola-tükrösmoly – 215, 231, 260, 274, 296, 297, 301, 333, 387,
 396, 415, 416
tetraplana (Möschler, 1866) – bélmegyeri tükrösmoly – 408
parvulana (Wilkinson, 1859) – zsoltnavirág-tükrösmoly – 209, 231, 235, 296, 297, 301, 321, 386,
 396, 415, 416
 = *scutana* (Constant, 1893) – 5, 22, 23, 152, 183, 184, 189, 219, 220, 260, 280
conformana (Mann, 1872)*⁸² – fémcsávós tükrösmoly – 5, 126, 415
balatonana (Osthelder, 1937) – dunántúli tükrösmoly – 183, 184, 189, 235, 280, 294, 297, 321, 385,
 396, 415, 416
 = *danicana* Schantz, 1962 – 5, 77
campoliliana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – feketefoltos tükrösmoly – 5, 31, 45, 52, 74, 119,
 183, 184, 189, 210, 235, 263, 294, 297, 301, 385, 386, 396, 415, 416
 = *nigromaculana* Haworth, 1811 – 15
aemulana (Schläger, 1849)*⁸³ – aranyvessző-tükrösmoly – 5, 23, 415, 416
 = *latiorana* (Herrich-Schäffer, 1851) – 5, 20
tripoliana (Barrett, 1880) – sziki tükrösmoly – [5], 210, 252, 280, 294, 310, 385, 415, 416
lacteana (Treitschke, 1835) – fehér tükrösmoly – 5, 31, 35, 36, 42, 51, 59, 99, 126, 134, 178, 189,
 232, 235, 274, 294, 297, 301, 321, 385, 396, 415, 416
 = *maritima* (Humphreys & Westwood, 1845) – 5, 74, 122, 183, 184
albidulana (Herrich-Schäffer, [1851]) – zsolttina-tükrösmoly – 5, 13, 17, 22, 23, 31, 35, 36, 51, 52,
 59, 77, 99, 119, 134, 142, 152, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280,
 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
fervidana (Zeller, 1847)*⁸⁴ – tűzes tükrösmoly – 5, 415
metzneriana (Treitschke, 1830) – ürömgöyökér-tükrösmoly – 5, 15, 17, 22, 31, 35, 36, 42, 45, 51, 52,
 53, 77, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243,
 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
tundrana (Kennel, 1900) – tundramoly – 5, 51, 184, 210, 221, 232, 235, 294, 297, 301, 321, 385, 396,
 415, 416
messagingiana (F. von Röslerstamm, 1837) – parlagi tükrösmoly – 5, 77, 126, 210, 387, 415, 416
wimmerana (Treitschke, 1835) – ürömgubacs-tükrösmoly – 5, [31], 36, 77, 189, 235, 294, 321, 385,
 387, 396, 415, 416
 = *incana* ([Lienig] & Zeller, 1846) – 5, 22, 23, 35, 36
conterminana (Guenée, 1845) – saláta-tükrösmoly (salátamoly) – 5, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 42, 45,
 51, 52, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221,
 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415
aspidiscana (Hübner, [1817]) – aranyfürt-tükrösmoly – 5, 35, 51, 122, 178, 183, 184, 294, 321, 385,
 396, 415
pupillana (Clerck, 1759) – aprószemű tükrösmoly – 5, 51, 122, 126, 135, 167, 184, 210, 221, 232,
 294, 296, 297, 321, 385, 396, 415, 416
Epibactra Ragonot, 1894
immundana (Eversmann, 1844) – keleti szittyómoly – 301, 415, 416
 = *sareptana* auct. – 5, 31, 310, 321, 386, 396

Gypsonoma Meyrick, 1895

- minutana* (Hübner, [1799]) – fehérnyár-tükrösmoly – 5, 15, 36, 51, 52, 59, 77, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 235, 260, 274, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- obraztsovi* Amsel, 1959 – Obratsov tükrösmolya – 261, 415, 416, INT²
- dealbana* (Frölich, 1828) – barkarágó tükrösmoly – 5, 13, 15, 45, 51, 59, 77, 99, 126, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- oppressana* (Treitschke, 1835) – nyárfa-tükrösmoly – 5, 33, 34, 35, 36, 51, 78, 122, 126, 167, 184, 189, 194, 210, 235, 274, 301, 396, 415, 416
- sociana* (Haworth, [1811]) – tölgyfalevél-tükrösmoly – 5, 31, 36, 45, 51, 52, 77, 78, 142, 167, 178, 184, 210, 235, 260, 294, 301, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *neglectana* Duponchel, 1844 – 13, 15
- nitidulana* (Lienig & Zeller, 1846) – rezgőnyár-tükrösmoly – 5, 70, 77, 78, 119, 142, 167, 178, 184, 210, 274, 301, 386, 387, 396, 415, 416
- aceriana* (Duponchel, 1843) – nyárfahajtás-tükrösmoly – 5, 31, 35, 59, 77, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 235, 260, 297, 301, 321, 387, 396, 415, 416

Epiblema Hübner, 1825

- sticticana* (Fabricius, 1794) – fehérpettyes tükrösmoly – 142, 167, 177, 178, 189, 210, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *farfarae* (Fletcher, 1938) – 5, 23, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 119, 122
= *brunnichiana* (Hübner, 1825) – 13, 15
- scutulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – réti tükrösmoly – 5, 14, 22, 31, 35, 36, 38a, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *lucuosana* (Duponchel, 1835) – 15
= *pflugiana* (Haworth, 1811) – 13, 15, 17
- foenella* (Linnaeus, 1758) – kampósoltú tükrösmoly – 5, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 31, 35, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- sarmatana* (Christoph, 1872) – zanót-tükrösmoly –
= *fuchsiana* (Rössler, 1877) – 388, 421
- junctana* (Herrich-Schäffer, [1856]) – turjáni tükrösmoly – 5, 15, 22, 31, 52, 77, 78, 99, 119, 126, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 232, 260, 274, 280, 301, 321, 387, 396, 415, 416
- hepaticana* (Treitschke, 1835) – májfoltos tükrösmoly – 5, 15, 23, 31, 45, 51, 52, 78, 119, 134, 152, 184, 210, 260, 294, 385, 386, 396, 415, 416
- turbidana* (Treitschke, 1835) – acsalapurágó tükrösmoly – 5, 15, 119, 167, 396, 415, 416
- grandaevana* (Lienig & Zeller, 1846) – acsalapu-tükrösmoly – 146, 274, 396, 415, 416
- graphana* (Treitschke, 1835) – cickafark-tükrösmoly – 5, 31, 51, 122, 126, 134, 177, 183, 184, 189, 232, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 387, 396, 415, 416
- mendiculana* (Treitschke, 1835) – hegyi tükrösmoly – 5, 174, 294, 385, 415
= *hungaricana* (Herrich-Schäffer, 1851) – 5
- similana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyírlakó tükrösmoly – 5, 36, 53, 167, 177, 189, 210, 235, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 330, 385, 396, 415, 416
= *asseclana* (Hübner, 1799) – 13, 15, 77, 119, 134, 184
- inulivora* (Meyrick, 1932) – peremizsszár-tükrösmoly – 5, 36, 294, 385, 415, 416
= *obscurana* (Herrich-Schäffer, 1851) nec Frölich, 1828 – 134, 135, 152, 167, 177, 183, 184, 189, 210, 235, 310

Notocelia Hübner, 1825

- cynosbatella* (Linnaeus, 1758) – rózsahajtás-tükrösmoly – 5, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *tripunctana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 13, 15, 22, 23

- uddmanniana* (Linnaeus, 1758) – málnasodró tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- roborana* ([Denis & Schifferrmüller], 1775) – rózsarügy-tükrösmoly – 5, 13, 15, 17, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 274, 294, 297, 333, 385, 387, 415, 416
- = *aquana* Hübner, 1799 – 22, 23, 210, 232, 235, 260, 262, 263, 280, 310, 386, 396
- incarnatana* (Hübner, [1800]) – jajrózsa-tükrösmoly – 5, 13, 15, 22, 51, 52, 77, 78, 99, 119, 122, 134, 135, 142, 167, 177, 184, 189, 210, 232, 243, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- mediterranea* (Obraztsov, 1952) – olasz tükrösmoly – 432
- rosaecolana* (Doubleday, 1850) – rózsalakó tükrösmoly – 174, 231, 233, 235, 294, [301], 330, 385, 396
- trimaculana* (Haworth, [1811]) – galagonya-tükrösmoly – 77, 99, 119, 122, 134, 135, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 260, 262, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- = *suffusana* (Duponchel, 1843) – 5, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78
- Pseudococcyx** Swatschek, 1958
- posticana* (Zetterstedt, 1839) – erdeifenyő-gyantamoly – 215, 231, 301, 321, 415, 416
- turionella* (Linnaeus, 1758) – fenyőrügyfűró gyantamoly – 5, 59, 77, 142, 167, 178, 184, 210, 232, 301, 310, 321, 387, 396, 415, 416
- Retinia** Guenée, 1845
- resinella* (Linnaeus, 1758) – kormos gyantamoly – 5, 35, 59, 119, 152, 167, 178, 210, 232, 263, 294, 301, 385, 396, 415, 416
- perangustana* (Snellen, 1883) – vörösfenyő-gyantamoly – 324, 415, 416
- Gravitarmata** Obraztsov, 1946
- margarotana* (Heinemann, 1863) – márványos gyantamoly – 127, 210, 280, 294, 297, 301, 310, 315, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- Rhyacionia** Hübner, 1825
- buoliana* ([Denis & Schifferrmüller], 1775) – fenyőilonca – 5, 13, 14, 15, 22, 24, 28, 35, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- pinicolana* (Doubleday, 1849) – piros gyantamoly – 5, 22, 45, 51, 59, 77, 122, 134, 167, 178, 184, 184, 210, 221, 232, 235, 280, 294, 297, 301, 310, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- hafneri* (Rebel, 1937) – rácsos gyantamoly – 215, 231, 294, 297, 301, 321, 385, 396, 415, 416
- pinivorana* (Lienig & Zeller, 1846) – tarka gyantamoly – 5, 22, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 189, 210, 215, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- duplana* (Hübner, [1813]) – sötét gyantamoly – 5, 31, 51, 52, 59, 77, 119, 142, 167, 178, 301, 396, 415, 416
- Corticivora** Clarke, 1951
- piniana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – apró gyantamoly – 89, 98, 167, 235, 387, 396, 415, 416
- Olethreutinae – Enarmoniini**
- Eucosmomorpha** Obraztsov, 1951
- albersana* (Hübner, [1813]) – hóbogyómoly – 5, 78, 119, 152, 177, 184, 189, 210, 280, 294, 297, 385, 387, 396, 415, 416
- Enarmonia** Hübner, 1826
- formosana* (Scopoli, 1763) – kéregmoly – 5, 14, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 122, 126, 167, 178, 184, 189, 232, 235, 260, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 330, 385, 396, 415, 416
- = *woeberiana* ([Denis & Schifferrmüller], 1775) – 13, 15
- Ancylis** Hübner, 1825

- uncella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hangarágó horgasmoly – 5, 45, 51, 70, 78, 119, 142, 178, 297, 301, 386, 396, 415, 416
= *uncana* Hübner, 1899 – 15
- laetana* (Fabricius, 1775) – fehér horgasmoly – 5, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- obtusana* (Haworth, [1811]) – kutyabenge-horgasmoly – 5, 51, 52, 59, 78, 99, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- comptana* (Frölich, 1828) – számóca-horgasmoly – 5, 13, 15, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396, 415, 416
- upupana* (Treitschke, 1835) – szilsodró horgasmoly – 5, 45, 51, 99, 134, 142, 260, 280, 294, 301, 385, 386, 396, 415, 416
- geminana* (Donovan, 1806) – hullámos horgasmoly – 5, 14, 22, 36, 45, 51, 77, 78, 119, 142, 167, 189, 210, 235, 280, 297, 301, 363, 386, 387, 396, 415, 416
= *biarcuana* Stephens, 1834 – 15, 22
- subarcuana* (Douglas, 1847) – cinegefűz-horgasmoly – 133, 210, 301, 387, 396, 415, 416
- diminutana* (Haworth, [1811]) – apró horgasmoly – 5, 13, 31, 36, 45, 51, 52, 70, 77, 78, 119, 126, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 274, 280, 297, 301, 321, 386, 387, 396, 415, 416
- selenana* (Guenée, 1845) – sötét horgasmoly – 15, 36, 45, 51, 59, 99, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 210, 235, 280, 297, 301, 321, 386, 396, 415, 416
- unculana* (Haworth, [1811]) – szedersodró horgasmoly – 5, 31, 34, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 307, 310, 321, 330, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *derasana* Hübner, 1813 – 13, 15, 17,
- myrtillana* (Treitschke, 1830)*⁸⁵ – áfonyasodró horgasmoly – 5, 415, 416
- apicella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bengesodró horgasmoly – 5, 14, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *siculana* Hübner, 1799 – 13, 15
- paludana* (Barrett, 1871) – turjáni horgasmoly – 5, 15, 31, 34, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 189, 210, 221, 260, 263, 274, 280, 294, 301, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416
- badiana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bükkönysodró horgasmoly – 5, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 78, 119, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 210, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
= *lundana* Fabricius, 1776 – 13, 15, 45
- achata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – márványos horgasmoly – 5, 13, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 260, 262, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- mitterbacheriana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgysodró horgasmoly – 5, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 53, 59, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416
- tineana* (Hübner, [1799]) – galagonyasodró horgasmoly – 5, 51, 59, 77, 99, 142, 152, 167, 184, 194, 210, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 307, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416

Olethreutinae – Grapholitini

Cydia Hübner, 1825

- nigricana* (Fabricius, 1794) – borsómoly – 5, 13, 15, 22, 31, 36, 51, 52, 178, 189, 232, 235, 263, 274, 280, 294, 297, 321, 385, 396, 415, 416
= *rusticella* (Clerck, 1759) – 119, 126, 167, 184
- oxytropidis* (Martini, 1912) – csajkavirág-moly – 5, 31, 36, 52, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 396, 415, 416

- succedana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kerepmagmoly – 5, 13, 15, 17, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- ilipulana* (Walsingham, 1903) – spanyol tükrösmoly – 283, 385, 415, 416
- medicaginis* (Kuznetsov, 1962) – lucerna-magrágómoly – 69, 77, 78, 99, 119, 134, 167, 183, 184, 189, 235, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 330, 385, 396, 415, 416
- microgrammana* (Guenée, 1845) – iglice-magrágómoly – 5, 23, 36, 51, 77, 97, 126, 167, 184, 189, 221, 235, 260, 280, 301, 321, 333, 387, 396, 415, 416
- interscindana* (Möschler, 1866) – boróka-tükrösmoly – Am – 332, 358, 415, 416, 423
- duplicana* (Zetterstedt, 1839) – barna fenyőkéregmoly – 5, 35, 51, 77, 99, 167, 321, 333, 387, 396, 415, 416
- illutana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – fenyőhajtás-gubacsmoly – 5, 119, 415
- conicolana* (Heylaerts, 1874) – fenyőhajtás-tükrösmoly – 5, 35, 51, 52, 59, 99, 134, 178, 184, 210, 232, 280, 294, 297, 301, 310, 385, 386, 396, 415, 416
- corollana* (Hübner, [1822–1823]) – rezgőnyár-gubacsmoly – 5, 35, 184, 415, 416
- coniferana* (Saxesen, 1840) – fenyőrákmoly – 5, 59, 77, 78, 142, 178, 184, 210, 297, 301, 386, 387, 396, 415, 416
- indivisa* (Danilevsky, 1963) – vörösfenyő-tobozmoly – 281, 386, 396, 415, 416
- cosmophorana* (Treitschke, 1835) – gyantarágó tükrösmoly – 5, 36, 189, 235, 294, 301, 385, 415, 416
- strobilella* (Linnaeus, 1758) – fenyőhajtásmoly – 5, 51, 99, 126, 167, 210, 232, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- pactolana* (Zeller, 1840) – fenyőkéregmoly – 5, 35, 36, 52, 78, 142, 167, 178, 189, 210, 232, 235, 263, 280, 294, 333, 385, 396, 415, 416
- grunertiana* (Ratzeburg, 1868) – északi vörösfenyőmoly (északi tükrösmoly) – 215, 231, 415
- millenniana* (Adamczewski, 1967) – vörösfenyő-gubacsmoly – 231, 243, 386, 396, 415, 416
[zebeana (Ratzeburg, 1840) – 5, 119, 185, 231 – erroneous, incorrectly used name]
- pomonella* (Linnaeus, 1758) – almamoly – 5, 13, 14, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- pyrivora* (Danilevsky, 1947) – körtémoly – 5, 22, 52, 62, 78, 142, 167, 178, 210, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- servillana* (Duponchel, 1836) – kecskefűz-gubacsmoly – 5, 35, 52, 178, 260, 396, 415, 416
- exquisitana* (Rebel, 1889) – déli magrágómoly – 5, 307, 415, 416
- leguminana* (Lienig & Zeller, 1846) – keleti magrágómoly – 5, 45, 119, 301, 386, 415, 416
- splendana* (Hübner, [1799]) – tölgymakkmoly – 5, 14, 22, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 178, 183, 184, 189, 274, 294, 301, 333, 385, 387, 415, 416
= *reaumurana* (Heinemann, 1863) – 13, 15
= *penkleriana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 142, 167, 177, 221
= *triangulella* (Goeze, 1783) – 194, 210, 232, 235, 260, 263, 280, 297, 310, 321, 363, 386, 396
- fagiglandana* (Zeller, 1841) – bükkmakkmoly – 5, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 78, 119, 122, 134, 135, 142, 152, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 260, 262, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *grossana* (Haworth, 1811, nec Thunberg, 1791) – 13, 15, 17,
- amplana* (Hübner, [1800]) – mogyorómoly – 5, 15, 23, 36, 51, 52, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 210, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 396, 415, 416
- inquinatana* (Hübner, [1799]) – juharmag-tükrösmoly – 5, 22, 52, 184, 294, 297, 330, 385, 396, 415, 416
- Lathronympha*** Meyrick, 1926
- strigana* (Fabricius, 1775) – orbáncfű-magrágómoly – 5, 22, 23, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 210, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
= *hypericana* (Hübner, 1799) – 13, 15, 17, 22, 23

Grapholita Treitschke, 1829

- fissana* (Frölich, 1828) – bükkönymagmoly – 5, 13, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 78, 119, 134, 142, 167, 178, 189, 210, 235, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- compositella* (Fabricius, 1775) – lucernahüvelymoly – 5, 13, 15, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 167, 178, 184, 189, 232, 235, 274, 280, 297, 301, 386, 396, 415, 416
- delineana* Walker, 1863 – kis kendermoly – 184, 189, 210, 235, 294, 301, 307, 385, 387, 396, 415, 416
= *sinana* (Felder & Rogenhofer, 1875) – 5, 36, 51, 77
- pallifrontana* (Lienig & Zeller, 1846) – csüdfü-magrágómoly – 5, 15, 31, 36, 52, 119, 167, 178, 189, 235, 294, 301, 310, 385, 396, 415, 416
- coronillana* (Lienig & Zeller, 1846) – koronafürt-magrágómoly – 5, 59, 78, 119, 174, 178, 184, 294, 310, 385, 396, 321, 415
- nigrostriana* (Snellen, 1883) – csüdfü-sodrómoly – 419
- caecana* (Schläger, 1847) – baltacim-magrágómoly – 5, 62, 99, 294, 297, 385, 396, 415, 416, 421
- discretana* (Wocke, 1861) – komlómagmoly – 5, 36, 52, 126, 178, 189, 235, 274, 294, 301, 385, 415, 416
- lunulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérfoltos borsómoly – 294, 385, 396, 415
= *dorsana* (Fabricius, 1787) – 5
- orobana* (Treitschke, 1830) – lednek-magrágómoly – 5, 51, 52, 294, 385, 396, 415
- gemmiferana* (Treitschke, 1835) – lednekmagmoly – 5, 35, 36, 51, 126, 167, 174, 184, 189, 210, 210, 221, 232, 235, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 396, 415, 416
- larseni* (Rebel, 1903)*⁸⁶ – fényes magrágómoly – 5, 415
- nebritana* (Treitschke, 1830) – dudafürtmoly – 5, 13, 14, 15, 51, 53, 99, 119, 122, 177, 189, 280, 294, 301, 310, 385, 396, 415, 416
- jungiella* (Linnaeus, 1761) – bükkönyrágó tükrösmoly – 5, 36, 78, 167, 189, 235, 260, 297, 396, 415, 416
- lathyrana* (Hübner, [1813]) – rekettyerügymoly – 5, 52, 178, 297, 396, 415
= *krausiana* Standfuss, 1881 – 5
- lobarzewskii* (Nowicki, 1860) – almamagmoly – 5, 13, 15, 35, 51, 52, 77, 138, 167, 178, 189, 235, 294, 297, 385, 396, 415, 416
- molesta* (Busck in Quaintanc & Wood, 1916) – keleti gyümölcsmoly – Inv – 5, 35, 38a, 51, 52, 53, 77, 99, 126, 142, 178, 184, 232, 243, 294, 296, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415
- funebrana* (Treitschke, 1835) – szilvamoly – 5, 13, 15, 22, 36, 38a, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 243, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- tenebrosana* (Duponchel, 1843) – csipkebogyómoly – 5, 38a, 119, 274, 396, 415
= *roseticolana* Zeller, 1849 – 13, 15
- janthinana* (Duponchel, 1843) – galagonyabogyó-tükrösmoly – 5, 36, 38a, 52, 62, 77, 99, 134, 138, 167, 178, 184, 189, 232, 235, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 387, 396, 415, 416
- Pammene** Hübner, 1825
- splendidulana* (Guenée, 1845) – pompás tükrösmoly – 5, 38a, 51, 52, 59, 78, 174, 178, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- insulana* (Guenée, 1845) – tölgygubacsmoly – 5, 38a, 184, 294, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- ignorata* Kuznetsov, 1968 – szil-tükrösmoly – 72, 215, 396, 415
- gallicolana* (Lienig & Zeller, 1846) – francia gubacsmoly – 13, 38a, 77, 119, 232, 235, 280, 294, 310, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416
- giganteana* (De Peyerimhoff, 1863) – tükrös gubacsmoly – 210, 235, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
= *inquilina* T. Fletcher, 1938 – 5, 13, 15, 35, 38a, 51, 52, 119, 134, 135, 178, 189
- argyrana* (Hübner, [1799]) – feketeszegélyű gubacsmoly – 5, 35, 36, 38a, 45, 52, 119, 134, 178, 189, 235, 280, 294, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- suspectana* (Lienig & Zeller, 1846) – aprófoltos tükrösmoly – 38a, 188, 195, 235, 301, 415, 416
- albuginana* (Guenée, 1845) – sötét gubacsmoly – 5, 35, 38a, 51, 52, 53, 99, 134, 135, 167, 177, 184, 189, 235, 294, 385, 386, 396, 415, 416

- obscurana* (Stephens, 1834) – szürkés gubacsmoly – 188, 195, 301, 386, 396, 415, 416
- amygdalana* (Duponchel, 1842) – aranyos gubacsmoly – 119, 184, 210, 280, 294, 297, 385, 386, 396, 415, 416
- querceti* (Gozmány, 1957) – magyar tölgy-makk-moly – 5, 9, 22, 38a, 51, 126, 174, 184, 260, 263, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 396, 415, 416 – V (10 000 Ft)
- fasciana* (Linnaeus, 1761) – makkfűrómoly – 5, 14, 22, 31, 36, 38a, 45, 51, 52, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396, 415, 416
- = *juliana* Curtis, 1836 – 15
- agnotana* Rebel, 1914 – erdélyi tükrösmoly – 5, 294, 385, 415
- rhediella* (Clerck, 1759) – galagonya-magrágómoly – 5, 51, 52, 99, 134, 167, 178, 189, 294, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- spiniana* (Duponchel, 1843) – kökényvirág-tükrösmoly – 5, 13, 15, 38a, 62, 119, 142, 152, 167, 184, 232, 260, 294, 310, 321, 385, 387, 396, 415, 416
- trauniana* ([Denis & Schiff.], 1775) – mezeijuhar-magrágómoly – 5, 52, 53, 178, 396, 415, 416
- christophana* (Möschler, 1862)*⁸⁷ – aranyfoltos magrágómoly – 5, 415
- regiana* (Zeller, 1849) – hegyijuhar-magrágómoly – 5, 38a, 274, 396, 415, 416
- aurita* Razowski, 1991 – aranylő tükrösmoly – 274, 297, 386, 387, 396, 415, 416
- = *aurantiana* (Staudinger, 1871) – 5, 38a
- germana* (Hübner, [1799]) – kékcíkos tükrösmoly – 5, 51, 52, 53, 99, 134, 167, 178, 184, 294, 297, 385, 415
- ochsenheimeriana* (Lienig & Zeller, 1846)*⁸⁸ – pompás gubacsmoly – 5, [22], 52, 178, 415
- aurana* (Fabricius, 1775) – aranypettyes magrágómoly – 5, 31, 38a, 62, 297, 396, 415, 416
- Strophedra*** Herrich-Schäffer, 1854
- weirana* (Douglas, 1850) – bükklevél-tükrösmoly – 5, 31, 36, 119, 189, 235, 280, 321, 386, 396, 415, 416
- nitidana* (Fabricius, 1794) – tölgylevél-tükrösmoly – 5, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 274, 280, 297, 386, 396, 415, 416
- Dichrorampha*** Guenée, 1845
- gruneriana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – pipitér-gyökérfűrómoly – 5, 174, 189, 235, 294, 310, 385, 396, 415, 416
- podoliensis* (Toll, 1942) – lengyel gyökérfűrómoly – 5, 294, 385, 415
- nigrobrunneana* (Toll, 1942) – sötétbarna gyökérfűrómoly – 77, 283, 415
- plumbana* (Scopoli, 1763) – sötét gyökérfűrómoly – 5, 22, 23, 36, 52, 119, 142, 178, 189, 235, 274, 280, 294, 385, 396, 415, 416
- sedatana* (Busck, 1906) – olivzöld gyökérfűrómoly – 261, 415
- aeratana* (Pierce & Metcalfe, 1915) – angol gyökérfűrómoly – 5, 13, 51, 53, 77, 78, 134, 142, 167, 184, 294, 310, 385, 386, 396, 415, 416
- consortana* Stephens, 1852)*⁸⁹ – hegyesszárnú gyökérfűrómoly – 5, 36, 189, 235, 415
- cinerascens* (Danilevsky, 1948) – szürkés gyökérfűrómoly – 152, 167, 301, 415, 416
- acuminatana* (Lienig & Zeller, 1846) – réti gyökérfűrómoly – 5, 31, 45, 51, 52, 53, 119, 126, 167, 178, 184, 210, 263, 274, 294, 296, 301, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- simpliciana* (Haworth, [1811]) – feketeüröm-gyökérfűrómoly – 5, 31, 36, 45, 51, 99, 119, 134, 135, 142, 152, 167, 183, 184, 189, 194, 210, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396, 415, 416
- sequana* (Hübner, [1799]) – fehérfoltos gyökérfűrómoly – 5, 51, 122, 142, 167, 294, 385, 386, 396, 415, 416
- heegerana* (Duponchel, 1843) – barna gyökérfűrómoly – 5, 36, 51, 152, 167, 184, 189, 210, 235, 280, 294, 301, 307, 310, 321, 333, 385, 396, 415, 416
- senectana* Guenée, 1845 – szürke gyökérfűrómoly – 119, 126, 184, 415, 416
- baixerasana* Trematerra, 1991 – gerecsei gyökérfűrómoly – 319, 415, 416

- vancouverana* Mc. Dunnough, 1935 – aranysegélyű gyökérfürómoly – 294, 301, 307, 363, 385, 415, 416
 = *gueneana* Obraztsov, 1953 – 5, 45, 70, 77, 78, 99, 119, 134, 152, 178, 184, 189, 232, 280, 297, 310, 321, 386, 396
 = *politana* sensu auct. – 13
- flavidorsana* Knaggs, 1867 – sárgaszegélyű gyökérfürómoly – 5, 13, 301, 307, 396, 415, 416
- alpinana* (Treitschke, 1830)*⁹⁰ – cickafark-gyökérfürómoly – 5, 415
- petiverella* (Linnaeus, 1758) – közönséges gyökérfürómoly – 5, 13, 15, 36, 45, 51, 52, 53, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 232, 235, 260, 274, 294, 310, 321, 385, 386, 396, 415, 416
- plumbagana* (Treitschke, 1830) – ólomcsíkos gyökérfürómoly – 238, 294, 385, 415
- obscuratana* (Wolff, 1955) – homályos gyökérfürómoly – 5, 174, 184, 294, 385, 415
- agilana* (Tengström, 1848) – fűrge gyökérfürómoly – 5, 15, 119, 415

Gelechioidea

Autostichidae – Avarmolyfélék

Holcopogoninae

Holcopogon Staudinger, 1879

- adseclella* (Eversmann, 1844)*⁹¹ – ürülekemoly
 = *ssp. bubulcellus* (Staudinger, 1859) – 1, 5
 = *helveolellus* Staudinger, 1879 – 77

Autostichinae

Deroxena Rebel, 1889

- venosulella* (Möschler, 1862) – csontsárga sztyeppmoly – 3, 152, 184, 396

Oegoconinae

Oegoconia Stainton, 1854

- novimundi* (Busck, 1915) – úvilági avarmoly – 261, 301
- caradjai* Popescu-Gorj & Căpușe, 1965 – fátýolos avarmoly – 174, 175, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396
- deauratella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – nagy avarmoly – 26, 51, 52, 77, 134, 135, 142, 167, 178, 183, 184, 232, 274, 294, 297, [301], 310, 385, 386, 387, 396
 = *kindermanniella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – 5
- uralskella* Popescu-Gorj & Căpușe, 1965 – közönséges avarmoly – 197, 235, 260, 280, 296, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
 = *quadripuncta* auct., nec Haworth, 1828 – 3, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 53, 59, 77, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 221, 232
- Apatema** Walsingham, 1900
- apolausticum* Gozmány, 1996 – rejtőző avarmoly – 261, 294, 385
- mediopallidum* Walsingham, 1900 – fehérsávós avarmoly – 5, 31, 36, 51, 59, 78, 99, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 221, 232, 235, 260, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 396
 = *fasciata* auct. – 3, 7, 22,
- whalleyi* (Popescu-Gorj & Căpușe, 1965) – erdélyi avarmoly – 77, 174, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

Symmocinae

Symmoca Hübner, 1816

- signatella* Herrich-Schäffer, [1854] – délvidéki avarmoly – 332, 434

Pantacordis Gozmány, 1954

pales Gozmány, 1954 – sárga avarmoly (pannimoly) – 3, 36, 189, 220, 235, 280, 396

Donaspastus Gozmány, 1952

pannonicus Gozmány, 1952 – magyar avarmoly – 3,51,52,99,174,178, 184, 280, 294, 321, 385, 396

Lecithoceridae – Hindumolyfélék

Lecithocerinae

Homaloxestis Meyrick, 1910

briantiella (Turati, 1879) – nagy hindumoly – 3, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 134, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Lecithocera Herrich-Schäffer, 1853

nigrana (Duponchel, 1836) – kis hindumoly – 3, 36, 51, 53, 77, 99, 167, 177, 184, 189, 197, 235, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 396

= *luticornella* (Zeller, 1839) – 3

Oecophoridae – Díszmolyfélék

Deuteroninae

Deuteronia Rebel, 1901

pudorina (Wocke, 1857) – rózsavörös díszmoly – 26, 36, 70, 178, 189, 235, 396

Oecophorinae

Promalactis Meyrick, 1908 (= *Bisigna* Toll, 1956)

procerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – zuzmórágó díszmoly – 3, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 142, 167, 178, 184, 194, 197, 274, 280, 297, 301, 386, 387, 396

Fabiola Busck, 1908

pokornyí (Nickerl, 1864) – ezüstcsíkos díszmoly – 3,51,78,134,167,197,260,294, 321, 385, 386, 396

Schiffermuelleria Hübner, 1825

schaefferella (Linnaeus, 1758) – ólomcsíkos díszmoly – 3, 15, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 78, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 363, 385, 386, 396

grandis (Desvignes, 1842)*⁹² – ékfoltos díszmoly – 69, 78

Denisia Hübner, 1825

stipella (Linnaeus, 1758) – sárgamintás díszmoly – 3, 42, 119, 142

similella (Hübner, [1796])*⁹³ – aranypettyes díszmoly – 3, 396

stroemella (Fabricius, [1779]) – kékpettyes díszmoly – 3, 15, 36, 45, 189, 235, 386

augustella (Hübner, [1796]) – zebarmoly – 3, 52, 178, 301, 363, 385, 387, 396

albimaculea (Haworth, 1828) – törmelékklakó díszmoly – 422

Decantha Busck, 1908

borkhausenii (Zeller, 1839) – aranyfoltos díszmoly – 3, 51, 77, 78, 142, 167, 184, 197, 226, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396

Metalampra Toll, 1956

cinnamomea (Zeller, 1839) – fahéjbarna díszmoly – 3, 13, 15, 43, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 232, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

Endrosis Hübner, 1825

sarcitrella (Linnaeus, 1758) – kamramoly – Szn – 77, 178, 189, 235, 333, 396

= *lacteella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 3, 13, 15, 23, 36, 51, 52

Hofmannophila Spuler, 1910

pseudospretella (Stainton, 1849) – házimoly – 3, 13, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 53, 119, 126, 167, 178, 184, 189, 197, 235, 274, 297, 386, 396

Borkhausenia Hübner, 1825

fuscescens (Haworth, 1828) – agyagbarna díszmoly – 3, 77, 274, 294, 333, 385, 387, 396, 421

minutella (Linnaeus, 1758) – ikerpettyes díszmoly – 3, 15, 31, 36, 51, 52, 53, 119, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 307, 310, 321, 385, 386, 396

Kasyniana Vives, 1986

diminutella (Rebel, 1932) – molyhostölgyes díszmoly – 3, 53, 59, 134, 177, 178, 184, 189, 226, 294, 310, 321, 385, 386, 387, 396

Crassa Bruand, 1850

tinctella (Hübner, [1796]) – okkersárga díszmoly – 3, 45, 51, 52, 126, 167, 178, 274, 280, 294, 310, 385, 386, 396

unitella (Hübner, [1796]) – aranybarna díszmoly – 3, 13, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 262, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Batia Stephens, 1834

lambdella (Donovan, 1793) – osztrák díszmoly – 15, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 70, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 307, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *magnatella* (Jäckh, 1942) – 3, 5

internella Jäckh, 1972 – apró díszmoly – 26, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 220, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 307, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *lambdella* [Don.] sensu Jäckh, 1942 – 3, 5, – erroneous.

Epicallima Dyar, 1903

bruandella (Ragonot, 1889) – francia díszmoly – 3, 62, 70, 177, 178, 189, 197, 263, 274, 294, 297, 301, 333, 385, 387, 396

formosella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kéreglakó díszmoly – 3, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

Dasycera Stephens, 1829

oliviella (Fabricius, 1794) – fekete díszmoly – 3, 31, 36, 51, 52, 62, 178, 184, 189, 232, 235, 260, 263, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 396

krueperella Staudinger, 1871 – sárgafejű díszmoly – 161, 174, 263, 294, 385, 396
= (*Ethmia*) *ethnica* Gozmány, 1956 – 8

Oecophora Latreille, 1796

bractella (Linnaeus, 1758) – kis díszmoly – 3, 31, 36, 45, 51, 52, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 262, 274, 280, 294, 297, 321, 385, 386, 396

Alabonia Hübner, 1825

staintoniella (Zeller, 1850) – hárfajegyű díszmoly – 3, 13, 15, 22, 36, 51, 52, 53, 59, 78, 99, 119, 134, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 274, 294, 297, 385, 386, 396

Harpella Schrank, 1802

forficella (Scopoli, 1763) – korhadékevő díszmoly – 3, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 70, 77, 78, 119, 125, 135, 142, 167, 177, 178, 189, 197, 235, 274, 280, 294, 297, 385, 386, 396

Oscophorinae – Pleurotini**Minetia** Leraut, 1991

crinitus (Fabricius, 1798) – fehér csíkosmoly – 99, 119, 142, 167, 189, 197, 235, 260, 262, 263, 280, 294, 310, 321, 385, 386, 396

= (*Topeutis*) *barbella* (Fabricius, 1794) – 3, 15, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 87, 134

adamczewskii (Toll, 1956) – lengyel csíkosmoly – 3, 184, 197, 225, 226, 396

labiosella (Hübner, [1810]) – sárgás csíkosmoly – 3, 15, 31, 142, 178

criella (Treitschke, 1835) – barna csíkosmoly – 3, 15, 22, 23, 31, 51, 52, 59, 78, 99, 119, 142, 167, 178, 189, 197, 235, 294, 301, 385, 396

***Pleurota* Hübner, 1825**

marginella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnasávcsíkosmoly – 167, 177, 178, 189, 197, 221, 232, 235, 260, 263, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 387, 396

= *rostrella* (Hübner, 1796) – 3, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 122, 126, 134, 183, 184

pyropella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tüzes csíkosmoly – 3, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 221, 232, 235, 260, 263, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

proteella Staudinger, 1880^{*94} – imolarágó csíkosmoly – 385

= *malatya* Back, 1973 – 126, 134, 231, 260, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 386, 387, 396

[*brevispinella* Zeller, 1847 – 3, 5, 13, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 53, 99, 119, 167, 178, 183, 184, 189, 197, 235 – incorrectly used name]

bicostella (Clerck, 1759) – csarabos csíkosmoly – 3, 142

aristella (Linnaeus, 1767) – ezüstsávcsíkosmoly – 3, 15, 36, 51, 53, 119, 134, 167, 177, 184, 189, 197, 221, 235, 260, 294, 310, 321, 385, 396

***Holoscolia* Zeller, 1839**

huebneri Koçak, 1980 – sarlósszárnú csíkosmoly – 167, 177, 178, 189, 197, 235, 262, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 396

= *forficella* Hübner, 1813 nec Thunberg, 1794 – 3, 15, 23, 36, 51, 52, 53, 78, 119, 134, 135, 184

***Aplota* Stephens, 1834**

nigricans (Zeller, 1852) – szerecsen-díszmoly – 320, 396

palpella (Haworth, 1828) – mohaszövő díszmoly – 422

Depressariidae – Laposmolyfélék^{*95}

***Semioscopis* Hübner, 1825**

steinkellneriana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – levélszövő laposmoly – 3, 13, 15, 22, 23, 27, 36, 45, 51, 52, 70, 77, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396

avellanella (Hübner, 1793) – mogyorószövő laposmoly – 3, 22, 23, 45, 51, 52, 78, 119, 142, 167, 178, 194, 197, 232, 243, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396

oculella (Thunberg & Wenner, 1794) – nyírszövő laposmoly – 142, 297, 396

= *anella* (Hübner, 1796) nec Denis & Schiffermüller, 1775 – 43

strigulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyárfaszövő laposmoly – 3, 22, 45, 51, 77, 78, 142, 167, 194, 197, 297, 301, 386, 396

***Luquetia* Leraut, 1991**

lobella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kökényszövő laposmoly – 3, 17, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396

***Exaeretia* Stainton, 1849**

preisseckeri (Rebel, 1937) – molyhostölgyes laposmoly – 3, 15, 31, 36, 51, 52, 53, 99, 119, 134, 167, 184, 189, 197, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 310, 321, 385, 396

culcitella (Herrich-Schäffer, [1854]) – feketetövű laposmoly – 3, 51, 134, 184, 294, 385, 396

***Agonopterix* Hübner, 1825**

ocellana (Fabricius, 1775) – szemes laposmoly – 3, 45, 51, 52, 78, 99, 126, 142, 167, 178, 184, 232, 243, 260, 297, 301, 333, 386, 387, 396

cadurciella (Chrétien, 1914) – francia laposmoly – 410

subtakamukui Lvovsky, 1998 – keleti laposmoly – 399

= *cluniana* Huemer & Lvovsky, 2000 – osztrák laposmoly – 320, 387

thapsiella (Zeller, 1847)^{*96} – mediterrán laposmoly – 3

- adpersella* (Kollar, 1832) – buvákfü-laposmoly (sárgarépa-laposmoly) – 3, [13], 15, 51, 52, 134, 197, 294, 310, 321, 333, 385, 396
- conterminella* (Zeller, 1839) – fűz-laposmoly – 260, 261, 294, 385, 396
- hypericella* (Hübner, [1817]) – orbáncfűrágó laposmoly – 281
- assimilella* (Treitschke, 1832) – seprőzanót-laposmoly – 3, 14, 15, 17, 22, 34, 35, 36, 45, 51, 53, 99, 142, 177, 178, 189, 232, 235, 280, 294, 310, 321, 333, 385, 386, 396
- nanatella* (Stainton, 1849) – bábakalács-laposmoly – 3, 35, 134, 177, 184, 189, 197, 235, 294, 301, 310, 385, 396
- putridella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kocsordfonó laposmoly – 197, 301
- atomella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pettyegetett laposmoly – 3, 51, 197, 294, 385, 396
- petasitis* (Standfuss, 1851)*⁹⁷ – acsalapu-laposmoly – 3
- ciliella* (Stainton, 1849) – nagy laposmoly – 3, 15, 22, 23, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 122, 126, 142, 178, 183, 184, 194, 197, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 385, 386, 396
- arenella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ördög szem-laposmoly – 3, 13, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 235, 243, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- propinquella* (Treitschke, 1835) – aszatrágó laposmoly (aszatmoly) – 3, 13, 15, 17, 31, 35, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 263, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396
- subpropinquella* (Stainton, 1849)*⁹⁸ – imolafűró laposmoly – 43
- ferocella* (Chrétien, 1910) – számarkenyér-laposmoly (aszatrágó laposmoly) – 377, 385, 386, 388, 396
- laterella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – búzavirág-laposmoly – 3, 17, 36, 45, 51, 52, 178, 189, 235, 387
- carduella* (Hübner, [1817]) – aszadfűró laposmoly – 3, 15, 35, 119
- curvipunctosa* (Haworth, [1811]) – hamvasvörös laposmoly – 99, 119, 126, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- = *zephyrella* (Hübner, 1813) – 3, 13, 15, 17, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 78
- yeatiana* (Fabricius, 1781) – köményszöví laposmoly – 3, 13, 15, 7, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 126, 126, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- alstromeriana* (Clerk, 1759)*⁹⁹ – bürök-laposmoly (bürökmoly) – 3, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 126, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- purpurea* (Haworth, [1811]) – bíborszínű laposmoly – 3, 13, 15, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 99, 119, 126, 135, 142, 167, 174, 178, 184, 189, 232, 235, 280, 296, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396
- heracliana* (Linnaeus, 1758) – közönséges laposmoly – 77, 99, 119, 122, 126, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- = *applanata* (Fabricius, 1777) – 3, 15, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78
- capreolella* (Zeller, 1839) – aggófűrágó laposmoly – 3, 78, 184, 386, 396
- rotundella* (Douglas, 1846) – porszürke laposmoly – 3, 35, 53, 167, 184, 197, 310, 333, 396
- angelicella* (Hübner, [1813])*¹⁰⁰ – angyalgyökér-laposmoly – 3, 77, 387
- astrantiae* (Heinemann, 1870) – völgycsillag-laposmoly – 3, 36, 51, 52, 142, 167, 178, 189, 235, 385, 396
- cnicella* (Treitschke, 1832) – ördög szekérfűró laposmoly – 3, 15, 51, 77, 119, 184, 221, 294, 301, 330, 385, 386, 387, 396
- senecionis* (Nickerl, 1864)*¹⁰¹ – aggófű-laposmoly – 45, 47, 386, 396
- parilella* (Treitschke, 1835) – nyúlköményfonó laposmoly – 3, 45, 51, 184, 294, 385, 386, 396
- selini* (Heinemann, 1870)*¹⁰² – nyúlkömény-laposmoly – 63, 119, 142, 184, 294, 301, 396
- oinochroa* (Turati, 1879) – kocsord-laposmoly – 22, 43, 52, 134, 167, 177, 178, 189, 232, 235, 297, 301, 310, 321, 385, 387, 396

- hippomarathri* (Nickerl, 1864) – gurgolya-laposmoly – 26, 51, 53, 134, 167, 174, 232, 260, 280, 294, 310, 321, 385, 396
- medelichensis* Buchner, 2015*¹⁰³ – mödliingi laposmoly – 339, 340
- furvella* (Treitschke, 1832) – ezerjófű-laposmoly – 3, 17, 22, 23, 31, 51, 52, 53, 99, 134, 135, 177, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 310, 321, 333, 385, 396
- pallorella* (Zeller, 1839) – sápadt laposmoly – 3, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 77, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 263, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
= *subpallorella* (Staudinger, 1870) – 3, 31
- nervosa* (Haworth, [1811]) – okkerszínű laposmoly – 31, 50, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 243, 294, 310, 321, 333, 385, 386, 396
= *costosa* (Haworth, 1811) – 3, 14, 15, 17, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 78
- doronicella* (Wocke, 1849)*¹⁰⁴ – zergevirág-laposmoly – 3
- kaekeritziana* (Linnaeus, 1767) – mézszínű laposmoly – 119, 126, 135, 142, 167, 178, 189, 197, 221, 235, 260, 280, 301, 321, 386, 387, 396
= *flavella* (Hübner, 1796) – 3, 17, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 70, 78
- bipunctosa* (Curtis, 1850) – sötétekes laposmoly – 340, 396
- liturosa* (Haworth, [1811]) – orbáncfű-laposmoly – 134, 135, 142, 167, 197, 232, 260, 280, 294, 297, 385, 386, 396
= *liturella* (Hübner, 1796) – 3, 22, 31, 51, 78
- cervariella* (Constant, 1884) – szarvaskocsord-laposmoly – 283
- Depressaria** Haworth, 1811
- radiella* (Goeze, 1783) – medvetalp-laposmoly – 294, 301, 385
= *heracliana* auct., nec Linnaeus, 1758 – 3, 14, 20, 23, 36, 51, 53, 78
= *heraclei* (Retzius, 1783) – 235, 243
= *pastinacella* Duponchel, 1838 – 126, 178, 184, 188, 189, 195, 197, 221, 260, 297, 321, 386, 396
- absynthiella* Herrich-Schäffer, 1865 – fehérüröm-laposmoly – 3, 52, 178, 296, 386, 396
- artemisiae* Nickerl, 1862 – mezeiüröm-laposmoly – 3, 301, 385, 396
- marcella* Rebel, 1901 – csillógó laposmoly – 3, 14, 15, 23, 31, 52, 53, 77, 119, 184, 280, 310, 321, 396
- depressana* (Fabricius, 1775) – fakó laposmoly – 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
= *depressella* (Fabricius, 1798) – 3, 13, 14, 15, 17, 20, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 78
- chaerophylli* Zeller, 1839 – baraboly-laposmoly – 3, 36, 45, 51, 52, 53, 78, 119, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 262, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 386, 396, 421
[*ululana* Rössler, 1866 – 317, 330 – misidentification; incorrectly used name]
- ultimella* Stainton, 1849 – csomorika-laposmoly – 3, 51, 52, 59, 77, 126, 178, 184, 294, 385, 387, 396
- pimpinellae* Zeller, 1839 – földitömjén-laposmoly – 3, 14, 15, 17, 20, 36, 51, 52, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396
- badiella* (Hübner, [1796]) – pasztinák-laposmoly – 3, 15, 22, 31, 51, 53, 62, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 167, 184, 197, 232, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396
- corticinella* Zeller, 1854 – levantei laposmoly – 3, 22, 23, 31, 45, 52, 119, 142, 167, 178, 197, 386
- daucella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – köménylakó laposmoly – 77, 99, 119, 184, 232, 294, 301, 385, 386, 396
= *nervosa* auct. – 3, 5, 13, 15, 22, 23, 28, 31, 35, 45, 51, 52, 53, 59
- sordidatella* Tengström, 1848 – turbolya-laposmoly – 388
- pulcherimella* Stainton, 1849 – vadrépa-laposmoly – 47, 274
- douglasella* Stainton, 1849 – sárgarépa-laposmoly (sárgarépamoly) – 3, 15, 36, 51, 77, 78, 119, 122, 142, 152, 167, 174, 177, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- emeritella* Stainton, 1849 – fehérfejű laposmoly – 3, 52, 142, 178, 297, 396
- albipunctella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérpettyes laposmoly – 3, 22, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 134, 135, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 263, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

olerella Zeller, 1854 – cickafark-laposmoly – 3, 42, 45, 51, 52, 53, 78, 134, 135, 142, 152, 167, 184, 197, 232, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396
cervicella Herrich-Schäffer, [1854]*¹⁰⁵ – vonalkás laposmoly – 3, 178, 184
dictamnella (Treitschke, 1835) – erősfű-laposmoly – 3, 193, 198, 396

Cryptolechiinae

Orophia Hübner, 1825 (= *Cephalispheira* Bruand, 1851)

denisella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérmintás díszmoly – 3,36,53,178,189,235,260,396
ferrugella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdamintás díszmoly – 3, 22, 31, 35, 51, 78, 134, 167, 178, 184, 197, 280, 294, 321, 385, 396
sordidella (Hübner, [1796]) – sárgamintás díszmoly – 5, 26, 167

Telechrysis Toll, 1956

tripuncta (Haworth, 1828) – hárompettyes díszmoly – 3,13,15,51,78,119,142,167,294,297, 385, 396

Hypercalliinae

Hypercallia Stephens, 1829

citrinalis (Scopoli, 1763) – pirossávós díszmoly – 3, 15, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 78, 119, 134, 142, 167, 184, 189, 197, 235, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396
 = *christiannana* Linnaeus, 1767 – 13

Anchinia Hübner, 1825

cristalis (Scopoli, 1763) – ibolyaszín boroszlánmoly – 47, 136, 142, 167, 232, 297, 386, 396
laureolella Herrich-Schäffer, [1854] – henyeboroszlánmoly – 46, 134, 136, 142, 294, 321, 385, 396
daphnella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy boroszlánmoly – 3, 15, 31, 52, 78, 136, 142, 197, 386

Ethmiinae

Ethmia Hübner, 1819

dodecea (Haworth, 1828) – tízpettyes feketemoly – 77, 119, 134, 167, 177, 178, 189, 197, 221, 232, 260, 263, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396
 = *decemguttella* Hübner, 1810 nec Fabricius, 1794 – 1, 45, 51, 52, 78
quadrillella (Goeze, 1783) – gyászos feketemoly – 167, 177, 178, 189, 194, 197, 221, 235, 243, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396
 = *funerella* (Fabricius, 1787) – 1, 13, 15, 22, 23, 31, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 184
fumidella (Wocke, 1850) – korai feketemoly – 26, 31, 36, 53, 134, 184, 197, 260, 263, 280, 294, 301, 385, 396
candidella (Alphéraky, 1908) – őszi feketemoly – 26, 36, 51, 77, 119, 126, 134, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396
pusiella (Linnaeus, 1758) – díszes feketemoly – 1, 13, 14, 15, 17, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 99, 119, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 235, 260, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 396
terminella T. Fletcher, 1938 – hatpettyes feketemoly – 1,13,15,31,36,42,51,52,77,99, 119, 126, 134, 167, 178, 184, 189, 197, 221, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
bipunctella (Fabricius, 1775) – kétpettyes feketemoly – 1, 13, 15, 17, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 126, 134, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
iranella Zerny, 1940*¹⁰⁶ – levantei feketemoly – 26, 77, 387, 396
haemorrhoidella (Eversmann, 1844) – hullámos feketemoly – 1, 51, 52, 177, 178, 189, 220, 232, 235, 263, 274, 280, 294, 297, 321, 333, 385, 396

Peleopodinae

Carcina Hübner, 1825

quercana (Fabricius, 1775)*¹⁰⁷ – vastagsápú díszmoly – 3, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Oditinae

Odites Walsingham, 1891

kollarella (O. Costa, 1832)*¹⁰⁸ – árvmoly – 3, 36, 134, 177, 184, 189, 232, 235, 260, 263, 294, 310, 321, 333, 385, 387, 396

= *luteella* (Duponchel, 1840) (*lutrella* – erroneous) – 3, 51

Cosmopterigidae – Tündérmolyfélék

Chrysopeliinae

Sorhagenia Spuler, 1910

rhamniella (Zeller, 1839) – bengefűró tündérmoly – 3, 126, 167, 174, 184, 294, 301, 321, 385

janiszewskae Riedl, 1962 – lengyel tündérmoly – 26, 77, 134, 184, 294, 385, 396

lophyrella (Douglas, 1846) – közép-európai tündérmoly – 26, 184, 232, 260, 274, 280, 297, 301, 310, 321, 396

Ascalenia Wocke, 1876

vanella (Frey, 1860)*¹⁰⁹ – füstösszárnnyú tündérmoly – 3, 184

Cosmopteriginae

Cosmopterix Hübner, 1825

zieglerella (Hübner, [1810]) – komlóaknázó tündérmoly – 20, 26, 178, 321, 396

= *eximia* (Haworth, 1828) – 35, 49, 64

orichalcea Stainton, 1861 – csenkeszknázó tündérmoly – 99, 126, 142, 167, 178, 184, 274, 294, 297, 301, 385, 386, 387, 396

= *druryella* (Zeller, 1850) nom. praecoc. – 3, 35, 51, 52, 70

scribaiella Zeller, 1850 – levantei tündérmoly – 3, 35, 51, 77, 126, 142, 167, 178, 184, 260, 274, 297, 301, 321, 333, 387, 396

lienigiella (Lienig & Zeller, 1846) – nádaknázó tündérmoly – 34, 35, 47, 184, 274, 280, 301, 387, 396

feminella Sinev, 1988 – újjasmuhar-tündérmoly – Am – 443

Pyroderces Herrich-Schäffer, 1853

argyrogrammos (Zeller, 1847) – ezüstmintás tündérmoly – 3, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

sarcogypsa (Meyrick, 1932) – mocsári tündérmoly – 400

= *klimeschi* Rebel, 1938 – 3, 7, 52, 77, 88, 126, 178, 184, 220, 260, 300, 301, 321, 387, 396

Stagmatophora Herrich-Schäffer, 1853

heydeniella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – tisztessű-tündérmoly – 3, 13, 15, 35, 119, 396

Eteobalea Hodges, 1962

anonymella (Riedl, 1965) – névtelen tündérmoly – 174, 240, 260, 263, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

intermediella (Riedl, 1966) – tarka tündérmoly – 119, 184, 240, 294, 385, 396

serratella (Treitschke, 1833) – gyűjtőványfű-tündérmoly – 3, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 183, 184, 235, 240, 263, 274, 294, 297, 301, 330, 333, 385, 387

= *gronoviella* auct. – 142, 167, 177, 189, 197, 221, 280, 310, 321, 386, 396

tririvella (Staudinger, 1871) – homoki tündérmoly – 3, 15, 22, 31, 51, 77, 78, 119, 134, 167, 220, 221, 240, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396, 421

albiapicella (Duponchel, 1843) – gubóvirág-tündérmoly – 3, 23, 134, 240, 280, 294, 310, 385, 396

***Isidiella* Riedl, 1965**

nickerlii (Nickerl, 1864)*¹¹⁰ – cickafark-tündérmoly – 3

***Vulcaniella* Riedl, 1965**

pomposella (Zeller, 1839) – szalmagyopár-tündérmoly – 3, 35, 294, 385

extremella (Wocke, 1871) – zsálya-tündérmoly – 3, 14, 20, 35, 49, 184, 294, 385, 396

Antequerinae***Pancalia* Stephens, 1829**

leuwenhoekella (Linnaeus, 1761) – feketecsápú ibolyamoly – 1, 35, 51, 52, 53, 78, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 178, 184, 220, 280, 297, 310, 321, 333, 385, 396

schwarzella (Fabricius, 1798) – gyűrűscsápú ibolyamoly – 174, 297, 385, 386, 396
= *latreillella* Curtis, 1830 – 1, 4, 184

***Linnaecia* Stainton, 1851**

phragmitella Stainton, 1851 – nádromoly – 3, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 221, 235, 260, 263, 274, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

Gelechiidae – Sarlósajkú-molylepkefélék*¹¹¹**Anacamptinae - Anacamptini*****Stomopteryx* Heinemann, 1870**

detersella (Zeller, 1847) – karszterdei övesmoly – 3, 35, 134, 184, 294, 310, 321, 385

remissella (Zeller, 1847) – ibolyafényű övesmoly – 3, 184, 297, 321, 387, 396

hungaricella Gozmány, 1957 – pannon övesmoly – 3, 9, 52, 134, 142, 184, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396

***Aproaerema* Durrant, 1897*¹¹² (= *Syncopacma* Meyrick, 1925, = *Lixodessa* Gozmány, 1957)**

patruella (Mann, 1857) – sárgapettyes övesmoly – 3, 22, 23, 51, 167, 182, 184, 220, 294, 301, 310, 385, 396

coronillella (Treitschke, 1833) – koronafürt-övesmoly – 3, 17, 22, 51, 52, 53, 77, 78, 167, 174, 178, 184, 220, 262, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 396

sangiella (Stainton, 1863) – kereprágó övesmoly – 3, 126, 167, 174, 183, 184, 294, 301, 310, 385, 396

cinctella (Clerck, 1759) – ferdesávú övesmoly – 77, 99, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

= *vorticella* (Scopoli, 1763) – 3, 36, 45, 51, 52

wormiella (Wolff, 1958)*¹¹³ – kerep-övesmoly – 77, 188, 238, 280, 310, 321, 333

azosterella (Herrich-Schäffer, [1854])*¹¹⁴ – csüdfü-övesmoly – 3, 294, 312, 385, 396

ochrofasciella (Toll, 1936) – sárgacsíkos övesmoly – 3, 178, 184, 274, 280, 310, 396

taeniolella (Zeller, 1839) – fonáksávú övesmoly – 3, 13, 15, 22, 35, 36, 51, 52, 78, 119, 167, 178, 184, 189, 197, 235, 294, 321, 385, 396

albifrontella (Heinemann, 1870) – fehérfejű övesmoly – [5], 52, 178, 280, 310, 396

cincticulella (Bruand, 1850) – rekettye-övesmoly – 3, 13, 15, 35, 119, 184, 262, 294, 385, 396

vinella Banks, 1898 – angol övesmoly – 5, 52, 178, 280, 294, 301, 385

= (*Iwaruna*) *biguttella* H-S. auct. – 3, 5

linella (Chrétien, 1904)*¹¹⁵ – magyar övesmoly

= *schoenmanni* Gozmány, 1957 – 3, 9, 184

suecicella (Wolff, 1958) – selymesrekettye-övesmoly – 238, 396

captivella (Herrich-Schäffer, [1854])*¹¹⁶ – seprőzanót-övesmoly – 3, 178

= *sarothamnella* (Zeller, 1868) – 3

anthyllidella (Hübner, 1813) – nyúlhere-övesmoly – 3, 14, 20, 31, 35, 36, 49, 51, 52, 77, 99, 119, 126, 142, 167, 174, 177, 178, 184, 189, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Iwaruna* Gozmány, 1957**

klimeschi Wolff, 1958*¹¹⁷ – osztrák sarlósmoly – 174, 294, 310, 385, 396

***Anacampsis* Curtis, 1827**

populella (Clerck, 1759) – nyárlevél-sarlósmoly – 3, 13, 15, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 135, 142, 152, 167, 178, 184, 194, 197, 260, 263, 274, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

blattariella (Hübner, [1796]) – nyírsodró sarlósmoly – 51, 59, 142, 152, 178, 220, 274, 301, 386, 396
= *betulinella* Vári, 1941 – 3

timidella (Wocke, 1887) – tölgysodró sarlósmoly – 174, 178, 197, 232, 260, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 396

= *quercella* (Chrétien, 1907) – 167, 184

= *disquei* (Meess, 1907) – 3, 52

scintillella (Fischer v. Röslerstamm, 1841) – napvirág-sarlósmoly – 3, 22, 23, 51, 53, 87, 135, 167, 174, 280, 294, 310, 321, 385, 396

obscurella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – feketesávós sarlósmoly – 167, 294, 333, 385, 396
= *subsequella* Hübner, 1796) – 3, 134

***Mesophleps* Hübner, 1825 (= *Crossobela* Meyrick, 1923; *Uncustriodonta* Agenjo, 1952)**

silacella (Hübner, 1796) – tetemtoldó-sarlósmoly – 3, 22, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 221, 232, 235, 294, 310, 321, 385, 396

trinetella Herrich-Schäffer, 1856*¹¹⁸ – sárgaviolamoly – 3, 51, 53, 59, 77, 99, 126, 134, 135, 177, 178, 183, 184, 189, 232, 260, 274, 280, 294, 301, 321, 385, 387, 396

Anacampsinae - Chelariini

***Nothris* Hübner, 1825**

lemniscellus (Zeller, 1839) – fehérvállú sarlósmoly – 3, 13, 35, 51, 52, 77, 125, 142, 167, 197, 294, 310, 321, 385, 387, 396

verbascella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – okkersárga sarlósmoly – 3, 15, 17, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 125, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Neofaculta* Gozmány, 1955**

ericetella (Geyer, 1832) – hangaszövő sarlósmoly – 3, 142, 333, 386, 396

= *betulae* auct., nec Haworth, 1828 – 5, 45, 62, 99

infernella (Herrich-Schäffer, 1854)*¹¹⁹ – áfonyaszövő sarlósmoly – 396
= *infernalis* auct. – 5, 26

***Hypatima* Hübner, 1825**

rhomboidella (Linnaeus, 1758) – levélhajtó sarlósmoly – 26, 31, 45, 51, 142, 167, 197, 294, 385, 386, 396

***Anarsia* Zeller, 1839**

lineatella Zeller, 1839 – barackrágó sarlósmoly – 3, 13, 14, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 70, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 307, 310, 321, 330, 333, 373, 385, 386, 396

innoxella Gregersen & Karsholt, 2017 – csíkos sarlósmoly – 369, 373, 385, 388, 396, 421

spartiella (Schrank, 1802) – zánót-sarlósmoly (seprőzánótmoly) – 3, 13, 15, 23, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 235, 260, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396

eleagnella Kuznetsov, 1957 – olajfűz-sarlósmoly (olajfűzmoly) – 261, 333, 396

Dichomeridinae

***Dichomeris* Hübner, 1818 (= *Uliaria* Dumont, 1921)**

- marginella* (Fabricius, 1781) – boróka-sarlósmoly (fehérsávós borókamoly) – 3, 14, 51, 59, 77, 99, 167, 178, 184, 321, 387, 396
- ustalella* (Fabricius, 1794) – barnásvörös sarlósmoly – 99, 142, 167, 177, 178, 189, 197, 232, 235, 260, 274, 297, 386, 396
= *ustulella* auct. – 3, 36, 45, 52, 119,
- derasella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdás sarlósmoly – 142, 167, 177, 178, 189, 197, 232, 235, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 333, 385, 386, 396
= *fasciella* (Hübner, 1796) – 3, 13, 15, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 184
- limosellus* (Schläger, 1849) – lucernarágó sarlósmoly – 3, 13, 15, 17, 22, 23, 28, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
- rasilella* (Herrich-Schäffer, 1854) – szibériai sarlósmoly – 3, 13, 15, 23, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 126, 134, 167, 177, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
- barbella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szakállas sarlósmoly – 3, 22, 23, 36, 51, 52, 134, 177, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 321, 385, 386, 396
- alacella* (Zeller, 1839) – zuzmórágó sarlósmoly – 3, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- latipennella* (Rebel, 1937) – őrségi sarlósmoly – 185, 215, 231
- acuminatus* (Staudinger, 1876) – szarvaskerep-sarlósmoly – 447
- Anaspaltis** Meyrick, 1925
- renigerellus* (Zeller, 1839) – citromfű-sarlósmoly – 3, 31, 51, 52, 119, 134, 167, 178, 294, 385, 396
- Acompsia** Hübner, 1825
- cinerella* (Clerck, 1759) – szürke sarlósmoly – 3, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 260, 262, 280, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- tripunctella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – oroszlánszáj-sarlósmoly – 3, 23, 142, 167, 177, 189, 280, 297, 386, 396
- schmidtellus* (Heyden, 1848) – aranysárga sarlósmoly – 283
- Brachmia** Hübner, 1825
- dimidiella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – citromkocsord-lápmoly – 3, 15, 23, 31, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 232, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- blandella* (Fabricius, 1798) – fészeklakó lápmoly – 77, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 333, 385, 386, 387, 396
= *gerronella* (Zeller, 1850) – 3, 15, 45, 51, 52, 53, 59, 99
- procursella* Rebel, 1903 – hegyvidéki lápmoly – 3, 15, 119
- inornatella* (Douglas, 1850) – nádrágó lápmoly – 3, 31, 36, 51, 52, 77, 126, 177, 178, 183, 184, 189, 232, 235, 260, 280, 297, 301, 333, 387, 396
- Helcystogramma** Zeller, 1877
- lineolella* (Zeller, 1839) – barnacsíkos lápmoly – 3, 23, 51, 52, 59, 77, 99, 142, 152, 167, 178, 232, 260, 294, 297, 301, 385, 386, 387, 396
- triannulella* (Herrich-Schäffer, 1854) – szuláksodró lápmoly – 3, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- lutatella* (Herrich-Schäffer, 1854) – nádtippan-lápmoly – 3, 31, 34, 51, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396
- rufescens* (Haworth, 1828) – fűsodró lápmoly – 3, 45, 51, 53, 59, 77, 119, 126, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 243, 274, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396

albinervis (Gerasimov, 1929) – fehérerű lápimoly – 3, 45, 51, 126, 142, 167, 178, 183, 184, 194, 197, 232, 260, 280, 297, 301, 321, 333, 386, 387, 396
arulensis (Rebel, 1929) – ritka lápimoly – 175, 178, 189, 197, 243, 260, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

Apatetrinae – Pexicopiini

Pexicopia Common, 1958

malvella (Hübner, 1805) – mályvalevél-sarlósmoly – 3, 13, 15, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 126, 125, 135, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 221, 232, 260, 296, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 387, 396
 = *umbrella* auct., nec [Denis & Schiffermüller], 1775 – 142

Platyedra Meyrick, 1895

subcinerea (Haworth, 1828) – sárgásszürke sarlósmoly – 77, 122, 126, 142, 167, 178, 189, 197, 232, 235, 260, 301, 321, 333, 386, 396
 = *vilella* (Zeller, 1847) – 3, 14, 22, 31, 36, 42, 45, 51, 52, 53, 59

Sitotroga Heinemann, 1870

cerealella (Olivier, 1789) – mezei gabonamoly – 3, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 70, 78, 99, 119, 126, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Apatetrinae – Apatetrini

Dactylotula Cockerell, 1888 (= *Apatetris* Staudinger, 1879)

altithermella (Walsingham, 1903) – fűragó sarlósmoly – 207, 231, 310

Catatinagma Rebel, 1903 (= *Apatetris* Staudinger, 1879)

trivittellum Rebel, 1903 – törpe sarlósmoly – 3, 7, 77, 162, 396

Lanceoptera Janse, 1960

panochroa Janse, 1960 – afrikai sarlósmoly – Csákberény, leg. Z. Tokár in litt.

Chrysoesthia Hübner, 1825

drurella (Fabricius, 1775) – labodarágó sarlósmoly – 77, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
 = *hermannella* auct. – 3, 13, 15, 34, 35, 36, 49, 51, 52, 70, 78
sexguttella (Thunberg, 1794) – aranyfoltos sarlósmoly – 3, 14, 20, 31, 35, 36, 39, 49, 51, 52, 53, 70, 78, 119, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 232, 235, 260, 274, 297, 310, 321, 333, 386, 396

Thiotrichinae

Thiotricha Meyrick, 1886

subocellea (Stephens, 1834) – szurokfű-sarlósmoly – 3, 51, 134, 167, 184, 294, 297, 385, 386, 396

Anomologinae

Bryotropha Heinemann, 1870

domestica (Haworth, 1828) – pettyes mohamoly – 3, 53, 77, 134, 142, 167, 184, 280, 294, 297, 385, 396
patockai Elsner & Karsholt, 2003*¹²⁰ – aggteleki mohamoly – 175, 199, 231
tachyptilella (Rebel, 1916)*¹²¹ – apró mohamoly – [3], 188, 195, 301, 387
terrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rézbarna mohamoly – 3, 22, 31, 36, 51, 77, 126, 167, 184, 189, 197, 235, 274, 296, 301, 385, 386, 387, 396
desertella (Douglas, 1850) – homoki mohamoly – 3, 77, 174, 184, 294, 333, 385, 386, 396
galbanella (Zeller, 1839)*¹²² – északi mohamoly – 195, 224
basaltinella (Zeller, 1839)*¹²³ – kövi mohamoly – 184, 195, 274
affinis (Haworth, 1828) – barnásfekete mohamoly – 3, 13, 15, 51, 52, 77, 178, 184, 235, 301, 307, 396
similis (Stainton, 1854)*¹²⁴ – közönséges mohamoly – 195, 396

- senectella* (Zeller, 1839) – barnásszürke mohamoly – 3, 13, 15, 152, 184, 274, 280, 294, 301, 310, 385, 396
- Aristotelia** Hübner, 1825
- decurtella* (Hübner, 1813) – seprősajkú sarlósmoly – 3, 36, 51, 52, 53, 99, 134, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 221, 235, 274, 280, 294, 310, 321, 333, 385, 396
- decoratella* (Staudinger, 1879) – díszes sarlósmoly – 219, 220, 231, 280, 294, 310, 321, 385, 396
[? = „leonhardi” (Krone, 1907) – 3, 162, 219]
- ericinella* (Zeller, 1839) – csarabos sarlósmoly – 3, 51, 99, 142, 396
- subdecurtella* (Stainton, 1859) – füzényhajtás-sarlósmoly – 133, 197, 260, 274, 280, 301, 310, 321, 386, 387, 396
- subericinella* (Duponchel, 1843) – sárgacsíkos sarlósmoly – 3, 31, 51, 52, 77, 126, 134, 167, 178, 183, 184, 197, 294, 301, 321, 385, 387, 396
- calastomella* (Christoph, 1873) – szikespusztai sarlósmoly (bélmegyeri sarlósmoly) – 161, 439, 440
- Ptycerata** Ely, 1910 (= *Caulastrocecis* Chrétien, 1931)
- pudivellus* (Mann, 1861) – hegyi sarlósmoly – 23, 309, 396
- cryptoxena* (Gozmány, 1952)*¹²⁵ – budai sarlósmoly – 3, 22, 407
[*furfurella* (Staudinger, 1871) – 5, 52, 134, 178, 280, 294, 310, 321, 385, 407 – incorrectly used name]
- Megacraspedus** Zeller, 1839)*¹²⁶ (= *Chilopselaphus* Mann, 1867)
- dolosellus* (Zeller, 1839) – fűvönélő kopármoly – 3, 31, 167, 178, 184, 220, 232, 274, 280, 301, 310, 321, 333, 370, 385, 396
= *separatellus* (Fischer von Röslerstamm, 1843) – 3, 260, 294, 310, 321, 392, 396
- binotella* (Duponchel, 1843) – kétpettyes kopármoly – 3, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 396
- podolicus* (Toll, 1942)*¹²⁷ – dunántúli kopármoly – 232, 263, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 396
= *balneariellus* ssp. *podolicus* – 76, 84, 183, 184, 392
- imparellus* (Fischer von Röslerstamm, 1843) – balkáni kopármoly – 3, 31, 134, 197, 260, 294, 301, 310, 321, 370, 385, 396
- lagopellus* (Herrich-Schäffer, 1860)*¹²⁸ – szürke kopármoly – 188, 195
- Dirrhinosia** Rebel, 1905
- cervinella* (Eversmann, 1844)*¹²⁹ – sárhegyi sarlósmoly – 185, 197, 198, 217
- Psamathocrita** Meyrick, 1925
- argentella* Pierce & Metcalfe, 1942)*¹³⁰ – csontfehér sarlósmoly – (162 mint „sp.”), – in print.
[*dalmatinella* Huemer & Tokár 2000 – 173, 195 – incorrectly used name]
[*osseella* (Stainton, 1861) – 161, 188 – incorrectly used name]
- Ptocheuusa** Heinemann, 1870
- paupella* (Zeller, 1847) – bolhafű-sarlósmoly – 3, 31, 51, 178, 184, 387, 396
- inopella* (Zeller, 1839) – gyopárvirág-sarlósmoly – 3, 77, 178, 396
- abnormella* (Herrich-Schäffer, 1854) – peremizsvirág-sarlósmoly – 3, 52, 134, 167, 184, 197, 260, 280, 294, 310, 321, 385, 386, 396
- Gladiovalva** Sattler, 1960
- aizpuruai* Vives, 1990)*¹³¹ – sóska-sarlósmoly – 162, 231, 333
- Ornativulva** Gozmány, 1955
- phutelliformis* (Staudinger, 1859) – tamariskarágó sarlósmoly – 3, 77, 183, 301
- Atremaea** Staudinger, 1871
- lonchoptera* Staudinger, 1871 – magyar nádsmoly – 3, 36, 42, 51, 52, 59, 77, 122, 126, 134, 167, 178, 183, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 263, 294, 301, 321, 385, 387, 396
- Isophrictis** Meyrick, 1917
- striatella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – varádcslakó sarlósmoly – 3, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 57, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
- anthemidella* (Wocke, 1871)*¹³² – margitvirág-sarlósmoly – 13, 15, 57, 197

***Pyncostola* Meyrick, 1917**

bohemiella (Nickerl, 1864) – cseh sarlósmoly – 3, 57, 280

***Metzneria* Zeller, 1839**

paucipunctella (Zeller, 1839)*¹³³ – pipitér-sarlósmoly (pipitérmoly) – 3, 22, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 126, 125, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 396

neuropterella (Zeller, 1839) – barnarácsos sarlósmoly – 3, 23, 36, 51, 77, 78, 99, 117, 134, 152, 167, 183, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 262, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 396

aestivella (Zeller, 1839) – bábakalács-sarlósmoly – 77, 177, 184, 189, 280, 321, 330, 333, 387, 396
= *carlinella* (Stainton, 1851) – 3, 23, 35, 52

lappella (Linnaeus, 1758) – bojtorjánmag-sarlósmoly – 3, 23, 35, 51, 52, 53, 77, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396

ehikeella Gozmány, 1954 – homokháti sarlósmoly – 3, 77, 184, 260, 396

metzneriella (Stainton, 1851) – imolamag-sarlósmoly – 3, 13, 15, 22, 23, 35, 36, 45, 51, 59, 77, 78, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 221, 235, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

artificella (Herrich-Schäffer, 1861)*¹³⁴ – piroscsíkos sarlósmoly
= *litigiosella* (Millière, 1879) – 77
= *pannonicella* Rebel, 1915 – 3

aprilella (Herrich-Schäffer, 1854) – tűzesszárnyú sarlósmoly – 3, 23, 31, 52, 77, 119, 126, 167, 184, 197, 232, 260, 280, 301, 310, 321, 333, 386, 396
= *igneella* (Tengström, 1859) – 3, 5

subflavella Englert, 1974*¹³⁵ – sárgás sarlósmoly – 27, 77, 184, INT²

intestinella (Mann, 1864) – délvidéki sarlósmoly – 161, 174, 177, 189, 294, 310, 385, 396

santolinella (Amsel, 1936) – eurázsiai sarlósmoly – 126, 260, 294, 301, 385, 396
= *consimilella* Hackman, 1946 – 3

***Apodia* Heinemann, 1870**

bifractella (Duponchel, 1843) – peremizsmag-sarlósmoly – 3, 51, 52, 53, 78, 119, 134, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

***Pragmatodes* Walsingham, 1908**

parvulata (Gozmány, 1953)*¹³⁶ – karsztlakó sarlósmoly – 3, 9

***Argolamprotes* Benander, 1945**

micella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstpettyes sarlósmoly – 3, 45, 52, 78, 142, 152, 167, 197, 280, 297, 386, 396

***Monochroa* Heinemann, 1870**

rumicetella (Hofmann, 1868) – juhsóska-lápimoly – 3, 35

sepicolella (Herrich-Schäffer, [1854]) – karszterdei sarlósmoly – 167, 178, 294, 297, 321, 333, 385, 396
= *balcanica* (Rebel, 1903) – 3, 5, 15
= *agasta* Gozmány, 1954 – 3, 5

rectifasciella (Fuchs, 1902) – sziklagyepi sarlósmoly – 340

tenebrella (Hübner, 1817) – sóskafüró lápimoly – 3, 220, 274, 280

servella (Zeller, 1839) – fehérképmű lápimoly – 3, 5, 178, 294, 385, 396
= *farinosae* (Stainton, 1867) – 3, 5

conspersella (Herrich-Schäffer, 1854) – fehérgyűrűs lápimoly – 3, 52, 152, 178, 183, 333, 386
= *questionella* (Herrich-Schäffer, 1854) – 3, 5
= *morosa* (Mühlig, 1864) – 3, 5, 35

inflexella Svensson, 1992 – fekete lápimoly – 277, 283

elongella (Heinemann, 1870) – keskenyszárnyú lápimoly – 3, 15, 22, 23, 77, 119, 178, 183, 184, 197, 330, 386, 396

tekovella Kosorín, 2020 – nyírségi lápimoly – 162, 406
= sp. 3; in Elsner et al 1999, fig 74 – female (162)

- lutulentella* (Zeller, 1839) – okkerbarna lápmoly – 3, 31, 51, 77, 142, 152, 167, 220, 294, 297, 310, 385, 387, 396
 = *brunickii* (Rebel, 1913) – 3, 5
- palustrellus* (Douglas, 1850) – turjáni lápmoly – 51, 52, 77, 126, 178, 184, 197, 274, 301, 396
 = *rozsikella* (Rebel, 1909) – 3, 22
- divisella* (Douglas, 1850) – magyar lápmoly – 178, 260, 300, 301, 307, 321, 387, 396
 = *csornensis* (Rebel, 1909) – 3, 68,
 = *lepidolampra* (Gozmány, 1952) – 3, 70
- lucidella* (Stephens, 1834) – sárgafoltos lápmoly – 3, 36, 51, 52, 77, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 235, 274, 294, 321, 385, 396
- simplicella* (Lienig & Zeller, 1846)*¹³⁷ – homokszínű lápmoly – 188, 195, 396
- moyses* Uffen, 1991 – halványszegélyű lápmoly – 340
- arundinetella* (Boyd, 1857) – sásaknázó lápmoly – 3, 35, 274, 301
- suffusella* (Douglas, 1850) – gyapjúsás-lápmoly – 309, 387
- cytisella* (Curtis, 1837) – saspáfrány-sarlósmoly – 3, 22, 35, 142, 386, 396
- nomadella* (Zeller, 1868) – ólomszürke lápmoly – 3, 174, 294, 310, 385
- hornigi* (Staudinger, 1883) – keserűfű-lápmoly – 3, 77, 167, 178, 274, 294, 301, 310, 321, 385, 387
- niphognatha* (Gozmány, 1953)*¹³⁸ – bátorligeti lápmoly – 3
- sp. 1 *¹³⁹ – 162, 294, 385 (Csákberény), – 260 (Pécsely)
- Oxypteryx*** Rebel, 1911 (= *Eulamprotes* Bradley, 1971)
- wilkella* (Linnaeus, 1758) – ezüstsávós sarlósmoly – 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 220, 221, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396
 = *pictella* (Zeller, 1839) – 3, 15, 31, 51, 52, 59
- ochricapilla* (Rebel, 1903) – esztramosi sarlósmoly – 357, 421
- superbella* (Zeller, 1839) – ezüstpontos sarlósmoly – 3, 134, 220, 294, 301, 385
- unicolorella* (Duponchel, 1843) – zöldesszürke sarlósmoly – 3, 15, 22, 31, 36, 51, 52, 78, 142, 167, 178, 182, 184, 189, 197, 235, 280, 294, 301, 385, 386, 396
- atrella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – orbáncfű-sarlósmoly – 3, 15, 23, 45, 52, 53, 70, 78, 119, 167, 174, 178, 184, 197, 260, 274, 280, 294, 297, 321, 385, 386, 396
- plumbella* (Heinemann, 1870) – ólomszínű sarlósmoly – 215, 231, 294, 385

Gelechiinae – Gelechiini

Xystophora Wocke, 1876

- carchariella* (Zeller, 1839) – bükkönyrágó sarlósmoly – 3, 23, 53, 77, 134, 184, 294, 385
- pulveratella* (Herrich-Schäffer, 1854) – kereprágó sarlósmoly – 3, 22, 36, 52, 126, 134, 167, 178, 184, 189, 235, 294, 301, 385, 387

Athrips Billberg, 1820

- rancidella* (Herrich-Schäffer, 1854) – madárbirs-sarlósmoly – 3, 31, 178, 184, 294, 301, 385, 396
 = *triatomea* (Mühlig, 1864) – 3
 = *vepretella* (Zeller, 1870) – 3
- patockai* (Povolný, 1979) – gyöngyvessző-sarlósmoly – 324, 396
- mouffetella* (Linnaeus, 1758) – lonclefél-sarlósmoly – 3, 51, 122, 167, 184, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 396
- amoenella* (Frey, 1882) – fehérsávú sarlósmoly – 261, 301
- nigricostella* (Duponchel, 1842) – lucernafonó sarlósmoly – 3, 13, 15, 51, 53, 77, 119, 134, 167, 184, 221, 232, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 387, 396

Neofriseria Sattler, 1960

- singula* (Staudinger, 1876) – mohaszövő sarlósmoly – 5, 142, 184, 197
 = *suppeliella* (Walsingham, 1896) – 3
- pelilla* (Treitschke, 1835) – sóskaaszár-sarlósmoly – 184, 283, 309, 386, 396

Prolita Leraut, 1993

solutella (Zeller, 1839) – galajszövő sarlósmoly – 3, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 70, 77, 99, 134, 177, 178, 184, 189, 197, 235, 263, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396
= *pribitzeri* (Rebel, 1889) – 3

***Sophronia* Hübner, 1825**

semicostella (Hübner, 1813) – rozsdaszürke sarlósmoly – 3, 13, 15, 23, 31, 45, 51, 59, 78, 99, 119, 134, 167, 178, 184, 197, 294, 385, 386, 396

consanguinella Herrich-Schäffer, 1854 – mezeiüröm-sarlósmoly – 3, 45, 51, 78, 99, 167, 197, 260, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396

= *marginella* Toll, 1936 – lengyel sarlósmoly – 3, 5, 23

illustrella (Hübner, 1796) – tarka sarlósmoly – 3, 22, 45, 52, 134, 142, 167, 178, 197, 294, 321, 385, 386, 396

grandii Hering, 1933*¹⁴⁰ – turjáni sarlósmoly (olasz sarlósmoly) – 5

= *ascalis* Gozmány, 1951 – mint turjáni sarlósmoly – 3, 5, 13, 31, 51, 52, 77, 99, 126, 134, 178, 183, 184, 197, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396

chilonella (Treitschke, 1833) – ürömrágó sarlósmoly – 3, [77], 126, 184, 310

humerala ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kakukkfűszövő sarlósmoly – 3, 15, 35, 119, 134, 135, 142, 167, 294, 321, 385, 396

sicariellus (Zeller, 1839) – ürömfonó sarlósmoly – 3, 45, 51, 52, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

***Mirificarma* Gozmány, 1955**

maculatella (Hübner, 1796) – feketepettyes sarlósmoly – 3, 15, 22, 31, 36, 51, 53, 78, 119, 134, 152, 167, 177, 184, 189, 197, 232, 235, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 396

eburnella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdaszínű sarlósmoly – 142, 167, 178, 189, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 301, 385, 386, 396

= *formosella* (Hübner, 1796) – 3, 5, 13, 15, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 78, 99

= *flamella* (Hübner, 1825) – 119, 122, 126, 134, 135

lentiginosella (Zeller, 1839) – seprőzanót-sarlósmoly – 3, 36, 52, 167, 174, 178, 184, 189, 235, 294, 301, 310, 385, 386, 396

cytisella (Treitschke, 1833) – zanótszövő sarlósmoly – 3, 31, 51, 52, 77, 99, 134, 142, 177, 178, 189, 280, 294, 296, 321, 385, 387, 396

mulinella (Zeller, 1839) – seprőzanótvirág-sarlósmoly – 47, 51, 280, 396

***Aroga* Busck, 1914**

velocella (Zeller, 1839) – sóska szövő sarlósmoly – 3, 13, 15, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 77, 99, 119, 152, 167, 178, 184, 189, 197, 235, 262, 294, 297, 301, 321, 330, 333, 385, 386, 396

flavicomella (Zeller, 1839) – aranyfejű sarlósmoly – 3, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 99, 119, 134, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Filatima* Busck, 1939**

spurcella (Duponchel, 1843) – kökénymoha-sarlósmoly – 3, 13, 15, 22, 51, 77, 99, 119, 167, 184, 197, 260, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

tephritidella (Duponchel, 1844) – baltajegyű sarlósmoly – 3, 294, 385, 396

ukrainica Piskunov, 1971*¹⁴¹ – ukrainai sarlósmoly – 231

***Chionodes* Hübner, 1825**

lugubrella (Fabricius, 1794) – szarvaskerep-örvösmoly – 3, [31], 51, [169], 386, 396

tragicella (Heyden, 1865) – vörösfenyő-örvösmoly – 3, 22, 294, 385

luctuella (Hübner, 1793)*¹⁴² – havasi örvösmoly – 3

distinctella (Zeller, 1839) – ürömszövő örvösmoly – 3, 15, 23, 36, 51, 52, 77, 99, 119, 126, 134, 178, 183, 184, 189, 220, 235, 294, 301, 321, 333, 385, 386, 396

electella (Zeller, 1839) – fenyőrágó örvösmoly – 3, 35, 45, 51, 78, 142, 167, 178, 197, 296, 297, 310, 321, 386, 396

fumatella (Douglas, 1850) – mohalakó örvösmoly – 5, 15, 36, 62, 77, 78, 119, 152, 167, 182, 184, 189, 235, 263, 294, 310, 333, 385, 386, 396

= *oppletella* (Herrich-Schäffer, 1854) – 3, 13, 22, 333

ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)*¹⁴³ – skandináv örvösmoly – 77, 387

***Gelechia* Hübner, 1825**

rhombella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyümölcslevélszövő sarlósmoly – 3, 15, 45, 51, 78, 119, 134, 135, 142, 167, 184, 197, 294, 297, 321, 385, 386, 396

scotinella Herrich-Schäffer, 1854 – kökényvirág-sarlósmoly – 3, 13, 15, 31, 53, 59, 62, 78, 99, 135, 142, 152, 167, 174, 178, 184, 197, 294, 297, 385, 386, 396

= *lakatensis* Rebel, 1904 – 3

senticetella (Staudinger, 1859) – borókalakó sarlósmoly – 62, 63, 99, 274, 321, 387, 396

sabinellus (Zeller, 1839) – borókarágó sarlósmoly – 3, 51, 70, 77, 99, 167, 178, 197, 280, 310, 321, 387, 396

sororculella (Hübner, 1817) – fehérkeretes sarlósmoly – 161, 167, 197, 260, 297, 386, 396

muscosella Zeller, 1839 – füzbarka-sarlósmoly – 3, 15, 22, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 135, 142, 152, 167, 178, 184, 189, 194, 197, 235, 260, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396

cuneatella Douglas, 1852 – fehérfűz-sarlósmoly – 309

asinella (Hübner, 1796)*¹⁴⁴ – fűzfaszövő sarlósmoly – 3, 386, 387

basipunctella Herrich-Schäffer, [1854]*¹⁴⁵ – hamuszürke sarlósmoly – 5, 68

= *albicans* Heinemann, 1870 – 3

= *basiguttella* Heinemann, 1870 – 3

nigra (Haworth, 1828) – kormos sarlósmoly – 3, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 77, 78, 119, 122, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 235, 263, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396

turpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy sarlósmoly – 152, 167, 178, 184, 197, 232, 260, 274, 301, 321, 333, 386, 387, 396

= *pinguinella* (Treitschke, 1832) – 3, 13, 15, 22, 51, 52

rhombelliformis Staudinger, 1871 – nyárfalevélszövő sarlósmoly – 3, 22, 77, 167, 184, 260, 280, 297, 301, 333, 386, 387, 396

sestertiella Herrich-Schäffer, 1854 – talléros sarlósmoly – 3, 23, 184, 297, 310, 321, 386, 396

***Psoricoptera* Stainton, 1854**

gibbosella (Zeller, 1839) – levélsodró sarlósmoly – 3, 15, 31, 77, 119, 142, 167, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396

***Holcophora* Staudinger, 1871**

statices Staudinger, 1871 – homoki sarlósmoly – 3, 51, 77, 183, 184, 197, 301, 396

Gelechiinae* – *Gnorimoschemini

***Gnorimoschema* Busck, 1900**

soffneri (Riedl, 1965) – mediterrán sarlósmoly

= *antiquum* Povolný, 1966 – 5, 77, 117, 301

herbichii (Nowicki, 1864)*¹⁴⁶ – rozsdabarna sarlósmoly – 5

= *pazsiczyi* (Rebel, 1913) – 3

***Scrobipalpa* Janse, 1951**

acuminatella (Sircom, 1850) – aszatrágó sarlósmoly – 3, 34, 35, 49, 178, 274, 280, 301, 310, 321, 396

hungariae (Staudinger, 1871) – magyar sarlósmoly (tihanyi sarlósmoly) – 3, 52, 178, 294, 385, 396

chrysanthemella (Hofmann, 1867) – margaréta-sarlósmoly – 5, 35, 294, 385

= *opificella* (Mann, 1878) – 3

proclivella (Fuchs, 1886) – parlagi sarlósmoly – 3, 35, 134, 274, 294, 301, 385, 396

= *rancidella* auct. – 5, 35, 99

reiprichi Povolný, 1984 – Reiprich sarlósmolya – 161, 294, 385

obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – libatopfűró sarlósmoly – 3, 13, 15, 22, 23, 35, 36, 51, 77, 119, 152, 183, 184, 189, 197, 235, 301, 310, 396

halonella (Herrich-Schäffer, 1854)*¹⁴⁷ – fehérüröm-sarlósmoly – 192, 310

pauperella (Heinemann, 1870)*¹⁴⁸ – egyszínű sarlósmoly – 192, 294, 301, 385

- = *klimeschi* Povolný, 1967 – 162, 280, 396
arenbergeri Povolný, 1973 – Arenberger sarlósmolya – 224, 261
atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – rozsdaszárnyú sarlósmoly – 3, 34, 35, 36, 52, 53, 77, 99, 126, 167, 178, 183, 184, 189, 220, 235, 274, 294, 301, 385, 396
artemisiella (Treitschke, 1833) – rozsdacsíkos sarlósmoly – 3, 15, 31, 53, 77, 99, 119, 167, 174, 177, 184, 189, 197, 280, 294, 310, 321, 333, 385, 396
stangei (E. Hering, 1889)*¹⁴⁹ – Stange sarlósmolya – 162
 = *saltenella* (Meess, 1910) – sziklakó sarlósmoly – 3
gallicella (Constant, 1885)*¹⁵⁰ – francia sarlósmoly – 192
nitentella (Fuchs, 1902) – széki sarlósmoly – 68, 183, 184, 301, 396
ocellatella (Boyd, 1858) – répaaknázó sarlósmoly – 3, 31, 35, 42, 51, 52, 77, 78, 126, 135, 142, 167, 178, 183, 184, 194, 197, 221, 232, 260, 262, 280, 294, 296, 297, 301, 307, 310, 321, 333, 385, 387, 396
erichi Povolný, 1964 – Erich sarlósmolya (hajnálmoly) – 26, 77, 310, 321
samadensis (Pfaffen-zeller, 1870) – sziklagyma-sarlósmoly – 5, 35, 68, 77, 183, 184, 301
 = *plantaginella* (Stainton, 1883) – 3, 197
 = *mariae* (Zimmermann, 1926) – 3
salinella (Zeller, 1847)*¹⁵¹ – vaksziki sarlósmoly (vakszizmoly) – 5, 15, 35, 183, 184
 [*salicorniae* (Hering, 1889) – 3, 13]
Scrobipalpula Povolný, 1964
psilella (Herrich-Schäffer, 1854) – szalmagyopár-sarlósmoly – 3, 35, 176, 184, 294, 385
diffuella (Frey, 1870) – homályos sarlósmoly – 176, 331
tussilaginis (Stainton, 1867)*¹⁵² – martilapu-sarlósmoly – 321
 = *tussilaginel-la* (Heinemann, 1870) – 3, 35
Phthorimaea Meyrick, 1902
operculella (Zeller, 1873) – burgonya-sarlósmoly – 188, 195, 362, 374, 396
Tuta Kieffer & Jørgensen, 1910
absoluta (Meyrick, 1917) – paradicsom-sarlósmoly (paradicsommoly) – Am – 276, 290, 322
Ephysteris Meyrick, 1908
promptella (Staudinger, 1859) – őszi sarlósmoly – 77, 178, 184, 301, 310, 321, 333, 387, 396
 = *xanthorhabda* (Gozmány, 1951) – 3
inustella (Zeller, 1839) – buckalakó sarlósmoly – 3, 77, 134, 152, 197, 232, 294, 301, 310, 318, 321, 385, 387, 396
diminutella (Zeller, 1847)*¹⁵³ – homoklakó sarlósmoly – 3, 318
 [*subdiminutella* (Stainton, 1867) – 5, 23, 68, 183, 184, – erroneous; name wrongly used]
Cosmardia Povolný, 1965
moritzella (Treitschke, 1835) – mécsvirág-sarlósmoly – 3, 15, 51, 52, 53, 99, 119, 126, 134, 178, 197, 260, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 396
Klimeschiopsis Povolný, 1967
kiningerella (Duponchel, 1843) – sárgaképző sarlósmoly – 3, 13, 15, 280, 301, 387, 396
Caryocolum Gregor & Povolný, 1954
fischerella (Treitschke, 1833) – szappangyökér-sarlósmoly – 3, 31, 51, 53, 59, 77, 78, 99, 126, 134, 167, 184, 220, 294, 297, 301, 385, 396
alsinella (Zeller, 1868) – madárhúr-sarlósmoly – 3, 36, 51, 77, 167, 174, 177, 184, 189, 235, 294, 301, 385, 396
viscariella (Stainton, 1855) – kakukkszegfű-sarlósmoly – 3, 126, 134, 280, 294, 385
vicinella (Douglas, 1851) – habszegfű-sarlósmoly – 185, 294, 310, 321, 385, 386, 396
 = *inflata* (Chrétien, 1901) – 3, 35
amaurella (M. Hering, 1924) – szurokszegfű-sarlósmoly – 3, 35, 36, 167, 189, 235, 396
petryi (Hofmann, 1899) – fátölvirág-sarlósmoly – 3, 294, 385
inflativorella (Klimesch, 1938) – magyar habszegfűmoly – 3, 17, 34, 35, 36, 51, 52, 189, 235, 396
 = (*Gnorimoschema*) *census* Gozmány, 1954 – 3

- cauligenella* (Schmid, 1863) – szárduzzasztó sarlósmoly – 3, 34, 35, 36, 280, 396
leucomelanella (Zeller, 1839) – barátságfü-sarlósmoly – 3, 119, 167, 184, 310, 321, 396
leucothoracellum (Klimesch, 1953) – fehértorú sarlósmoly – 3, 51, 53, 167, 178, 260, 294, 310, 321, 385, 396
marmorea (Haworth, 1828) – márványos sarlósmoly – 3, 77, 294, 321, 385
blandella (Douglas, 1852) – feketesávcsillaghúrmoly – 3, 134, 135, 142, 167, 178, 189, 194, 232, 235, 260, 280, 294, 296, 297, 321, 333, 386, 387, 396
= *maculea* auct., nec Haworth, 1828 – 5, 35, 36, 78
proxima (Haworth, 1828) – feketefoltos csillaghúrmoly – 77, 126, 174, 178, 184, 189, 197, 235, 260, 274, 294, 321, 385, 386, 396
= *maculiferella* (Douglas, 1851) – 3, 23, 35, 36, 51, 53, 78
blandulella (Tutt, 1887) – apró csillaghúrmoly – 161, 274, 294, 310, 321, 385
tricolorella (Haworth, 1812) – háromszínű csillaghúrmoly – 3, 35, 36, 45, 51, 52, 53, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 232, 235, 294, 297, 301, 330, 385, 386, 396, 421
junctella (Douglas, 1851)*¹⁵⁴ – hamvas csillaghúrmoly – 3, 333
huebneri (Haworth, 1828) – ékfoltos csillaghúrmoly – 3, 5, 34, 35, 52, 135, 167, 189, 235, 294, 385, 386
= *knaggsiella* (Stainton, 1866) – 3, 5
kroesmanniella (Herrich-Schäffer, [1854]) – csillaghúr-sarlósmoly – [188], 332
Agonochaetia Povolný, 1967
intermedia Sattler, 1968 – tiroli sarlósmoly – 231, 233

Gelechiinae – Litini

Teleiodes Sattler, 1960

- vulgella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – galagonya-borzaszmoly – 3, 45, 51, 77, 78, 99, 126, 134, 135, 167, 177, 184, 189, 197, 221, 232, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
wagae (Nowicki, 1860) – szürke borzaszmoly – 126, 167, 177, 189, 220, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396
[„*triparella* Z.” – 3, – erroneous]
saltuum (Zeller, 1878) – fenyőlakó borzaszmoly – 142, 146, 297, 386, 396
luculella (Hübner, 1813) – u-betűs borzaszmoly – 3, 31, 45, 52, 53, 59, 77, 78, 119, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 260, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854) – sárgafoltos borzaszmoly – 175, 220, 301, 387, 396
Neotelphusa Janse, 1958
sequax (Haworth, 1828) – napvirág-borzaszmoly – 3, 51, 78, 134, 167, 177, 189, 197, 294, 310, 321, 385, 396, 421

Carpatolechchia Căpușe, 1964

- decorella* (Haworth, 1812) – somlevél-borzaszmoly – 119, 135, 167, 174, 184, 194, 294, 297, 310, 385, 386, 396
= *humeralis* (Zeller, 1839) – 3, 13, 15, 45, 51, 53
aenigma (Sattler, 1983) – háromsávcsillaghúrmoly – 58, 294, 385
fugitivella (Zeller, 1839) – juharlevél-borzaszmoly – 3, 13, 15, 36, 51, 52, 77, 119, 122, 126, 167, 174, 184, 189, 235, 294, 310, 385, 396
fugacella (Zeller, 1839) – szilfalevél-borzaszmoly – 3, 51, 119, 167, 174, 184, 294, 301, 310, 385, 386, 396
alburnella (Zeller, 1839) – nyírfalevél-borzaszmoly – 3, 51, 59, 142, 178, 197, 301, 330, 386, 396
notatella (Hübner, 1813) – kecskefűz-borzaszmoly – 3, 51, 52, 167, 178, 184, 396
proximella (Hübner, 1796) – égerlevél-borzaszmoly – 3, 45, 51, 52, 59, 78, 119, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 220, 274, 294, 301, 385, 386, 396

Pseudotelphusa Janse, 1958

scaella (Scopoli, 1763) – moharágó sarlósmoly – 3, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78, 99, 119, 125, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 333, 385, 386, 396

istrella (Mann, 1866) – ritka borzasmoly – 332, 396

paripunctella (Thunberg, 1794) – pontozott borzasmoly – 99, 119, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 221, 274, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396

= *triparella* (Zeller, 1839) – 3, 22, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78

tessella (Linnaeus, 1758) – sóskafamoly – 3, 36, 51, 53, 77, 99, 134, 152, 167, 174, 184, 189, 197, 235, 260, 294, 296, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

***Teleiopsis* Sattler, 1960**

diffinis (Haworth, 1828) – juhsóska-sarlósmoly – 3, 22, 23, 51, 52, 59, 77, 99, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396

***Altenia* Sattler, 1960**

scriptella (Hübner, 1796) – patkós borzasmoly – 3, 22, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 134, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 396

***Recurvaria* Haworth, 1828**

nanella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kis vörös-rügysodrómoly – 3, 13, 15, 20, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

leucateila (Clerck, 1759) – nagy vörös-rügysodrómoly – 3, 15, 22, 24, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Coleotechnites* Chambers, 1880**

piceaella (Kearfott, 1903) – fenyőtű-borzasmoly – 53, 77, 78, 126, 162, 167, 184, 189, 235, 274, 297, 301, 310, 321, 386, 396

***Exoteleia* Wallengren, 1881**

dodecella (Linnaeus, 1758) – fenyőrágó borzasmoly – 3, 20, 35, 45, 51, 53, 78, 99, 142, 167, 177, 182, 189, 221, 232, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

***Stenolechia* Meyrick, 1894**

gemmella (Linnaeus, 1758) – tölgyfűró sarlósmoly – 3, 22, 31, 35, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78, 87, 119, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 197, 235, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 396

***Stenolechiodes* Elsner, 1996**

pseudogemmellus Elsner, 1996 – molyhostölgyes sarlósmoly – 161, 174, 177, 189, 197, 260, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 396

***Parastenolechia* Kanazawa, 1985**

nigrinotella (Zeller, 1847) – szőlőrágó sarlósmoly – 3, 62, 174, 184, 197, 274, 280, 294, 310, 321, 385, 396

***Parachronistis* Meyrick, 1925**

albiceps (Zeller, 1839) – mogyorórügy-sarlósmoly – 3, 31, 36, 45, 51, 52, 142, 167, 184, 189, 235, 280, 297, 301, 321, 386, 396

Elachistidae – Fűaknázó-molyfélék^{*155}

Elachistinae

***Perittia* Stainton, 1854**

farinella (Thunberg & Wenner, 1794)^{*156} – fehér fűaknázómoly – 1, 77

huemeri (Traugott-Olsen, 1990) – ritka fűaknázómoly – 146, 310

herrichiella (Herrich-Schäffer, [1855]) – loncagnázómoly – 1, 14, 35, 49, 51, 310, 396

***Stephensia* Stainton, 1858**

brunnichella (Linnaeus, 1767)^{*157} – pereszlénymoly – 1, 35, 52, 178

***Elachista* Treitschke, 1833**

- kalki* (Parenti, 1978) – fényes fűaknázómoly – 146, 174, 294, 310, 321, 385, 387, 396
- szocsi* Parenti, 1978 – magyar fűaknázómoly – 49, 294, 310, 385, 396
- argentella* (Clerck, 1759) – ezüstfehér fűaknázómoly – 1, 13, 15, 20, 22, 23, 32, 36, 51, 52, 53, 59, 119, 134, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396
= *cygnipennella* (Hübner, 1796) – 25, 27, 35, 39, 49, 50
- heringi* Rebel, 1899 – árvalányhajmoly – 1, 20, 35, 49, 64, 174, 184, 294, 310, 385, 396
- hedemanni* Rebel, 1899 – apró sásaknázómoly – 1, 35, 51, 396
- gormella* Nielsen & Traugott-Olsen, 1987 – skandináv fűaknázómoly – [152], 238, 294, 385, 396
- pollinariella* Zeller, 1839 – aranyzabmoly – 1, 20, 35, 51, 119, 178, 310, 396
- triatomea* (Haworth, 1828) – csenkeszmoly – 1, 35, 52, 178, 396
- adscitella* Stainton, 1851 – barnás fűaknázómoly – 188, 195, 321, 386
= *revinctella* auct., nec Zeller, 1850 – 1, 5
- collitella* (Duponchel, 1843) – fényperjemoly – 1, 20, 35, 49, 174, 294, 385, 396
- subocellea* (Stephens, 1834) – szemes fűaknázómoly – 5, 35, 183, 189, 235, 294, 301, 385, 396
= *disertella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – 1, 34, 35, 49, 51, 52, 53
- agelensis* Traugott-Olsen, 1996 – háromsávós fűaknázómoly – 330
- unifasciella* (Haworth, 1828) – egysávós fűaknázómoly – 174, 294, 301, 310, 385
- obliquella* Stainton, 1854 – Megerle fűaknázómolya –
= *megerlella* auct., nec Hübner, 1810 – 20, 26, 35, 39, 49, 184
- cingillella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – fehérsávós fűaknázómoly – 1, 20, 35, 49, 51, 52, 53, 126, 178, 183, 191, 310, 396
- fasciola* Parenti, 1983 – homokháti fűaknázómoly – 191, 225, 231, 294, 301, 385
- metella* Kaila, 2002 – fehérsávú fűaknázómoly – 191, 225, 231, 294, 310, 385, 396
- gangabella* Zeller, 1850 – sárgasávós fűaknázómoly – 1, 178, 184, 301
= *taeniatella* Stainton, 1857 – 1, 35, 52
- subalbidella* Schläger, 1847 – kékperjemoly – 1, 35, 294, 385
- revinctella* Zeller, 1850 – öves fűaknázómoly – 1, 5, 119, 188, 195
- bisulcella* (Duponchel, 1843) – szalagos fűaknázómoly – 5, 35, 36, 52, 167, 177, 178, 189, 235, 274, 280, 294, 301, 310, 385, 396
= *zonariella* Tengström, 1848 – 1
- chrysodesmella* Zeller, 1850 – sárgaöves fűaknázómoly – 5, 35, 52, 167, 178, 188, 195, 283
- pollutella* Duponchel, 1843 – balkáni fűaknázómoly – 1, 20, 35, 49, 53, 152, 183, 184, 197, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 387, 396
- liskai* Kaila, 2011 – Liška fűaknázómolya – 359
- squamosella* (Duponchel, 1843) – hegyisás-fűaknázómoly – 1, 52, 53, 174, 184, 189, 235, 294, 301, 310, 385, 396
- rudectella* Stainton, 1851 – komócsinmoly – 1, 35, 77, 182, 294, 385
- pullicomella* Zeller, 1839 – zabfűmoly – 1, 35, 36, 52, 77, 119, 167, 174, 178, 184, 189, 235, 280, 294, 301, 321, 330, 385, 396
- bedellella* (Sircom, 1848) – csontszínű perjemoly – 1, 20, 35, 49, 52, 53, 178, 184, 294, 301, 385, 386, 396
= *nigrella* Herrich-Schäffer, 1855 – 13, 15, 20, 26, 35, 49
- spumella* Caradja, 1920 – homoki fűaknázómoly – 47, 49, 77, 174, 294, 301, 321, 385, 387, 396
- dispilella* Zeller, 1839 – csontfehér fűaknázómoly – 1, 20, 35, 178, 184, 301, 351, 385
= *manni* Traugott-Olsen, 1990 – 174, 215, 231, 294, 301, 351
- festucicolella* (Zeller, 1853)*¹⁵⁸ – pusztaicsenkesz-fűaknázómoly – [1, 5], 215, 231, 301, 330, 351, 385
= *klimeschi* Parenti, 1981 nec Dufrane, 1957 – 161, 174, 351
= *klimeschiella* Parenti, 2002 – 294, 351
- nitidulella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – alföldi fűaknázómoly – 1, 77, 174, 294, 301, 351, 385, 396
- dispunctella* (Duponchel, 1843) – juhcsenkeszmoly – 1, 35, 152, 260, 294, 301, 310, 333, 350, 385, 396

- grandella* Traugott-Olsen, 1992 – nagy fűaknázómoly – 340, 350, 385
- triseriatella* Stainton, 1854 – hárompontosoros fűaknázómoly – 184, 188, 195, 396
- disemiella* Zeller, 1847*¹⁵⁹ – kétpontú fűaknázómoly – 1
- elsaella* Traugott-Olsen, 1988 – mátrai fűaknázómoly – 350, 385, 396
= *svenssoni* Traugott-Olsen, 1988 – 215, 231, 294
- gleichenella* (Fabricius, 1781) – perjeszittyómoly – 1, 20, 35, 39, 45, 49, 52, 178, 294, 301, 385, 386, 396
= *magnificella* Duponchel, [1843] – 1
- quadripunctella* (Hübner, [1825]) – négyfoltos fűaknázómoly – 119, 189, 235, 386
= *quadrella* Hübner, [1805] (nomen praeocc.) – 1, 15, 35, 36
- tetragonella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – négypettyes fűaknázómoly – 283
- biatomella* (Stainton, 1848) – deressásómoly – 77, 174, 294, 301, 385
- martinii* Hofmann, 1898 – törpesás-aknázómoly – 20, 26, 35, 49, 294, 385
- serricornis* Stainton, 1854 – északi erdeisásómoly – 26, 178, 301, 307, 354
- scirpi* Stainton, 1887 – zsiókámoly – 47, 49, 77, 183, 184, 354, 396
- juliensis* Frey, 1870 – szőrössásómoly – 35, 39, 47, 354
= *occidentalis* Frey, 1882 (nyugati fűaknázómoly) – 20, 35, 51, 283, 354
- utonella* Frey, 1856 – rétisás-aknázómoly (deressásómoly) – 5, 26, 34, 35, 49, 52, 126, 167, 178, 184, 260, 274, 301, 354, 396
= *paludum* Frey, 1859 – 20, 35, 51
- eleochariella* Stainton, 1851 – csetkaka-fűaknázómoly – 354, 388
- fulgens* (Parenti, 1983) – ezüstfoltos fűaknázómoly – 354
- albidella* (Nylander, 1848) – gyapjúsásómoly – 1, 35, 77, 183, 184, 294, 301, 354, 385
- morandinii* Huemer & Kaila, 2002 – pilisi fűaknázómoly – 205, 231, 225, 354
- contaminatella* (Zeller, 1847) – szálkaperjemoly – 47, 77, 183, 184, 301, 354
- maculicerusella* Bruand, 1859 – lápi fűaknázómoly – 235, 274, 294, 301, 385, 387, 396, 421
= *cerusella* Hübner, 1796 nec ([Denis & Schiffmüller], 1775) – 1, 20, 34, 35, 49, 52, 70, 77, 126, 183, 184
= *monosemiella* Roessler, 1881 – 52, 142, 178, 184, 189, 197
- poae* Stainton, 1855 – haratkásámoly – 1, 35, 77, 294, 301, 385
- atricomella* Stainton, 1849 – ebírmoly – 174, 184, 294, 301, 321, 385, 392, 396
= *infamiliaris* Gozmány, 1957 – 9, 392
- alpinella* Stainton, 1854 – havasi fűaknázómoly – 184, 189, 235, 260, 274, 280, 297, 301, 396
= *monticola* Wocke, [1876] – 5, 26, 52
- kilmunella* Stainton, 1849 – bugaci fűaknázómoly – 184, 260, 396
= *stagnalis* Frey, 1859 – 1
- diederichsiella* Hering, 1889 – kunsági fűaknázómoly – 225, 231
- pomerana* Frey, 1870*¹⁶⁰ – kerti fűaknázómoly – 1, 77, 184, 385
- elegans* Frey, 1859*¹⁶¹ – csinos fűaknázómoly – 119
- luticomella* Zeller, 1839 – sárgafejű fűaknázómoly – 20, 26, 35, 52, 178, 396
- albifrontella* (Hübner, [1817]) – fehérfejű fűaknázómoly – 167, 231, 396
- nobilella* Zeller, 1839 – ezüstsávós fűaknázómoly – 283, 294, 385
- apicipunctella* Stainton, 1849 – északi fűaknázómoly – 15, 26, 119
- subnigrella* Douglas, 1853 – füstös fűaknázómoly – 20, 26, 35, 49, 52, 178, 189, 235
- griseella* (Duponchel, 1843) – szürke fűaknázómoly – 1, 36, 53, 189, 235, 294, 385
- herrichii* Frey, 1859 – fényperje-aknázómoly – 260, 280, 294, 385, 396
= *reuttiana* Frey, 1859 – 20, 26, 35, 49, 50,
- humilis* Zeller, 1850 – sédbúzáómoly – 294, 330, 385
= *perplexella* Stainton, 1859 – 1, 35
- canapennella* (Hübner, [1813]) – pázsitfűmoly – 182, 184, 294, 301, 385
= *pulchella* (Haworth, 1828) – 68, 77
- anserinnella* Zeller, 1839 – sárgafoltos fűaknázómoly – 1, 51, 53, 122, 145, 167, 174, 184, 280, 294, 310, 385, 396

rufocinerea (Haworth, 1828) – selyemperjemoly – 1, 35, 52, 178
exactella (Herrich-Schäffer, 1855) – perjemoly – 434
freyerella (Hübner, [1825]) – kormos fűaknázómoly – 174, 294, 385
 [consortella Stainton, 1851 – 184 – erroneous; name wrongly used]
stabilella Stainton, 1858 – zabmoly – 20, 26, 35, 396

Parametroninae (=Agonoxeninae)

***Blastodacna* Wocke, 1876**

hellerella (Duponchel, 1838) – galagonyarágó lándzsászmoly – 3, 51, 52, 53, 78, 142, 167, 178, 232, 260, 301, 321, 386, 396
atra (Haworth, 1828) – lándzsásszárnyú almamoly – 3, 31, 35, 36, 51, 78, 119, 126, 134, 142, 167, 184, 189, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 385, 386, 396

***Spuleria* Hofmann, 1898**

flavicaput (Haworth, 1828) – galagonyafűró lándzsászmoly – 3, 99, 178, 297, 301, 310, 396
 = *aurifrontella* (Geyer, 1832) – 51, 52

***Heinemannia* Wocke, 1876**

laspeyrella (Hübner, [1796])*⁵⁶² – sárgafejű lándzsászmoly – 3
festivella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyvessző-lándzsászmoly – 3, 36, 51, 52, 53, 99, 119, 167, 184, 189, 221, 235, 280, 294, 385, 396

***Dystebenna* Spuler, 1910**

stephensi (Stainton, 1849) – tölgyaknázó lándzsászmoly – 3, 134, 184, 294, 385, 396

***Haplochrois* Meyrick, 1897 (= *Tetanocentria* Rebel, 1902)**

albanica (Rebel, 1932) – délvidéki lándzsászmoly – 96, 184, 333, 385, 396
ochraceella (Rebel, 1903) – fényes lándzsászmoly – 3, 7, 9, 10, 15, 36, 88, 178, 184, 189, 235, 297, 321, 333, 386, 396, 421

***Chrysoclista* Stainton, 1854**

linneella Clerck, 1759) – pompás lándzsászmoly – 3, 51, 178, 297, 387, 396
splendida Karsholt, 1997 – kétfoltos lándzsászmoly – 153
lathamella T. Fletcher, 1936 – fűzfónó lándzsászmoly – 3, 36, 77, 189, 235

Coleophoridae – Zsákhordómolyfélék (zsákosmolyok)

***Augasma* Herrich-Schäffer, 1853**

aeratella (Zeller, 1839) – gubacshúzózmoly – 2, 35, 44, 52, 178, 274, 294, 361, 385, 387, 396, 426

***Coleophora* Hübner, 1822 (= *Goniodoma* Zeller, 1849; *Metriotes* Herrich-Schäffer, 1853)**

lutarea (Haworth, 1828)*¹⁶³ – zöldessárga zsákosmoly – 74, 142, 167, 178, 189, 235, 280, 361, 386, 396, 426

= *modestella* (Duponchel, 1838) – 2, 45, 52

auroguttella (Fischer von Röslerstamm, 1841)*¹⁶⁴ – labodaszárfűró zsákosmoly – 2, [35], 51, 53, 77, 126, 135, 184, 301, 361, 387, 396, 426

albella (Thunberg, 1788) – fehérécsikos zsákosmoly – 119, 189, 197, 200, 235, 260, 294, 301, 321, 333, 361, 385, 386, 396, 426

= *leucapennella* Hübner, 1827 – 2, 13, 15, 36, 51, 52, 53, 99, 134

spiraeella Rebel, 1916 – gyöngyvessző-zsákosmoly – 2, 20, 35, 361, 396

= *spiraeae* auct. – 49

lutipennella (Zeller, 1838) – tölgyrüggyrágó zsákosmoly – 2, 13, 15, 20, 25, 35, 50, 51, 53, 119, 167, 184, 197, 200, 280, 294, 301, 310, 361, 385, 386, 396, 426

longicornella Constant, 1893 – sziki zsákosmoly – 34, 35, 47, 49, 77, 184, 361

ochripennella Zeller, 1849 – peszterce-zsákosmoly – 2, 35, 77, 167, 220, 361, 385, 426

gryphipennella (Hübner, [1796]) – rózsaknázó zsákosmoly – 2, 35, 49, 119, 184, 361, 385, 396, 426

- flavipennella* (Duponchel, 1843) – szürkésvörös zsákosmoly – 2, 20, [22], 23, 25, 35, 49, 51, 77, 87, 119, 184, 200, 280, 301, 361, 386, 396, 426
- adjectella* Herrich-Schäffer, 1861 – bozótlakó zsákosmoly – 306, 361, 426
- milvipennis* Zeller, 1839 – agyagszínű zsákosmoly – 2, 35, 77, 184, 260, 294, 361, 385, 387, 396, 426
- avellanae* Tabell & Huener, 2024 – tokaji zsákosmoly – 445
- alnifoliae* Barasch, 1934 – aranyfényű zsákosmoly – 265, 274, 341, 361, 396
- badiipennella* (Duponchel, 1843) – csikosszegélyű zsákosmoly – 2, 35, 49, 174, 184, 294, 341, 361, 385, 386, 426
- limosipennella* (Duponchel, 1843) – szilfalevél-zsákosmoly – 2, 15, 23, 31, 34, 35, 49, 52, 53, 77, 119, 134, 142, 178, 184, 274, 294, 361, 385, 387, 396, 426
- siccifolia* Stainton, 1856 – hársfalevél-zsákosmoly – 20, 25, 35, 51, 200, 301, 361, 396, 426
- kroneella* Fuchs, 1899 – körtelevél-zsákosmoly – 2, 14, 20, 35, 310, 341, 361, 385, 426
- coracipennella* (Hübner, [1796]) – kökény-zsákosmoly – 188, 195, 301, 333, 361, 426
- serratella* (Linnaeus, 1761) – ligeti zsákosmoly – 2, 14, 15, 20, [22], 23, 25, 34, 35, 36, 50, 49, 51, 52, 64, 77, 119, 126, 178, 184, 189, 200, 235, 294, 301, 361, 385, 386, 387, 396, 426
= *fuscedinella* Zeller, 1849 – 2, 20, 23, 34, 35, 49, 134
- spinella* (Schränk, 1802) – galagonya-zsákosmoly – 283, 301, 341, 361, 385, 396, 426
- prunifoliae* Doets, 1944 – kökényaknázó zsákosmoly – 26, 35, 44, 49, 50, 77, 184, 274, 280, 294, 296, 297, 310, 361, 385, 396, 426
- hydrolapathella* M. Hering, 1921 – lóromragó zsákosmoly – 2, 7, 77, 341, 361, 426
- cecidophorella* Oudejans, 1972 – pusztai zsákosmoly – 77, 88, 183, 184, 280, 296, 333, 361, 386, 396, 426
= *icterella* Toll, 1949 – 5, 26
- trigeminella* Fuchs, 1881 – cseresznyelevél-zsákosmoly – 2, 35, 44, 260, 361, 396
- cornutella* Herrich-Schäffer, 1861 – nyíraknázó zsákosmoly – 361
= *cornuta* Heinemann & Wocke, 1876 – 2, 35
- fuscocuprella* Herrich-Schäffer, [1855] – patinafényű zsákosmoly – 2, 35, 341, 361, 396, 426
- lusciniaepennella* (Treitschke, 1833) – füzaknázó-zsákosmoly – 231, 260, 274, 361, 387, 396, 426
= *viminetella* Zeller, 1849 – 2, 35, 49, 184
- violacea* (Ström, 1783)*¹⁶⁵ – lilafényű zsákosmoly – 224, 261, 294, 341, 361, 385, 386
= *paripennella* auct., nec Zeller, 1839 – mint szederlakó zsákosmoly – 2, 5, 35; name wrongly used
- potentillae* Elisha, 1885 – pimpó-zsákosmoly – 301, 306, 301, 361, 426
- juncicolella* Stainton, 1851 – hangarágó zsákosmoly – 2, 35, 51, 361, 391, 396
- orbitella* Zeller, 1849 – égeraknázó zsákosmoly – 2, 35, 178, 341, 361, 387, 426
- binderella* (Kollar, 1832) – égerlevél-zsákosmoly – 2, 34, 35, 49, 77, 178, 294, 361, 385, 387
- ahenella* Heinemann, 1877 – somaknázó zsákosmoly – 2, 14, 35, 49, 52, 53, 178, 184, 294, 361, 385, 396, 426
- albitarsella* Zeller, 1849 – árvacsalánlakó zsákosmoly – 2, 20, 35, 39, 49, 52, 178, 184, 260, 280, 301, 361, 386, 396, 426
- pulmonariella* Ragonot, 1874 – tüdőfűragó zsákosmoly – 35, 39, 47, 330, 341, 361, 385, 426
- trifolii* (Curtis, 1832) – somkóró-zsákosmoly – 23, 77, 119, 126, 184, 189, 220, 235, 260, 274, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 326, 333, 361, 386, 396, 421, 426
= *frischella* auct., nec Linnaeus, 1758 – 2, 13, 15, 22, 36, 46, 52, 53, 78, 122, 134, 135, 142, 167, 178, 183, 197, 221, 385
- frischella* (Linnaeus, 1758)*¹⁶⁶ – lóhere-zsákosmoly – 119, 126, 189, 200, 235, 274, 326, 341, 361, 396, 426
- alcyonipennella* (Kollar, 1832) – aranyzöld zsákosmoly – 2, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 35, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 200, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 326, 361, 385, 386, 387, 396, 426
[„*cuprariella* Zeller, 1847” *¹⁶⁷ – 36, 47 – erroneous]
- conyzae* Zeller, 1868 – bolhafű-zsákosmoly – 2, 35, 36, 77, 119, 184, 321, 341, 361, 426

- ptarmicia* Walsingham, 1910 – kenyérbélcickafark-zsákosmoly – 188, 195, 280, 301, 334, 361, 426
- striolatella* Zeller, 1849 – hegyi zsákosmoly – 26, 77, 361
- obviella* Rebel, 1914 – ritka zsákosmoly – 2, 341, 361, 385
- uralensis* Toll, 1961 – uráli zsákosmoly – 174, 175, 294, 325, 361, 385, 396
- lineolea* (Haworth, 1828) – árvacsalán-zsákosmoly – 2, 20, 35, 36, 49, 51, 77, 184, 189, 200, 235, 274, 294, 296, 301, 321, 361, 385, 387, 396, 426
- niveiciliella* O. Hofmann, 1877*¹⁶⁸ – budai zsákosmoly – 361
= *edithae* Gozmány, 1951 – 2, 7
- nigridorsella* Amsel, 1935 – barnaszegélyes zsákosmoly – 325, 341, 361, 426
- hemerobiella* (Scopoli, 1763) – gyümölcsfalevél-zsákosmoly – 2, 14, 20, 33, 35, 45, 49, 51, 52, 53, 77, 142, 167, 178, 184, 189, 200, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 361, 385, 386, 396, 426
- klimeschiella* Toll, 1952 – buckajáró zsákosmoly – 2, 7, 77, 301, 325, 341, 361, 426
- eurasiatica* Baldizzone, 1989*¹⁶⁹ – eurázsiai zsákosmoly – 90, 301, 325, 361, 396, 426
- lithargyrinella* Zeller, 1849 – olajsárga zsákosmoly – 119, 178, 184, 200, 361, 386, 396, 426
= *olivacella* Stainton, 1854 – 2, 35, 39, 45, 49, 51, 52, 53
= *fuscatella* Toll, 1952 – 2, 15, 119
- onobrychiella* Zeller, 1849 – csüdfüaknázó zsákosmoly – 274, 280, 294, 301, 310, 361, 385, 426
= *arenariella* Zeller, 1865 – 2, 14, 20, 35, 49, 184
- medelichensis* Krone, 1908 – dárdahegy-zsákosmoly – 2, 35, 36, 167, 174, 189, 235, 280, 294, 361, 385, 396, 426
- colutella* (Fabricius, 1794) – pillangósvirág-zsákosmoly – 2, 35, 36, 77, 167, 189, 200, 221, 235, 260, 274, 294, 301, 333, 361, 385, 396, 426
= *serenella* Duponchel, 1843 – 2, 68, 184
= *crociniella* Tengström, 1848 – 2, 14, 35, 49
- trifariella* Zeller, 1849 – zanótaknázó zsákosmoly – 2, 35, 178, 184, 274, 280, 294, 297, 310, 321, 361, 385, 396, 426
- genistae* Stainton, 1857 – rekettyelakó zsákosmoly – 2, 35, 174, 294, 341, 361, 385, 426
- saturatella* Stainton, 1850 – sávós zsákosmoly – 260, 361, 396
= *bilineatella* auct., nec Zeller, 1849 – 2, 5 – incorrectly used name
- bilineatella* Zeller, 1849 – kétcsíkú zsákosmoly – [2], 35, 51, 174, 184, 189, 200, 235, 280, 294, 310, 361, 385, 386, 396, 426
= *perserenella* Rebel, 1919 – 2, 14, 35, 49
= *sergii* Gozmány, 1956 – 8
- niveicostella* Zeller, 1839 – kakukkfű-zsákosmoly – 2, 35, 52, 178, 182, 184, 280, 294, 301, 385, 386, 396, 426
- albicostella* (Duponchel, 1843) – irtásréti zsákosmoly – 2, 20, [22?] 35, 51, 53, 77, 99, 174, 184, 200, 280, 294, 310, 361, 385, 396, 426
= *approximata* Gozmány, 1956 – 8
- sergiella* Falkovitsh, 1979 – mátrai zsákosmoly – 215, 231, 341, 361, 426
- squamella* Constant, 1885 – pikkelyes zsákosmoly – 293, 294, 341, 361, 385, 426
- discordella* Zeller, 1849 – bársonykerep-zsákosmoly – 26, 35, 49, 77, 182, 294, 321, 361, 385, 396, 426
- acrisella* Millièr, 1872 – dárdahegy-zsákosmoly – 2, 35, 310, 341, 361, 396, 426
- fringillella* Zeller, 1839 – pontusi zsákosmoly – 2, 260, 297, 301, 341, 361, 396, 426
- rectilineella* Fischer von Röslerstamm, 1843 – hegyvidéki zsákosmoly – 357, 396
- vulpecula* Zeller, 1849 – baltacim-zsákosmoly – 2, 35, 49, 126, 361
- congeriella* Staudinger, 1859 – spanyol zsákosmoly – 35, 294, 361, 385, 396, 421, 426
- deauratella* Lienig & Zeller, 1846 – aranyló zsákosmoly – 2, 36, 52, 77, 119, 178, 184, 189, 235, 260, 301, 326, 361, 386, 387, 396, 426
- mayrella* (Hübner, [1813]) – tarlóhere-zsákosmoly – 167, 200, 297, 301, 326, 333, 361, 385, 386, 396, 426
= *spissicornis* (Haworth, 1828) – 2, 15, 22, 34, 49, 51, 77, 119, 184

- paramayrella* Nel, 1993 – bronzfényű zsákosmoly – 326, 341, 361, 396, 426
- aleramica* Baldizzone & Stübner, 2007 – löhererágó zsákosmoly – 326,332,341,333,361, 385, 426
- variicornis* Toll, 1952*¹⁷⁰ – cickafarklakó zsákosmoly – 326, 332, 341, 361, 426
[*hieronella* Zeller, 1849 auct. – 188, 195 – erroneous, lásd 326]
- ballotella* (Fischer von Röslerstamm, 1839) – tisztessű-zsákosmoly – 2, 14, 20, 31, 35, 36, 49, 77, 178, 184, 189, 197, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 361, 385, 386, 387, 396, 426
- anatipennella* (Hübner, [1796]) – fehértollú zsákosmoly – 2, 13, 15, 23, 26, 31, 35, 44, 51, 52, 53, 77, 78, 119, 182, 184, 189, 200, 220, 235, 294, 301, 361, 385, 396, 426
= *bernoulliella* (Goeze, 1783) – 126, 274, 333
- albidella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehér zsákosmoly – 2, 35, 44, 52, 77, 126, 178, 184, 280, 333, 361, 396, 426
- kuehnella* (Goeze, 1783) – sápadt zsákosmoly – 126,178,189,220, 235, 294, 361, 385, 386, 396, 426
= *palliatella* Zincken, 1813 – 2, 23, 35, 45, 50, 53, 77, 184
- ibipennella* Zeller, 1849 – sárgaerű zsákosmoly – 35, 68, 77, 301, 361, 387, 396, 426
= *nemorum* Heinemann, 1854 – 2, 35, 49, 52
- betulella* Heinemann, 1877 – nyírlakó zsákosmoly – 188, 195, 341, 361, 396, 426
- zelleriella* Heinemann, 1854 – fűzfalevél-zsákosmoly – 2,5,35,52,77,178,184,274,361, 386, 387, 426
= *pannonicella* Gozmány, 1956 – 5, 8, 26
- currucipennella* Zeller, 1839 – fakó zsákosmoly – 2, 15, 20, 34, 35, 40, 45, 49, 52, 77, 119, 167, 178, 184, 260, 280, 297, 361, 386, 396, 426
= *nemorum* auct., nec Heinemann, 1854 – partim – 184
- pyrrhulipennella* Zeller, 1839 – európai zsákosmoly – 215, 231, 361, 386
- brevipalpella* Wocke, 1874 – imolarágó zsákosmoly – 2, 35, 51, 77, 184, 200, 220, 260, 294, 301, 361, 385, 396, 426
- serratulella* Herrich-Schäffer, [1855] – zsoltina-zsákosmoly – 188, 261, 361
- didymella* Chrétien, 1899 – imola-zsákosmoly – 369, 426
- virgatella* Zeller, 1849 – zsájarágó zsákosmoly – 2, 14, 23, 35, 49, 87, 178, 184, 197, 294, 321, 361, 385, 396, 421, 426
- chamaedriella* Bruand, 1851 – gamandoraknázó zsákosmoly – 2, 20, 35, 49, 77, 119, 174, 178, 183, 184, 189, 235, 294, 297, 301, 333, 361, 385, 387, 396, 426
- mareki* Tabell & Baldizzone, 2014 – Marek zsákosmolya – 331, 336, 341, 361, 385, 396, 421, 426
- serpylletorum* E. Hering, 1889 – kakukkfűaknázó zsákosmoly – 2,15, 20, 23, 35, 49, 51, 52, 77, 119, 177, 178, 183, 184, 189, 200, 220, 235, 260, 274, 294, 297, 301, 321, 333, 361, 385, 387, 396, 426
- auricella* (Fabricius, 1794) – gamandorlakó zsákosmoly – 2, 14, 23, 35, 36, 49, 77, 119, 134, 184, 220, 235, 280, 294, 310, 333, 361, 385, 396, 426
= *pauciotella* Toll, 1961 – 261, 301
- gallipennella* (Hübner, [1796]) – csüdfülakó zsákosmoly – 2, 15, 22, 31, 36, 51, 52, 78, 119, 126, 178, 184, 189, 197, 200, 235, 260, 274, 280, 361, 396, 426
- stramentella* Zeller, 1849 – síksági zsákosmoly – 2, 15, 77, 119, 321, 361, 426
- dignella* Toll, 1961*¹⁷¹ – fehérszegélyes zsákosmoly – 296, 325, 333, 361, 396, 426
[„*colutella* F.” incorrectly used name – 2, 5]
= *kasyi* Toll, 1961 – 188, 195
- impalella* Toll, 1961 – bélmegyeri zsákosmoly – 239, 261, 325, 361, 425, 426, 437
- coronillae* Zeller, 1849 – ledneklakó zsákosmoly – 2, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 49, 51, 52, 53, 77, 119, 152, 167, 178, 184, 189, 197, 200, 235, 260, 280, 321, 333, 361, 385, 396, 426
- flaviella* Mann, 1857 – sárga zsákosmoly – 188, 195, 294, 341, 361, 385, 396, 426
- vibicigerella* Zeller, 1839 – mezeiüröm-zsákosmoly – 2, 35, 36, 52, 77, 126, 178, 183, 184, 235, 294, 301, 321, 361, 385, 396, 426
- conspicueella* Zeller, 1849 – búzavirág-zsákosmoly – 2, 20, 35, 40, 45, 49, 51, 52, 53, 64, 74, 77, 99, 119, 142, 178, 183, 184, 189, 200, 220, 235, 260, 274, 297, 301, 361, 386, 396, 426

- partitella* Zeller, 1849 – fehérüröm-zsákosmoly – 2, 31, 35, 52, 77, 178, 183, 184, 189, 235, 260, 274, 294, 297, 301, 361, 385, 396, 426
- ditella* Zeller, 1849 – mezeiürömevő zsákosmoly – 2, 35, 36, 77, 184, 189, 235, 260, 280, 294, 321, 333, 361, 385, 396, 426
= *roessleri* Wocke, 1876 – 2, 35,
- fuscociliella* Zeller, 1849 – füstösrojtú zsákosmoly – 2, 35, 36, 134, 178, 178, 189, 235, 260, 294, 361, 385, 396, 426
= *medicaginis* Herrich-Schäffer, 1861 – 2, 35
- pseudoditella* Baldizzzone & Patzak, 1983 – rétiöszirózsa-zsákosmoly – 174, 184, 294, 361, 385, 396
- eupepla* (Gozmány, 1954) – peszéri zsákosmoly – 2, 5, 68, 77, 195, 218, 325, 361
[*hospitiella* Chrétien, 1915 – 68, 77, 218 – name wrongly used]
[*kasyi* Toll, 1961 – 68, 218 – erroneous]
- astragalella* Zeller, 1849 – levantei zsákosmoly – 2, 22, 35, 36, 49, 51, 87, 122, 174, 183, 184, 189, 200, 235, 260, 280, 294, 301, 333, 361, 385, 396, 426
- solenella* Staudinger, 1859 – ezüstös zsákosmoly – 408
- gazella* Toll, 1952 – szikesjáró zsákosmoly – 448
- caelebipennella* Zeller, 1839 – szalmagyopár-zsákosmoly – 2, 34, 35, 178, 260, 301, 341, 361, 385, 396, 426
- cracella* (Vallot, 1835) – bükkönyaknázó zsákosmoly – 2, 167, 189, 197, 235, 280, 310, 341, 361, 396, 426
= *lugduniella* Stainton, 1859 – 5, 14, 35, 36, 49
- vibicella* (Hübner, [1813]) – galajrágó zsákosmoly – 2, 22, 23, 35, 52, 77, 78, 178, 183, 197, 243, 301, 321, 361, 385, 386, 396, 421, 426
- ononidella* Millière, 1879 – iringó-zsákosmoly – 238, 260, 310, 361, 396
- vicinella* Zeller, 1849 – kecskeruta-zsákosmoly – 2, 14, 22, 35, 49, 51, 77, 177, 184, 189, 200, 294, 321, 333, 361, 385, 396, 426
- ochrea* (Haworth, 1828) – ezüstcsíkos zsákosmoly – 2, 14, 20, [22], 23, 31, 35, 36, 49, 51, 52, 53, 77, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 184, 189, 200, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 310, 321, 361, 385, 386, 387, 396, 426
- bilineella* Herrich-Schäffer, [1855] – tetemtoldó-zsákosmoly – 2, 14, 35, 49, 174, 294, 301, 310, 361, 385, 396, 426
- lixella* Zeller, 1849 – füaknázó zsákosmoly – 2, 15, 22, 23, 35, 36, 45, 51, 53, 59, 78, 142, 167, 174, 178, 189, 197, 200, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 310, 321, 333, 361, 385, 386, 387, 396, 426
- caucasica* Stainton, 1867 – kaukázusi zsákosmoly – 408
- ornatipennella* (Hübner, [1796]) – fűvönélő zsákosmoly – 2, 13, 15, 20, 22, 23, 31, 36, 49, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 200, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 361, 385, 386, 387, 396, 426
- oriolella* Zeller, 1849 – koronafürt-zsákosmoly – 2, 35, 51, 53, 182, 184, 200, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 361, 385, 396, 426
- hartigi* Toll, 1944 – Hartig zsákosmolya – 260, 261, 263, 294, 310, 321, 361, 385, 396, 426
- vulnerariae* Zeller, 1839 – nyúlhere-zsákosmoly – 2, 5, 15, 52, 119, 174, 178, 294, 321, 361, 385, 386, 396, 426
= *icterella* Duponchel, 1840 – 188, 195
- glaseri* Toll, 1961 – Glaser zsákosmolya – 188, 195, 341, 361, 426
- supinella* Ortner, 1949 – kopáros zsákosmoly – 320, 361
- pennella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vértörágó zsákosmoly – 167, 189, 200, 294, 301, 361, 385, 386, 396, 426
= *onosmella* (Brahm, 1791) – 2, 13, 14, 15, 20, 35, 45, 49, 51, 53, 77, 119, 122, 134, 183, 184
- laricella* (Hübner, [1817]) – vörösfenyő-zsákosmoly – 2, 35, 220, 297, 341, 361, 386, 396, 426
- antennariella* Herrich-Schäffer, 1861 – szittyólevél-zsákosmoly – 23, 361, 386

- adjunctella* Hodgkinson, 1882 – szikiszittyó-zsákosmoly – 34, 47, 184, 274, 301, 361, 385, 426
- caespititiella* Zeller, 1839 – mocsári zsákosmoly – 2, 52, 119, 178, 274, 280, 361, 385, 387, 396, 426
- tamesis* Waters, 1929 – lápréti zsákosmoly – 2, 7, 77, 183, 184, 341, 361
- glaucicolella* Wood, 1892 – szittyólakó zsákosmoly – 2, 7, 23, 34, 51, 52, 70, 77, 174, 177, 178, 183, 184, 189, 200, 260, 274, 280, 294, 301, 361, 385, 386, 387, 396, 426
- otidipennella* (Hübner, [1817]) – perjeszittyó-zsákosmoly – 167, 178, 294, 361, 385, 386, 426
= *murinipennella* Duponchel, 1844 – 2, 7, 52, 184,
- alticolella* Zeller, 1849 – szittyótermés zsákosmoly – [2], 77, 88, 174, 184, 294, 301, 341, 361, 385, 386, 396, 426
- taeniipennella* Herrich-Schäffer, [1855] – szittyóaknázó zsákosmoly – 2, 7, 77, 182, 183, 184, 274, 280, 294, 361, 385, 387, 396, 426
- salinella* Stainton, 1859 – sziksófű-zsákosmoly – 188, 195, 301, 341, 361, 396, 426
- sylvaticella* Wood, 1892 – erdei zsákosmoly – 2, 7, 15, 51, 119, 184, 200, 361, 386, 396, 426
= *etelka* Gozmány, 1954 – 2, 7
- obscenella* Herrich-Schäffer, [1855]*¹⁷² – csillagőszirőzsa-zsákosmoly – 341, 361
[*virgaureae* Stainton, 1857 – 2, 7, 44, 77, 387 – erroneous]
- halophilella* Zimmermann, 1926 – szikréti zsákosmoly – 2, 7, 77, 178, 183, 184, 301, 321, 361, 426
- magyarica* Baldizzzone, 1983 – pannon zsákosmoly – 54, 77, 88, 184, 301, 361, 426, 446
- therinella* Tengström, 1848 – aszatrágó zsákosmoly – 2, 7, 13, 15, 35, 51, 77, 119, 167, 174, 183, 184, 189, 200, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 361, 385, 386, 387, 396, 426
- subula* (Falkovitsh, 1993) – ázsiai zsákosmoly – 238, 301, 325, 361, 426
- pratella* Zeller, 1871 – barna zsákosmoly – 2, 7, [22], 361
- linosyris* M. Hering, 1937 – aranyfűrt-zsákosmoly – 34, 47, 294, 301, 310, 321, 361, 385, 396, 426
- asteris* Mühlig, 1864 – őszirőzsa-zsákosmoly – 26, 34, 361, 426
- saxicolella* (Duponchel, 1843) – labodarágó zsákosmoly – 77, 183, 184, 260, 274, 333, 361, 387, 396, 426
- narbonensis* Baldizzzone, 1990 – vértesi zsákosmoly – 168, 174, 175, 294, 325, 361, 385
- pseudolinosyris* Kasy, 1979 – aranyfűrtös zsákosmoly – 184, 188, 195, 260, 294, 301, 310, 333, 361, 385, 396, 426
- proterella* Wikström & Tabell, 2016 – aranyvessző-zsákosmoly – 367, 369
- motacillella* Zeller, 1849 – parajaknázó zsákosmoly – 2, 7, 52, 178, 184, 274, 301, 361, 396, 426
= *palumbipennella* Toll, 1952 – 2, 7
= *székessyi* Gozmány, 1955 – 8, 68
- sternipennella* (Zetterstedt, 1839) – parajmag-zsákosmoly – 2, 7, 44, 77, 182, 183, 184, 260, 274, 294, 301, 361, 385, 396, 426
= *flavaginella* Lienig & Zeller, 1846 – 2, 7
- jaernaensis* Björklund & Palmqvist, 2002 – északi zsákosmoly – 408
- nomgona* Falkovitsh, 1975*¹⁷³ – ezüstsávós zsákosmoly – 188, 195, 325, 361
[*quadrifariella* Staudinger, 1880 – 2, 5, 77, – incorrectly used name]
- squamosella* Stainton, 1856 – seprencelakó zsákosmoly – 52, 174, 178, 184, 294, 301, 341, 333, 361, 385, 386, 396, 426
= *erigerella* Ford, 1935 – 2, 7
- versurella* Zeller, 1849 – labodatermés-zsákosmoly – 2, 7, 23, 34, 77, 174, 183, 184, 260, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 361, 385, 386, 387, 396, 426
- corsicella* Walsingham, 1898 – korzikai zsákosmoly – 77, 341, 361, 385, 396
- dentiferella* Toll, 1952 – szürkecsikos zsákosmoly – 2, 7, 77, 174, 294, 301, 361, 385, 396, 426
- vestianella* (Linnaeus, 1758) – sirálytollú zsákosmoly – 77, 183, 184, 189, 235, 260, 280, 301, 321, 333, 361, 387, 396, 426
= *laripennella* Zetterstedt, 1839 – 2, 7, 13, 15, 44, 52
- atriplicis* Meyrick, 1928 – labodamag-zsákosmoly – 26, 361
- absinthii* Wocke, 1877 – ürömmagrágó zsákosmoly – 2, 7, 15, 119, 310, 361, 413

- artemiscolella* Bruand, 1855 – feketeürmös-zsákosmoly – 2,7,44,77,184,184,274,361, 387, 396, 426
- remizella* Baldizzzone, 1983 – déli zsákosmoly – 54, 77, 301, 333, 361, 426, 446
- chrysanthemi* Hofmann, 1869 – margaréta-zsákosmoly – 179, 274, 341, 361, 426
- lessinica* Baldizzzone, 1980 – dolomitlakó zsákosmoly – 261, 294, 325, 361, 385, 396, 425
- odorariella* Mühlig & Frey, 1857 – hangyabogánca-zsákosmoly – 2, 7, 35, 49, 361
- succursella* Herrich-Schäffer, [1855] – nyugati zsákosmoly – 238, 279, 301, 361, 387, 426
- gnaphalii* Zeller, 1839 – szalmagyopárrágó zsákosmoly – 2, 7, 35, 178, 333, 361
- riffelensis* Rebel, 1913 – keskenyszárnyú zsákosmoly – 341, 361, 396, 426
= *eudoriella* Toll, 1952 – 77
= *fischeri* Toll, 1950 – 2, 7, 51, 200
- galbulipennella* Zeller, 1838 – szikárszegfű-zsákosmoly – 178, 200, 301, 361, 387, 396, 426
= *oitae* Zeller, 1839 – 2, 7, 20, 35, 49, 51, 77, 122, 184
- galatellae* M. Hering, 1942 – aranyfürtlakó zsákosmoly – 2,7,35, 174, 294, 310, 361, 385, 396, 426
- millefolii* Zeller, 1849 – cickafark-zsákosmoly – 2, 20, 35, 44, 52, 178, 184, 361, 396, 435
- kyffhusana* Petry, 1898 – homoki fátolvirág-zsákosmoly – 238, 301, 341, 361, 426
- peribenanderi* Toll, 1943 – bogánclakó zsákosmoly – 2,7,35,184,260, 274, 301, 361, 387, 396, 426
- thymi* M. Hering, 1942 – kakukkfűrágó zsákosmoly – 20, 26, 35, 49, 182, 294, 341, 361, 385, 426
- amellivora* Baldizzzone, 1979 – őszirózsarágó zsákosmoly – 77, 184, 280, 301, 361, 396, 426
= *linearrella* auct., nec Zeller, 1849 – 2, 7, 20, 35, 64
- ramosella* Zeller, 1849 – fehércsápú zsákosmoly – 77, 301, 341, 361, 387, 396, 426, INT¹
= *albicornis* Benander, 1936 – 26, 35
= *vlachi* Toll, 1953 – 77
- trochilella* (Duponchel, 1843) – fészkesviráglakó zsákosmoly – 5, 20, 51, 77, 178, 184, 189, 200, 235, 260, 274, 294, 301, 321, 361, 385, 387, 396, 426
= *troglodytella* auct., nec Duponchel, 1843 – 49, 50
- thurneri* Glaser, 1969 – Thurner zsákosmolya – 369
- gardesanella* Toll, 1953 – pákozdi zsákosmoly – 445
- frankii* A. Schmidt, 1886 – sédkender-zsákosmoly – 34, 35, 47, 49, 54, 310, 341, 361, 385, 426
- linosyridella* Fuchs, 1880 – őszirózsás zsákosmoly – 188, 195, 280, 301, 361, 426
- directella* Zeller, 1849 – agyagbarna zsákosmoly – 2, 7, 22, 49, 77, 301, 361, 387, 426
= *scolopacipennella* Wallengren, 1859 – 35
- inulae* Wocke, 1877 – peremizsaknázó zsákosmoly – 2, 7, 35, 64, 260, 274, 341, 361, 387, 396, 426
- striatipennella* Nylander in Tengström, 1848 – bolhafűrágó zsákosmoly – 2, 7, 22, 23, 52, 77, 87, 178, 184, 274, 361, 386, 387, 396, 426
- solitariella* Zeller, 1849 – csillaghúr-zsákosmoly – 2, 15, 35, 45, 50, 52, 119, 167, 178, 294, 361, 385, 386, 396, 426
- tanacetii* Mühlig, 1865 – varádicsaknázó zsákosmoly – 2, 7, 178, 341, 361, 396, 426
- bornicensis* Fuchs, 1886 – közép-európai zsákosmoly – 332, 341, 361, 426
- albicans* Zeller, 1849 – feketeürmöslakó zsákosmoly – 341, 361, 387, 426
= *artemisiella* Scott, 1861 – 68, 77, 88
- argentula* (Stephens, 1834) – cickafarkmag-zsákosmoly – 2, 5, 7, 23, 34, 40, 60, 77, 174, 183, 184, 274, 280, 294, 301, 361, 385, 387, 396, 426
[*sobrinella* Toll, 1944 – balkáni zsákosmoly – 2, 5, 7, [184] – misidentification]
- peisoniella* Kasy, 1965 – szikiürmös zsákosmoly – 34, 47, 44, 184, 301, 361, 426
- pseudorepentis* Toll, 1960 – homokháti zsákosmoly – 119,174,274,294,301,321, 361, 385, 396, 426
- follicularis* (Vallot, 1802) – peremizsrágó zsákosmoly – 167, 260, 274, 301, 361, 385, 387, 396, 426
= *troglodytella* Duponchel, 1843 – 2, 5, 7, 34, 35, 49, 77, 184
= *derivatella* Zeller, 1849 – 184
= *inulifolia* Benander, 1936 – 7
- granulatella* Zeller, 1849 – seprőürmös-zsákosmoly – 43, 44, 77, 184, 301, 361, 396, 426
= *artemisiae* Mühlig, 1864 – 2, 7, 22, 34

- hungariae* (Gozmány, 1955) – magyar zsákosmoly – 2, 7, 34, 35, 54, 77, 183, 184, 301, 361, 426 – V (5 000 Ft)
- pseudociconiella* Toll, 1952 – sötéteri zsákosmoly – 5, 36, 77, 189, 235, 260, 296, 301, 330, 361, 396, 426
- tyrrhaenica* Amsel, 1951 – görög zsákosmoly – 77, 341, 361, 426, 446
- adpersella* Benander, 1939 – libatoprágó zsákosmoly – 2, 7, 34, 184, 260, 274, 280, 301, 310, 321, 361, 396, 426
- dianthi* Herrich-Schäffer, 1855 – szegfűtok-zsákosmoly – 2, 7, 14, 119, 184, 301, 310, 333, 361, 386, 396, 426
- bucovinella* Nemes, 1968^{*174} – délvidéki zsákosmoly – 188, 195, 294, 341, 361, 385, 426
[*albilineella* Toll, 1960 auct., – 161, 174, 301, 396– erroneous; incorrectly used name]
- grotenfelti* Tabell & Kosorín, 2020 – Grotenfelt zsákosmolya – 403, 426
- sileneella* Herrich-Schäffer, [1855] – habszegfű-zsákosmoly – 2, 7, 13, 15, 22, 34, 35, 51, 77, 119, 122, 184, 200, 294, 301, 310, 333, 361, 385, 387, 396, 426
- ciconiella* Herrich-Schäffer, [1855] – gabonarágó zsákosmoly – 26, 35, 51, 77, 200, 260, 301, 361, 387, 396, 426
- nutantella* Mühlig & Frey, 1857 – szegfűlakó zsákosmoly – 88, 119, 184, 260, 294, 301, 333, 361, 385, 396, 421, 426
- graminicoella* Heinemann, 1877 – pázsitfű-zsákosmoly – 231, 301, 361, 396, 426
- saponariella* Heeger, 1848 – szappanfű-zsákosmoly – 2, 14, 35, 49, 301, 341, 396, 421, 426
- musculella* Mühlig, 1864^{*175} – szegfűragó zsákosmoly – 2, 35, [301, 341], 361
- paripennella* Zeller, 1839^{*176} – egyszínű zsákosmoly – [2], 321, 341, 361, 396, 426
- ucrainae* Baldizzone & Patzak, 1991^{*177} – ukrainai zsákosmoly – 340, 361
[*punctulatella* Zeller, 1849 = *champhorismella* Constant, 1885^o – 5; misidentification; incorrectly used name]
- niveistrigella* Wocke, 1877 – fátolvirág-zsákosmoly – 2, 7, 35, 134, 294, 341, 361, 385, 396, 426
- clypeiferella* O. Hofmann, 1871 – pajzsoshátú zsákosmoly – 2, 17, 44, 45, 51, 52, 77, 152, 178, 183, 184, 189, 197, 200, 235, 260, 274, 294, 301, 333, 361, 385, 386, 387, 396, 426
- binotapennella* (Duponchel, 1843) – kétpettyes zsákosmoly – 2, 22, 31, 34, 36, 51, 53, 77, 119, 183, 184, 189, 200, 235, 260, 274, 301, 321, 333, 361, 386, 387, 396, 426
- squalorella* Zeller, 1849 – mocsos zsákosmoly – 2, 15, 23, 31, 51, 52, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 197, 200, 232, 243, 260, 294, 297, 301, 310, 321, 361, 385, 387, 396, 426
- santonici* Baldizzone & Takács 2022 – szikespusztai zsákosmoly – 414
- salicorniae* Heinemann & Wocke, 1877^{*178} – sziksfűmag-zsákosmoly – [2], [35], 52?, 178, 184, [333], 361, 397
- unipunctella* Zeller, 1849 – feketepettyes zsákosmoly – 2, 52, 77, 178, 184, 260, 274, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 333, 361, 385, 387, 396, 426
- preisseckeri* Toll, 1942 – erdeifenyő-zsákosmoly – 2, 36, 88, 184, 189, 235, 341, 361, 396, 426
- trientella* Christoph, 1872 – homoki zsákosmoly – 220, 280, 294, 301, 310, 321, 361, 385, 387, 396, 426
= *pilicornis* Rebel, 1914 – 2, 77, 88, 174, 183, 184
- wockeella* Zeller, 1849 – nagy zsákosmoly – 2, 20, 22, 23, 35, 49, 78, 142, 167, 197, 321, 361, 385, 386, 387, 396, 426
- onopordiella* Zeller, 1849 – szamárbogáncs-zsákosmoly – 2, 35, 119, 184, 294, 301, 321, 333, 361, 385, 396, 426
- texanella* Chambers, 1878 – porcsin-zsákosmoly (texasi zsákosmoly) – 448

Batrachedridae – Lándzsás-molyfélék

***Batrachedra* Herrich-Schäffer, 1853**

- praeangusta* (Haworth, 1828) – nyárlevélszövő lándzsás-moly – 3, 31, 45, 52, 77, 78, 126, 142, 167, 178, 274, 301, 386, 387, 396

pinicolella (Zeller, 1839) – fenyőtűszövő lándzsászmoly – 3, 15, 45, 51, 59, 77, 78, 99, 119, 142, 152, 167, 178, 274, 280, 301, 386, 396
parvulipunctella Chrétien, 1915 – sziki lándzsászmoly – 408
enormis (Herrich-Schäffer, 1853) – jukka-lándzsászmoly – 434
confusella Berggren, Aarvik, Huemer, Lee & Mutanen, 2022 – erdeifenyő-lándzsászmoly – 447

Scythrididae – Zöldmolyfélék*¹⁷⁹

Scythris Hübner, 1825

obscuraella (Scopoli, 1763) – ércfényű zöldmoly – 1, 13, 15, 22, 23, 31, 45, 52, 78, 126, 119, 135, 167, 178, 197, 263, 294, 301, 385, 386, 396
cuspidella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgamintás zöldmoly – 1, 13, 45, 51, 52, 78, 119, 134, 142, 167, 184, 197, 260, 280, 294, 385, 386, 396
bengtssoni Patočka & Liška, 1989 – sziklagyepi zöldmoly – 161, 174, 280, 294, 385, 396
productella (Zeller, 1839) – szurokfű-zöldmoly – 1, 13, 15, 77, 184, 197, 294, 301, 385, 387
seliniella (Zeller, 1839) – kocsordfonó zöldmoly – 1, 13, 15, 22, 23, 51, 52, 53, 70, 77, 78, 119, 134, 142, 167, 197, 232, 294, 301, 385, 387, 396
subseliniella (Heinemann, 1877)*¹⁸⁰ – sötétzínű zöldmoly – 1
fallacella (Schläger, 1847) – bronzos zöldmoly – 1, 197
tabidella (Herrich-Schäffer, [1855])*¹⁸¹ – lisztes zöldmoly – 1
aerariella (Herrich-Schäffer, [1855])*¹⁸² – fémfényű zöldmoly – 1, 396
flaviventrella (Herrich-Schäffer, [1855])*¹⁸³ – bükkönyfonó zöldmoly – 1, 188, 195
fuscoarena (Haworth, 1828) – napvirágszövő zöldmoly – 68, 149
gozmanyi Passerin d'Entrèves, 1986 – Gozmány zöldmolya – 149, 279, 294, 385
picaepennis (Haworth, 1828) – tűszárnyú zöldmoly – 68, 149
subcinctella (Bruand, [1851])*¹⁸⁴ – barnás zöldmoly
 = *crassiuscula* (Herrich-Schäffer, [1855]) – 174, 294, 385
 = *fletcherella* Meyrich, 1928 – 77
bifissella (O. Hofmann, 1889)*¹⁸⁵ – vértesi zöldmoly (sávós zöldmoly) – 149, 188, 195, 294, 385
pascuella (Zeller, 1855)*¹⁸⁶ – réti zöldmoly – 149, 188, 195
hungaricella Rebel, 1917 – pannon zöldmoly – 182, 294, 385
terrenella (Zeller, 1847)*¹⁸⁷ – apró zöldmoly – 77, 438
 = *parvella* (Herrich-Schäffer, 1855) – 1
 [*tributella* auct. – 301, 333, 396, 438 – incorrectly used name]
pallella (Herrich-Schäffer, [1855])*¹⁸⁸ – moharágó zöldmoly – 1
palustris (Zeller, 1855)*¹⁸⁹ – lápi zöldmoly – 149
laminella ([Denis & Schiffermüller], 1775)*¹⁹⁰ – mohafonó zöldmoly – 1, 52, 178
apicistrigella (Staudinger, 1870)*¹⁹¹ – hegyesszárnyú zöldmoly – 224
knochella (Fabricius, 1794)*¹⁹² – Knoch zöldmolya – 224
punctivittella (O. Costa, 1836)*¹⁹³ – pontosszárnyú zöldmoly – 224
sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875) – aranyfarú zöldmoly – 216, 231, 247, 253, 274, 301, 387, 396
emichi (Anker, 1870) – Emich zöldmolya (magyar zöldmoly) – 1, 77, 279, 387
vittella (O. Costa, 1834) – fehérscsíkos zöldmoly – 167, 177, 189, 221, 260, 263, 280, 294, 310, 321, 385, 396
 = *restigerella* (Zeller, 1839) – 1, 51, 53, 134, 184
limbella (Fabricius, 1775) – parajfonó zöldmoly – 77, 119, 126, 142, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 274, 280, 294, 297, 301, 305, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
 = *quadriguttella* (Thunberg, 1794) – 5, 15, 31, 36, 51, 52, 53
 = *chenopodiella* (Hübner, [1813]) – 1, 13
buszkoi Baran, 2004 – ördögcérna-zöldmoly – 280, 281, 294, 301, 310, 314, 321, 330, 333, 385, 387, 396
siccella (Zeller, 1839) – törpe zöldmoly – 1, 35, 231, 294, 330, 385

podoliensis Rebel, 1938 – lengyel zöldmoly – 149, 280, 294, 301, 385

***Parascythris* Hannemann, 1960**

muelleri (Mann, 1871) – kétpettyes zöldmoly – 1, 15, 51, 52, 77, 78, 99, 134, 167, 178, 189, 197, 235, 263, 274, 294, 297, 385, 386, 387, 396, 421

***Episcythris* Amsel, 1939**

triangulella (Ragonot, 1874) – mediterrán zöldmoly – 383

Blastobasidae – Avarevő-molyfélék

***Blastobasis* Zeller, 1855**

phycidella (Zeller, 1839) – közönséges avarevőmoly – 3, 15, 22, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

pannonica Šumpich & Liška, 2011 – pannon avarevőmoly – 306, 385

glandulella (Riley, 1871)*¹⁹⁴ – erdei avarevőmoly – 385

= *huemeri* Sinev, 1994 – 174, 175, 188, 195, 220, 232, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 307, 310, 321, 333, 386, 387, 396

***Hypatopa* Walsingham, 1907**

binotella (Thunberg & Wenner, 1794) – fenyő-avarmoly – 3, 22, 23, 42, 51, 52, 59, 77, 142, 167, 178, 197, 396

inunctella (Zeller, 1839) – barna avarevőmoly – 3, 45, 51, 99, 126, 135, 142, 167, 184, 232, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396

segnella (Zeller, 1873) – hegyi avarmoly – 261, 294, 385, 386, 396

***Tecmerium* Walsingham, 1908**

perplexus (Gozmány, 1957) – magyar avarevőmoly – 3, 9, 280, 333, 371, 385, 396

Stathmopodidae – Termésmolyfélék

***Stathmopoda* Herrich-Schäffer, 1853**

pedella (Linnaeus, 1761) – égertermésmoly – 1, 36, 51, 52, 77, 126, 142, 167, 178, 184, 189, 235, 396

Momphidae – Lándzásszárnyú-molyfélék

***Mompha* Hübner, 1825**

conturbatella (Hübner, [1819])*¹⁹⁵ – riadt lándzsás moly – 206, 224

ochraceella (Curtis, 1839) – okkerszínű lándzsás moly – 3, 15, 31, 35, 36, 52, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 167, 178, 183, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 274, 294, 297, 301, 321, 385, 387, 396

lacteella (Stephens, 1834) – füzikelakó lándzsás moly – 13, 15, 26, 119

propinquella (Stainton, 1851) – füzikeaknázó lándzsás moly – 3, 35, 52, 77, 178, 184, 235, 280, 294, 297, 385, 396

divisella Herrich-Schäffer, [1854] – füzikefűró lándzsás moly – 167, 178, 194, 280, 297, 321, 386, 396
= *decorella* (Stephens, 1834) nom. praec. – 3, [13], 35, 51, 52

bradleyi Riedl, 1965 – angol lándzsás moly – 26, 178, 280, 321, 396

confusella Koster & Sinev, 1996*¹⁹⁶ – bükki lándzsás moly – 145, 206, 231, 248

subbistrigella (Haworth, 1828) – kétsávós lándzsás moly – 119, 177, 189, 296, 297, 301, 330, 386, 396

sturnipennella (Treitschke, 1833)*¹⁹⁷ – derécemag-lándzsás moly – 178
= *nodicolella* Fuchs, 1902 – 3, 35

epilobiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – agyagsárga lándzsás moly – 99, 119, 135, 152, 167, 178, 184, 260, 274, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *fulvescens* (Haworth, 1828) – 3, 13, 15, 31, 35, 51, 78

langiella (Hübner, [1796]) – fekete lándzsás moly – 167, 396

= *epilobiella* Römer, 1794 nom. praec. – 3, 35

idaei (Zeller, 1839) – derécerágó lándzsás moly – 3, 15, 52, 77, 78, 119

- miscella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – napvirágfűró lándzsászmoly – 3, 14, 22, 35, 36, 49, 52, 53, 77, 78, 99, 134, 142, 167, 189, 232, 235, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 396
locupletella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – deréceaknázó lándzsászmoly – 167, 178
 = *schrunkella* (Hübner, 1805) – 5, 26, 52
terminella (Humphreys & Westwood, 1845) – varázslófű-lándzsászmoly – 20, 26, 35, 39, 51, 386, 396
raschkiella (Zeller, 1839) – derécefűró lándzsászmoly – 20, 26, 32, 35

Pterolonchidae – Rétimolyfélék

***Pterolonche* Zeller, 1847**

- inspersa* Staudinger, 1859 – barna rétimoly – 1, 23, 51, 52, 126, 134, 167, 177, 184, 189, 197, 221, 232, 260, 294, 310, 321, 333, 385, 386, 396

Lypusidae – Erdei-díszmolyfélék

Lypusinae

***Lypusa* Zeller, 1852**

- tokari* Elsner, Liška & Petrů, 2008*¹⁹⁸ – Tokár mórlepkéje – 241, 244, 254, 261, 294, 301, 385
 [maurella auct., erroneous – 6, 36, 51, 52, 59, 99, 134, 135, 167, 177, 178, 184, 188, 189, 195, 197, 232, 235, 254, 260, 263, 297, 321, 333, 387, 396]

***Agnoea* Walsingham, 1907 (= *Pseudatemelia* Rebel, 1910)**

- flavifrontella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – avarlakó díszmoly – 3, 13, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 53, 59, 78, 119, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 260, 280, 294, 310, 321, 385, 386, 396
subochreella (Doubleday, 1859) – nyírlakó díszmoly – 178, 220, 330, 396
 = *Borkhausenia* (*Tubuliferola*) *panzerella* sensu auct., nec. Fabricius, 1794 – 3, 5
josephinae (Toll, 1956) – lengyel díszmoly – 3, 15, 22, 36, 45, 52, 78, 119, 134, 135, 167, 178, 184, 189, 197, 232, 235, 280, 294, 297, 385, 386, 396
elsae (Svensson, 1982) – melegkedvelő díszmoly – 225, 226, 294, 385

***Amphisbatis* Zeller, 1870**

- incongruella* (Stainton, 1849)*¹⁹⁹ – lándzsásszárnyú díszmoly – 3

Chimabachinae

***Diurnea* Haworth, 1811**

- fagella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke tavaszimoly – 3, 13, 15, 22, 23, 24, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 197, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
lipsiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – télímoly – 142, 167, 174, 177, 178, 189, 194, 197, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396
 = *phryganella* (Hübner, 1796) – 3, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 70, 78, 99, 119, 135, 184

***Dasystoma* Curtis, 1833**

- salicella* (Hübner, [1796]) – fűszökvő tavaszimoly – 3, 13, 15, 51, 52, 59, 119, 142, 178, 184, 194, 197, 260, 396

Z y g a e n o i d e a

Limacodidae – Csigalepkéfélék

***Apoda* Haworth, 1809**

limacodes (Hufnagel, 1766) – kagylólepke – 4, 13, 15, 22, 36, 42, 45, 51, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

Heterogenea Knoch, 1783

asella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csigalepke – 4, 13, 15, 22, 36, 45, 51, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 232, 235, 262, 263, 274, 294, 297, 385, 386, 387, 396, 421

Acharia Hübner, 1819

apicalis (Dyar, 1901)*²⁰⁰ – délamerikai csigalepke – 411
[*stimulea* (Clemens, 1860) – 249 misidentification]

Zygaenidae – Csüngőlepkefélék

Procridinae

Theresimima Strand, 1917

ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808) – kormospille – 4, 13, 15, 36, 119, 122, 178, 189, 235, 333, 385, 396

Rhagades Wallengren, 1863

pruni ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kökény-fémlepke – 4, 13, 15, 22, 36, 45, 56, 99, 119, 122, 142, 167, 174, 177, 178, 186, 189, 210, 232, 235, 260, 262, 294, 297, 298, 321, 385, 386, 396

Jordanita Verity, 1946

budensis (Ad. Speyer & Au. Speyer, 1858) – magyar fémlepke – 4, 36, 45, 56, 77, 167, [189], 210, 232, [235], 260, 280, 298, 321, 386, 387, 396

notata (Zeller, 1847) – aranyöld fémlepke – 4, 31, 36, 174, 186, 189, 222, 235, 258, 294, 296, 297, 385, 396

subsolana (Staudinger, 1862) – balkáni fémlepke – 4, 13, 15, 22, 35, 36, 119, 178, 184, 186, 189, 210, 235

fazekasi Efetov, 1998*²⁰¹ – Fazekas fémlepkéje – 158, 186, 189, 235

graeca (Jordan, 1907) – görög fémlepke – 4, 15, 35, 49, 119, 184, 210, 396 – V (5 000 Ft)

chloros (Hübner, [1813]) – ércfényű fémlepke – 4, 13, 15, 22, 34, 35, 36, 119, 178, 182, 186, 189, 210, 235, 294, 295, 301, 363, 385, 387, 396

globulariae (Hübner, [1793]) – nagy fémlepke – 4, 13, 15, 17, 35, 36, 56, 77, 87, 119, 122, 126, 142, 174, 178, 183, 184, 186, 189, 210, 221, 235, 260, 262, 274, 294, 297, 298, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 396

Adscita Retzius, 1783

geryon (Hübner, [1813]) – ritka fémlepke – 4, 35, 36, 119, 174, 178, 189, 210, 235, 294, 298, 301, 385, 396 – V (5 000 Ft)

statices (Linnaeus, 1758) – közönséges fémlepke – 4, 13, 15, 22, 35, 36, 56, 77, 119, 122, 142, 167, 178, 186, 189, 210, 221, 235, 262, 263, 274, 294, 297, 298, 333, 385, 386, 396, 421
= *heuseri* Reichl, 1964 – 15

Zygaeninae

Zygaena Fabricius, 1775

punctum Ochsenheimer, 1808 – pettyes csüngőlepke – 4, 13, 15, 22, 36, 37, 56, 184, 186, 189, 210, [235], 255, 280, 294, 298, 301, 321, 363, 385, 386, 387, 396
= *contamine* Boisduval, 1834 – 119

cynarae (Esper, 1789) – pusztai csüngőlepke – 4, 36, 56, 76, 77, 140, 186, 189, 210, [235], 280, 298, 386, 396, 387, 421

laeta (Hübner, 1790) – vörös csüngőlepke – 4, 56, 77, 184, 186, 189, 210, [235], 298, 301, 363, 387 – V (10 000 Ft)

- brizae* (Esper, 1800) – magyar csüngőlepke – 4, 13, 15, 36, 41, 56, 119, 178, 184, 186, 189, 210, 235, 294, 298, 385, 386, 396
- minos* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – levantei csüngőlepke – 178, 186, 210, 294, 298, 301, 363, 385, 396
 = *diaphana* Staudinger, 1887 – 4, 15, 22, 119, 427
 = *pimpinellae* Guhn, 1931 – 56, 68 – erroneous; name wrongly used
- purpuralis* (Brünnich, 1763) – bíborszínű csüngőlepke – 4, 13, 15, 17, 22, 36, 45, 56, 77, 78, 99, 119, 122, 142, 167, 174, 178, 184, 186, 189, 210, 221, 232, 235, 274, 296, 298, 385, 386, 387, 396
- fausta* (Linnaeus, 1767) – koronafürt-csüngőlepke – 4, 94, 140, 221, 298, 396 – V (10 000 Ft)
- carniolica* (Scopoli, 1763) – fehérgyűrűs csüngőlepke – 4, 13, 15, 17, 22, 28, 34, 36, 53, 56, 77, 99, 119, 122, 125, 167, 177, 178, 184, 186, 189, 210, 221, 232, 235, 262, 274, 280, 294, 296, 298, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- loti* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges csüngőlepke – 56, 61, 77, 87, 119, 122, 126, 125, 142, 167, 178, 184, 186, 189, 210, 221, 235, 263, 274, 294, 298, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 421
 [*achilleae* (Esper, 1780) – 4, 13, 15, 17, 22, 36, 45, 53, 78 – erroneous]
- osterodensis* Reiss, 1921 – ördögyszem-csüngőlepke – 56, 61, 119, 178, 189, 210, 235, 294, 298, 385, 386, 396
 [*scabiosae* auct., nec Scheven, 1777 – 4, 13, 15, 22, 78, 134 – erroneous]
- viciae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – somkóró-csüngőlepke – 56, 87, 119, 122, 167, 178, 186, 189, 210, 235, 262, 274, 294, 298, 385, 386, 396, 421
 = *meliloti* (Esper, 1793) – 4, 13, 15, 22, 36, 78
- ephaltes* (Linnaeus, 1767) – változékony csüngőlepke – 4, 13, 15, 17, 22, 36, 56, 99, 119, 122, 126, 167, 178, 184, 186, 189, 210, 235, 263, 280, 296, 298, 301, 363, 385, 386, 387, 396
- angelicae* Ochsenheimer, 1808 – vérpettyes csüngőlepke – 4, 13, 15, 22, 34, 36, 45, 53, 56, 78, 99, 119, 167, 186, 189, 210, 235, 298, 385, 386, 396
- filipendulae* (Linnaeus, 1758) – acélszínű csüngőlepke – 4, 13, 15, 17, 22, 24, 36, 45, 53, 56, 77, 78, 119, 122, 126, 142, 167, 174, 177, 178, 184, 186, 189, 210, 221, 235, 262, 263, 274, 280, 296, 298, 298, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- lonicerae* (Scheven, 1777) – lonc-csüngőlepke – 4, 13, 15, 22, 36, 56, 87, 119, 122, 178, 186, 189, 210, 235, 274, 294, 298, 333, 385, 386, 396, 421

C o s s o i d e a

Brachodidae – Pusztamolylélek

Brachodes Guenée, 1845

- appendiculata* (Esper, [1783]) – homoki pusztamoly – 6, 13, 15, 23, 51, 52, 77, 119, 122, 184, 294, 301, 385, 387, 396
- pumila* (Ochsenheimer, 1808) – közönséges pusztamoly – 6, 77, 134, 184, 294, 294, 385, 396

Cossidae – Farontólepkefélék

Cossinae

Cossus Fabricius, 1793

- cossus* (Linnaeus, 1758) – fűzfarentólepke – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

Acossus Dyar, 1905

- terebra* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyárfarentólepke – 6, 45, 142, 178, 189, [235], 386, 396

Parahypopta Daniel, 1961

caestrum (Hübner, [1803–1808]) – spárgalepke – 6, 13, 23, 36, 77, 122, 134, 177, 184, 189, 210, [235], 263, 280, 294, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

Paracossulus Schoorl, 1990

thrips (Hübner, [1810–1813]) – sztyepplepke – 6, 37, 119, 210, 331a

Dyspessa Hübner, 1820

ulula (Borkhausen, 1790) – fokhagymalepke – 6, 13, 15, 17, 22, 23, 36, 51, 53, 77, 78, 87, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

Zeuserinae

Zeuzera Latreille, 1804

pyrina (Linnaeus, 1761) – almafarontólepke – 6, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 210, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

Phragmataecia Newmann, 1850

castaneae (Hübner, 1790) – nádfúrólepke – 6, 17, 22, 23, 36, 42, 51, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 210, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 294, 296, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

Castniidae – Pálmarontó lepkefélék

Castniinae – Gazerini

Paysandisia Houlbert, 1912

archon (Burmeister, 1880) – pálmarontólepke – E – 433

Sesiidae – Szitkár-félék (üvegszárnyú-lepkék)*²⁰²

Tinithiinae

Microsphecia Bartel, 1912

broisiformis (Hübner, [1813])*²⁰³ – folyófűszitkár – [1], 103, 189, 213, 370, 396

[*tineiformis* subsp. *broisiformis* (Hübner, [1813]) – 1, – erroneous]

[*tineiformis* (Esper, 1783) – 5, 36, 188, 195 – erroneous]

Pennisetia Dehne, 1850

hylaeiformis (Laspeyres, 1801) – málnagubacs-szitkár – 1, 35, 53, 103, 167, 203, 370

Sesiinae

Sesia Fabricius, 1775

apiformis (Clerck, 1759) – darázslepke – 1, 15, 22, 23, 36, 51, 77, 99, 103, 119, 122, 167, 178, 189, 203, 210, 213, 294, 363, 370, 381, 385, 386, 396

melanocephala Dalman, 1816*²⁰⁴ – rezgőnyárszitkár – 83, 103, 231, 370

Paranthrene Hübner, 1819

tabaniformis (Rottemburg, 1775) – bögölyszitkár – 1, 13, 15, 23, 35, 36, 51, 77, 103, 119, 122, 178, 189, 203, 210, 213, 280, 294, 296, 301, 363, 370, 381, 385, 396

insolita polonica Schnaider, 1939 – tölgyfa-bögölyszitkár – 213, 370

= *insolitus* Le Cerf, 1914, auct. – 193, 396

Thamnosphecia Spuler, 1910

culiciformis (Linnaeus, 1758) – szúnyogszitkár – 1, 15, 119, 178, 189, 203, 210, 213, 370, 386, 443a

Synanthedon Hübner, 1819

scoliaeformis (Borkhausen, 1789) – nyírfaszitkár – 245, 370

mesiaeformis (Herrich-Schäffer, [1846]) – mézgáséger-szitkár – 1, 103, 178, 213, 250, 370

- spheciformis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – égerfaszitkár – 1, 45, 103, 167, 178, 203, 210, 213, 370, 386, 387, 396
- stomoxiformis* (Hübner, 1790) – naspolyaszitkár – 1, 36, 103, 178, 189, 203, 213, 370, 381, 385
- formicaeformis* (Esper, [1783]) – hangyaszitkár – 1, 13, 15, 36, 103, 119, 178, 189, 203, 213, 370, 387
- flaviventris* (Staudinger, 1883)*²⁰⁵ – sárgahasú szitkár – 195, 370, 372,
- andrenaeformis* (Laspeyres, 1801) – bangitaszitkár – 1, 36, 103, 189, 213, 370, 396
- melliniformis* (Laspeyres, 1801) – déli szitkár – 83, 103, 363, 370
- myopaeformis* (Borkhausen, 1789) – almafaszitkár – 1, 15, 23, 36, 51, 103, 119, 126, 167, 178, 184, 189, 203, 213, 263, 294, 296, 301, 333, 363, 370, 381, 385, 386, 396, 421
- vespiformis* (Linnaeus, 1761) – darázsszitkár (szederszitkár) – 1, 13, 15, 23, 36, 51, 103, 119, 178, 189, 203, 210, 213, 280, 294, 370, 385, 386, 396
- conopiformis* (Esper, [1782]) – tölgyfaszitkár – 1, 36, 103, 178, 184, 189, 203, 213, 370
- tipuliformis* (Cleck, 1759) – ribizkeszitkár – 1, 13, 15, 35, 36, 51, 103, 119, 126, 135, 167, 178, 184, 189, 203, 210, 213, 232, 296, 301, 321, 333, 363, 370, 381, 371, 385, 386, 396, 421
- spuleri* (Fuchs, 1908) – Spuler szitkára – 83, 103, 178, 189, 203, 213, 370, 396
- loranthi* (Králíček, 1966) – fakínszitkár – 83, 103, 178, 189, 203, 213, 235, 370, 381, 385, 396
- Bembecia** Hübner, 1819
- ichneumoniformis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fürkész-szitkár – 1, 13, 15, 103, 178, 189, 203, 213, 235, 294, 301, 370, 381, 385, 396, 421
- albanensis* (Rebel, 1918) – albán szitkár – 83, 103, 203, 213, 370, 396
- scopigera* (Scopoli, 1763) – baltacimszitkár (zanótszitkár) – 36, 51, 77, 103, 119, 122, 178, 189, 203, 213, 235, 370, 396
- iberica* Spatenka, 1992 – ibériai szitkár – 434
- megillaeformis* (Hübner, [1813]) – rekettyeszitkár – 1, 13, 15, 103, 119, [203], 370
- puella* Laštůvka, 1989 – csüdfűszitkár – 103, [203], 370
- uroceriformis* (Treitschke, 1834) – dárdahereszitkár – 1, 103, 178, 189, 213, 235, 310, 370
- Pyropteron** Newman, 1832
- triannuliforme* (Freyer, 1845) – sóskaaszitkár – 1, 13, 15, 35, 36, 53, 77, 103, 119, 142, 167, 178, 189, 203, 213, 280, 294, 370, 385, 396
- muscaeforme* (Esper, [1783]) – istágyökérszitkár (homoki szitkár) – 1, [13], 36, 103, 189, [203], 213, [235], 370, 381, 385
- affinis* (Staudinger, 1856) – napvirágszitkár – 103, 213, 370, 381, 385 – V (5 000 Ft)
[affine auct. – 1, 5, 189, 294, 363]
- Chamaesphacia** Spuler, 1910
- anatolica* Schwingenschuss, 1938*²⁰⁶ – török szitkár – 195, 370
- chalciformis* (Esper, [1804]) – vörös szitkár – 103, 370, 386
= *chalcidiformis* (Hübner, 1806) – 1
- doleriformis* (Herrich-Schäffer, [1846]) – délvidéki szitkár – 370, 381 – V (5 000 Ft)
= *colpiformis* (Staudinger, 1856) – 1, 83, 103
- dumonti* Le Cerf, 1922 – Dumont szitkára – 370, 396
= *similis* Laštůvka, 1983 – 83, 103
- annellata* (Zeller, 1847) – gyűrűs szitkár – 1, 13, 15, 36, 77, 103, 119, 178, 184, 189, 203, 213, 235, 301, 370, 381, 386, 396
- masariformis* (Ochsenheimer, 1808)*²⁰⁷ – ökörfarkkóró-szitkár – 1, 77, 103, 370
- nigrifrons* (Le Cerf, 1911) – orbáncfűszitkár (középhegységi szitkár) – 203, 213, 294, 370, 385, 396
= *sevenari* Liphay, 1961 – 26, 51, 103, 178, 213
- bibioniformis* (Esper, 1800) – bársony szitkár – 1, 36, 51, 77, 103, 189, 203, 213, 235, 363, 370, 385, 387, 396
- palustris* Kautz, 1927 – mocsári szitkár – 1, 103, 210, 301, 370, 381 – V (5 000 Ft)
- euceraeformis* (Ochsenheimer, 1816) – kutyatejszitkár – 103, 178, 189, 203, 210, 213, 235, 370, 396

- = *stelidiformis* (Freyer, 1836) – 1, 36, 51
crassicornis Bartel, 1912*²⁰⁸ – tülkös szitkár – 103, 370, 381
leucopsiformis (Esper, 1800) – buckajáró szitkár – 1, 77, 103, 178, 189, 203, 213, [235], 263, 294, 363, 370, 385
hungarica (Tomala, 1901) – magyar szitkár – 1, 103, 210, 213, 235, 294, 370, 381, 385, 396 – V (5 000 Ft)
empiformis (Esper, [1783]) – farkaskutyatej-szitkár – 1, 15, 23, 34, 36, 51, 53, 77, 78, 103, 122, 167, 174, 178, 189, 203, 213, 231, 235, 263, 294, 301, 310, 333, 363, 370, 381, 385, 386, 396
tenthrediniformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – légyszitkár – 83, 103, 119, 178, 203, 210, 213, 231, 280, 370, 385, 386, 387, 396
astatiformis (Herrich-Schäffer, [1846]) – farkasfütej-szitkár – 1, 77, 103, 178, 203, 210, 213, 370, 381, 387

Thyridoidea

Thyrididae – Ablakosmolyfélék

Thyris Laspeyres, 1803

- fenestrella* (Scopoli, 1763) – gyakori ablakosmoly – 6, 13, 15, 17, 23, 36, 51, 53, 65, 115, 119, 122, 126, 167, 178, 184, 189, 211, 232, 235, 262, 263, 274, 280, 294, 333, 385, 396

Pyraloidea

Pyralidae – Fényiloncák

Galleriinae

Achroia Hübner, 1819

- grisella* (Fabricius, 1794) – kis viaszmosoly – 4, 13, 15, 51, 52, 77, 119, 122, 142, 294, 301, 310, 333, 385, 396

Galleria Fabricius, 1798

- mellonella* (Linnaeus, 1758) – nagy viaszmosoly – 4, 13, 15, 17, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 243, 263, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Aphomia Hübner, 1825

- gularis* (Zeller, 1877) – raktármoly – 4, 221, 294, 396
sociella (Linnaeus, 1758) – méhviaszmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 77, 78, 99, 119, 122, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 235, 263, 274, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
foedella (Zeller, 1839) – déli koldusmoly – 4, 52, 178, 230, 385

Lamoria Walker, 1863

- zelleri* De Joannis, 1932 – koldusmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
anella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – törmelékmosoly – 4, 17, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 122, 134, 142, 152, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Pyralinae

Hypotia Zeller, 1847

- massialis* (Duponchel, 1832) – cifra fényilonca – 4, 77, 230, 301, 387 – V (5 000 Ft)

Synaphe Hübner, 1825

moldavica (Esper, 1794) – moldovai fényilonca – 4, 13, 15, 22, 23, 52, 77, 180, 184, 211, 294, 301, 385, 386, 387

bombycalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sziki fényilonca – 4, 13, 15, 23, 36, 45, 51, 52, 184, 189, 235, 386, 396

antennalis (Fabricius, 1794)*²⁰⁹ – nagy fényilonca – 74
= *connectalis* (Hübner, 1796) – 4, 5

punctalis (Fabricius, 1775) – hosszúlábú fényilonca – 77, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *angustalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 78

***Pyralis* Linnaeus, 1758**

regalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pompás fényilonca – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

farinalis Linnaeus, 1758 – lisztilonca – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

perversalis (Herrich-Schäffer, [1849]) – pusztai fényilonca – 4, 15, 51, 119, 134, 167, 184, 211, 221, 232, 263, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Aglossa* Latreille, 1796**

signicostalis Staudinger, 1871 – hangyailonca – 4, 51, 52, 59, 122, 178, 184, 230, 294, 385, 396

pinguinalis (Linnaeus, 1758) – zsiradékmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 221, 235, 260, 294, 296, 330, 333, 385, 386, 396

caprealis (Hübner, [1809]) – kis zsiradékmoly – 4, 184, 310, 392

***Stemmatophora* Guenée, 1854**

brunnealis (Treitschke, 1829) – barna fényilonca – 4, 17, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396

honestalis (Treitschke, 1829) – karsztlakó fényilonca – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 78, 99, 119, 134, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 296, 310, 321, 333, 385, 386, 396

***Hypsopygia* Hübner, 1825**

costalis (Fabricius, 1775) – szénailonca – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

incarnatalis (Zeller, 1847) – piros fényilonca – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 77, 119, 126, 167, 178, [180], 184, 189, 235, 260, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

rubidalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörös fényilonca – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 134, 135, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

glaucinalis (Linnaeus, 1758) – rezes fényilonca – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

***Endotricha* Zeller, 1847**

flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tűzesszárnyú fényilonca – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

Phycitinae*²¹⁰

***Cryptoblabes* Zeller, 1848**

- bistriga* (Haworth, [1811]) – égerlápi karcsúmoly – 4, 45, 51, 70, 77, 134, 142, 167, 178, 181, 184, 274, 294, 297, 301, 385, 386, 387, 396
- Trachonitis** Zeller, 1848
- cristella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bokorrágó karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- Salebriopsis** Hannemann, 1965
- albicilla* (Herrich-Schäffer, [1849]) – füzefonó karcsúmoly – 4, 22, 45, 51, 59, 78, 99, 142, 152, 167, 178, [180], 181, 189, 301, 321, 386, 387, 396
- Elegia** Ragonot, 1887
- atrifasciella* Ragonot, 1825 – füstös karcsúmoly – 46, 51, 280, 385
= *fallax* Staudinger, 1881 auct. – 52, 59, 99, 178, 181, 184, 396 – name wrongly used
- similella* (Zincken, 1818) – tölgyjáró karcsúmoly – 4, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 77, 78, 87, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 211, 235, 262, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- Ortholepis** Ragonot, 1887
- betulae* (Goeze, 1778) – nyírfa-karcsúmoly – 4, 15, 23, 36, 45, 51, 59, 119, 142, 178, 181, 184, 189, 220, 235, 294, 297, 301, 385, 386, 396
- Pyla** Grote, 1882 (= *Matilella* Leraut, 2001)
- fusca* (Haworth, [1811]) – barnásfekete karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 36, 45, 51, 119, 126, 142, 181, 184, 189, 235, 260, 262, 297, 386, 396
- Uncinus** Amsel, 1951 (= *Moitrelia* Leraut, 2001)
- obductella* (Zeller, 1839) – mentaszövő karcsúmoly – 4, 15, 22, 45, 126, 167, 180, 280, 386, 396
- Delpanqueia** Leraut, 2001
- dilutella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kakukkfű-karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396
= *subornatella* Duponchel, 1837 – 4, 22, 23, 51, 52, 53
- inscriptella* (Duponchel, [1837] 1836) – vörhenyes kakukkfű-karcsúmoly – 369, 385, 396
- Pempeliella** Caradja, 1916
- ornatella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – díszes karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- bulgarica* Slamka & Plant, 2016*²¹¹ – zsákszövő karcsúmoly – 365
[*sororiella* (Zeller, 1839) – sensu Gozmány, 1963 – 4, name wrongly used]
- Catastia** Hübner, 1825
- marginata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fekete karcsúmoly – 4, 13, 15, 36, 52, 119, 178, [180], 181, 189, [235], 386, 396
- Cnephidia** Ragonot, 1893 (= *Insalebria* Filipjev, 1924)
- serraticornella* (Zeller, 1839) – dalmát karcsúmoly – 4, 77, 178, 211, 301
= *gregella* Eversmann, 1844 – 4, 23, 31, 52, 184
- Sciota** Hulst, 1888
- fumella* (Eversmann, 1844) – hideglápi karcsúmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 51, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 396
- rhenella* (Zincken, 1818) – alföldi karcsúmoly – 4, 22, 31, 36, 51, 52, 77, 122, 126, 142, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 260, 263, 274, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 387, 396
- hostilis* (Stephens, 1834) – lápi karcsúmoly – 4, 22, 45, 51, 52, 77, 78, 142, 180, 181, 220, 274, 297, [301], 386, 387, 396

adelphella (Fischer von Röslerstamm, 1836) – pirosszárnýtövű karcsúmoly (csíkos karcsúmoly) – 4, 15, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 181, 183, 184, 189, 211, 232, 235, 243, 274, 294, 301, 385, 387, 396

Selagia Hübner, 1825

argyrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstös karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396

spadicella (Hübner, [1796]) – kékfényű karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 180, 181, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396

Pima Hulst, 1888

boisduvaliella (Guenée, 1845)*²¹² – ezüstszegegyű karcsúmoly – 4, 77

Etiella Zeller, 1839

zinckenella (Treitschke, 1832) – akácmoly – 4, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Oncocera Stephens, 1829

semirubella (Scopoli, 1763) – lucernamoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Laodamia Ragonot, 1888

faecella (Zeller, 1839) – keresztsávós karcsúmoly – 4, 15, 36, 51, 52, 59, 77, 119, 134, 142, 177, 178, 181, 189, 211, 263, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

Rhodophaea Guenée, 1845

formosa (Haworth, [1811]) – ékes karcsúmoly – 4, 22, 23, 36, 51, 52, 77, 87, 122, 126, 134, 142, 177, 178, [180], 181, 184, 189, 211, 232, 235, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

Pempelia Hübner, 1825

palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas karcsúmoly – 4, 15, 17, 23, 36, 51, 52, 53, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 178, 181, 189, 235, 294, 310, 321, 385, 396

albariella Zeller, 1839 – csüdfü-karcsúmoly – 4, 280

compositella (Treitschke, 1835)*²¹³ – ürömlével-karcsúmoly – 4, 17, 22, 36, 51, 52, 77, 99, 122, 134, 167, 177, 178, 181, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 263, 294, 301, 310, 321, 385, 387, 396

Psorosa Zeller, 1846

dahliella (Treitschke, 1832) – sárgacsíkos karcsúmoly – 4, 13, 15, 31, 36, 51, 52, 177, 178, 181, 184, 189, 211, 232, 235, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396

Dioryctria Zeller, 1846

abietella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fenyőrágó karcsúmoly – 4, 15, 17, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

simplicella Heinemann, 1865 – fenyőszövő karcsúmoly – 177, 178, 180, 181, 189, 211, 232, 235, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

= *mutatella* Fuchs, 1903 – 4, 36, 51, 59, 77, 78, 99, 134, 142, 152, 167, 184

schuetzeella Fuchs, 1899 – lucfenyő-karcsúmoly – 101, 114, 142, 396

sylvestrella (Ratzeburg, 1840) – tobozrágó karcsúmoly – 77, 99, 119, 134, 142, 167, 178, 181, 184, 189, 211, 235, 263, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396

= *splendidella* Herrich-Schäffer, 1847 – 4, 13, 15, 36, 51, 52, 59

Phycita Curtis, 1828

meliella (Mann, 1864) – görög karcsúmoly – 4, 51, 160, 177, 189, 232, 280, 294, 310, 321, 333, 385, 396

roborella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyészövő karcsúmoly – 77, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *spissicella* Fabricius, 1777 – 4, 17, 22, 23, 24, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78

torrenti Agenjo, 1962*²¹⁴ – spanyol karcsúmoly – 332, 364, 355, 385, 396

[*metzneri* Zeller, 1846 – sensu Gozmány, 1963 – vonalkás karcsúmoly – 4, 5, 294, 364]

***Hypochalcia* Hübner, 1825**

dignella (Hübner, 1796) – sárgafoltos karcsúmoly – 4, 31, 51, 77, 119, 167, 396

decorella (Hübner, [1810]) – barna karcsúmoly – 4, 13, 15, 51, 53, 119, 134, 184, 232, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 385, 396

lignella (Hübner, [1796]) – vörhenyes karcsúmoly – 4, 51, 77, 126, 396

ahenella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – óriás karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

= *rubiginella* (Treitschke, 1832) – 4

propinquella (Guenée, 1845)*²¹⁵ – okkerbarna karcsúmoly – 224, 396

[*bruandella* (Guenée, 1845) – 160, 184]

[*propinquella* subsp. *bruandella* (Guenée, 1845) – 188, 195, 224]

= *affiniella* Zeller, 1848 – 4

***Epischnia* Hübner, 1825**

prodromella (Hübner, [1799]) – imolarágó karcsúmoly – 4, 15, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 119, 134, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 235, 260, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396

***Nephopterix* Hübner, 1825**

angustella (Hübner, [1796]) – kecskerágó-karcsúmoly – 4, 14, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 122, 134, 142, 152, 167, 177, 181, 184, 189, 211, 232, 235, 263, 274, 280, 296, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Acrobasis* Zeller, 1839**

tumidana ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bordás karcsúmoly – 4, 15, 17, 22, 23, 24, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

repandana (Fabricius, 1798) – tarkamintás karcsúmoly – 77, 119, 122, 134, 135, 142, 152, 167, 177, 181, 184, 189, 211, 235, 260, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *tumidella* (Zincken, 1818) – 4, 15, 36, 45, 51

= *zelleri* Ragonot, 1885 – 13

advenella (Zincken, 1818) – gerleszínű karcsúmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 70, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 135, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 235, 243, 260, 262, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

suavella (Zincken, 1818) – karszterdei karcsúmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 53, 59, 99, 119, 122, 126, 142, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 396

legatea (Haworth, [1811]) – bengerágó karcsúmoly – 119, 167, 178, 189, 211, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396

= *legatella* sensu Hübner, 1796, nec ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 4, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 70, 77, 122, 126, 134, 180, 181, 184

dulcella (Zeller, 1848) – kökényszövő karcsúmoly – 4, 15, 31, 51, 52, 77, 122, 177, 178, 181, 184, 189, 211, 280, 310, 333, 396

marmorea (Haworth, [1811]) – márványos karcsúmoly – 4, 15, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

sodalella Zeller, 1848 – tölgyfonó karcsúmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 78, 119, 122, 134, 142, 167, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 232, 235, 294, 296, 297, 321, 385, 386, 396

consociella (Hübner, [1813]) – szalagos karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 24, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 134, 135, 142, 152, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

fallowella (Ragonot, 1871)*²¹⁶ – hamvasfoltú karcsúmoly – 4, 15, 36, 51, 59, 77, 78, 99, 119, 134, 183, 184

- [*glaucella* Staudinger, 1859 auct., – 142, 167, 177, 178, [180], 181, 189, 211, 232, 235, 280, 294, 297, 301, 321, 330, 333, 385, 386, 396 name wrongly used]
- obtusella* (Hübner, [1796]) – körtelevélfonó karcsúmoly – 4, 13, 15, 22, 36, 51, 52, 59, 78, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- Apomyelois*** Heinrich, 1956 (= *Ectomyelois* Heinrich, 1956)
- bistriatella* (Hulst, 1887)*²¹⁷ – nyírfalakó karcsúmoly – 146, 294, 301, 321, 385, 386, 396
= *neophanes* Durrant, 1915 – 146, 294, 301, 321
- ceratoniae* (Zeller, 1839)*²¹⁸ – indiai aszálványmoly – 4 – An; Szn
- Glyptoteles*** Zeller, 1848
- leucacrinella* Zeller, 1848 – turjáni karcsúmoly – 4, 31, 35, 36, 62, 70, 134, 142, 167, 177, 178, 181, 184, 189, 211, 235, 260, 294, 297, 301, 385, 386, 396
- Episcythrastis*** Meyrick, 1937
- tetricella* ([Denis & Schifferrmüller], 1775) – tavaszi karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- Eurhodope*** Hübner, 1825
- rosella* (Scopoli, 1763) – rózsaszínű karcsúmoly – 4, 15, 17, 22, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 152, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- cirriggerella* (Zincken, 1818) – zörgöszárnú karcsúmoly – 104, 167, 330
- Myelois*** Hübner, 1825
- circumvoluta* (Fourcroy, 1785) – pettyes karcsúmoly – 126, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
= *cribrella* [*cribrumella* auct.] Hübner, 1796 – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 68, 77, 78, 99, 119, 122, 134, 183, 184
- Pterothrixidia*** Amsel, 1954
- rufella* (Duponchel, 1836) – vörös karcsúmoly – 4, 23, 52, 62, 134, 167, 263, 294, 321, 385, 396
= *impurella* (Duponchel, 1836) – 4
- Asalebria*** Amsel, 1953
- geminella* (Eversmann, 1844)*²¹⁹ – cifra karcsúmoly – 4, 300
- Isauria*** Ragonot, 1887
- dilucidella* (Duponchel, 1836) – sziki karcsúmoly – 77, 119, 126, 134, 178, 181, 184, 189, 211, 232, 235, 260, 263, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 387, 396
= *ilignella* (Zeller, 1839) – 4, 13, 15, 23, 31, 51, 52
- Eucarphia*** Hübner, 1825
- vinetella* (Fabricius, 1787) – pontusi karcsúmoly – 4, [13, 15], 51, 77, 387, 396
- Pogonotrophus*** Sauber, 1899 (= *Hyporatas* Rebel, 1901)
- allotriella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – vaksziki karcsúmoly – 4, 77, 184, 301, 316
- Gymnancyla*** Zeller, 1848
- canella* ([Denis & Schifferrmüller], 1775) – homoki karcsúmoly – 4, 23, 31, 36, 77, 126, 181, 184, 189, 220, 235, 301, 333, 387, 396
- hornigii* (Lederer, 1852) – magrágó karcsúmoly – 4, 13, 15, 23, 31, 34, 36, 51, 52, 119, 122, 126, 181, 183, 184, 189, 211, 232, 235, 274, 294, 301, 310, 321, 385, 387, 396
- Eccopisa*** Zeller, 1848
- effractella* Zeller, 1848 – körtelevél-karcsúmoly – 4, 22, 45, 51, 52, 70, 77, 78, 99, 126, 142, 167, 180, 181, 184, 220, 296, 297, 301, 386, 396
- Assara*** Walker, 1863
- terebrella* (Zincken, 1818) – toboztlakó karcsúmoly – 4, 15, 22, 36, 78, 119, 142, 152, 167, 178, 180, 181, 189, 211, 235, 260, 274, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 396
- Euzophera*** Zeller, 1867

- pinguis* (Haworth, [1811]) – kőrislakó karcsúmoly – 4, 36, 51, 70, 77, 78, 142, 152, 167, 178, 180, 181, 189, 194, 211, 232, 235, 260, 263, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
- bigella* (Zeller, 1848) – kétszikos karcsúmoly – 4, 13, 15, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 181, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
= *egeriella* Milliére, 1869 – 71, 160, 184
- cinerosella* (Zeller, 1839) – ürömfűró karcsúmoly – 4, 51, 52, 152, 167, 178, 182, 181, 184, 232, 260, 294, 301, 321, 333, 385, 396
- fuliginosella* (Heinemann, 1865) – kormostövű karcsúmoly – 4, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 119, 122, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 235, 263, 274, 294, 296, 301, 385, 386, 396
- Euzopherodes** Hampson, 1899
- charlottae* (Rebel, 1914) – magyar karcsúmoly – 4, 23, 36, 45, 51, 52, 119, 134, 135, 142, 167, 178, 184, 189, 211, 235, 280, 294, 310, 321, 385, 386, 396
- vapidella* (Mann, 1857)*²²⁰ – apró gyümölcsmoly – 4, 160, 181, 189, 235
- Nyctegretis** Zeller, 1848
- lineana* (Scopoli, 1786) – agátszínű karcsúmoly – 126, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
= *achatinella* (Hübner, [1824]) – 4, 13, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 134, 183, 184
- triangulella* Ragonot, 1901 – háromszöges karcsúmoly – 4, 36, 51, 52, 59, 78, 99, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396
= *impossibilella* Roesler, 1969 – 126
- Ancylosis** Zeller, 1839
- cinnamomella* (Duponchel, 1836) – fahéjszínű karcsúmoly – 4, 17, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 122, 134, 167, 177, 178, 181, 184, 189, 211, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 387, 396
- sareptella* (Herrich-Schäffer, 1861) – sztyeppmoly – 4, 77, 211, 301, 387
- roscidella* (Eversmann, 1844) – dolomitlakó karcsúmoly – 179, 181, 189, 235
- albidella* Ragonot, 1888 – balkáni karcsúmoly – 146
- oblitella* (Zeller, 1848) – hamuszürke karcsúmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 51, 52, 77, 119, 126, 178, 180, 181, 183, 184, 211, 221, 294, 296, 301, 307, 333, 385, 387, 396
- deserticola* (Staudinger, 1870)*²²¹ – sivatagi karcsúmoly – 4, 77, 387
[*eremita* Gozmány, 1951 – 4 erroneous]
- Homoeosoma** Curtis, 1833
- sinuella* (Fabricius, 1794) – agyagsárga karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- inustella* Ragonot, 1884 – ázsiai karcsúmoly – 23, 77, 122, 189, 211, 294, 385, 396
- nebulella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – napraforgómoly – 4, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
- nimbella* (Duponchel, 1837) – apró karcsúmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 232, 235, 260, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
= *subalbatella* (Mann, 1864) – 4, 13, 15, 77, 119, 126, 142, 167, 211, 232, 280, 310, 321, 386, 387, 396
- kasyellum* Roesler, 1965)*²²² – pannon karcsúmoly – 5, 14a, 77
- Phycitodes** Hampson, 1917
- maritima* (Tengström, 1848) – aggófű-karcsúmoly – 181, 189, 235, 387
= *carlinella* (Heinemann, 1865) – 36, 74, 77
= *cretacellus* (Rössler, 1866) – 4
- binaevella* (Hübner, [1813]) – bogáncslakó karcsúmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 70, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

lacteella (Rothschild, 1915) – kisázsiai karcsúmoly – 181, 189, 235, 301

= *bentinckella delattini* Roesler, 1965 – 5, 36

inquinatella (Ragonot, 1887) – mediterrán karcsúmoly – 122, 144, 274, 386, 387, 396

saxicola (Vaughan, 1870) – délvidéki karcsúmoly – 294, 385

albatella (Ragonot, 1887) – csenevész karcsúmoly – 235, 274, 294, 385

= *albatella pseudonimbella* (Bentinck, 1937) – 77, 160, 180, 181, 189, 211

Vitula Ragonot, 1887

biviella (Zeller, 1848) – fenyővirág-karcsúmoly – 4, 51, 52, 77, 142, 167, 184, 211, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 396

Plodia Guenée, 1845

interpunctella (Hübner, [1813]) – aszalványmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 24, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 122, 126, 142, 167, 178, 180, 181, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 396

Ephestia Guenée, 1845

kuehniella Zeller, 1879 – lisztmoly – Szn – 4, 13, 14, 15, 51, 52, 119, 122, 126, 134, 167, 181, 280, 294, 296, 310, 321, 385, 396

welseriella (Zeller, 1848) – levantei karcsúmoly – 4, 51, 184, 294, 385, 396

elutella (Hübner, [1796]) – készletmoly – 4, 13, 14, 15, 22, 23, 36, 51, 52, 53, 77, 119, 122, 126, 142, 178, 180, 181, 184, 189, 211, 235, 260, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

woodiella Richards & Thomson, 1932*²²³ – szőlőrágó karcsúmoly – 224, 330

[*unicolorella* Staudinger, 1881 auct. nec – 235, 294, 301, 385]

= *parasitella* auct., nec Staudinger, 1859 – 5, 23, 77, 181, 189, 211, 396

Cadra Walker, 1864

furcatella (Herrich-Schäffer, [1849]) – trópusi gyümölcsmoly – 5, 45, 51, 77, 99, 122, 126, 167, 180, 181, 184, 189, 211, 232, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

= *afflatella* (Mann, 1855) – 4, 11, 22, 51

figulilella (Gregson, 1871) – kis gyümölcsmoly – Szn – 101, 114, 386

cautella (Walker, 1863) – déligyümölcs-karcsúmoly – Szn – 4, 24, 211, 296, 396

Anerastia Hübner, 1825

lotella (Hübner, [1813]) – gabonarágó karcsúmoly – 4, 31, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 126, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 211, 221, 243, 263, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *dubia* Gerasimov, 1929*²²⁴ – homokifű-karcsúmoly – 4, 77, 152, 211, 294, 301, 385 – incorrectly used name

Hypsotropa Zeller, 1848

unipunctella Ragonot, 1888 – sztyeppréti karcsúmoly – 46, 88, 99, 177, 181, 184, 189, 211, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

Ematheudes Zeller, 1867

punctella (Treitschke, 1833) – kúposfejű karcsúmoly – 4, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

Crambidae – Fűgyökérrágó molyfélék

Scopariinae

Scoparia Haworth, 1811

pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas mohailonca – 77, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 178, 180, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *arundinata* (Thunberg, 1792) – 31, 36, 45, 51, 53, 59, 78

= *dubitalis* (Hübner, 1796) – 4, 13, 15, 17, 22, 23

conicella (La Harpe, 1863)*²²⁵ – szürkés mohailonca – 163, 180, 211

ingratella (Zeller, 1846) – keleti mohailonca – 4, 15, 22, 36, 74, 119, 180, 189, 211, 235, 274, 386

ancipitella (La Harpe, 1855) – apró mohailonca – 142, 167, 177, 180, 194, 232, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 396

= *ulmella* Knaggs, 1867 – 4, 15, 22, 45, 51, 78, 99, 119, 134, 135

ambigualis (Treitschke, 1829) – barnás mohailonca – 4, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 78, 119, 142, 180, 184, 189, 235, 243, 274, 386, 396

subfusca Haworth, [1811] – nagy mohailonca – 77, 119, 122, 126, 134, 167, 178, 180, 184, 189, 211, 235, 262, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 333, 385, 386, 396

= *cembrae* (Haworth, [1811]) – 4, 15, 17, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 78

basistrigalis Knaggs, 1866 – tarka mohailonca – 4, 13, 15, 17, 36, 45, 51, 52, 59, 78, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

***Gesneria* Hübner, 1825**

centuriella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy zuzmóilonca – 4, 15, 99, 119, 134, 135, 167, 177, 178, 180, 189, 194, 232, 235, 294, 297, 321, 385, 387, 396

***Eudonia* Billberg, 1820**

mercurella (Linnaeus, 1758) – törpe zuzmóilonca – 31, 36, 51, 52, 99, 119, 122, 126, 135, 142, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 232, 235, 274, 294, 310, 333, 385, 386, 396

= *mercurea* (Haworth, 1811) – 4, 15, 22, 23, 45, 53

= *frequentella* Stainton, 1849 – 13

lacustrata (Panzer, 1804) – fehér mohailonca – 77, 119, 126, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 221, 235, 260, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 333, 363, 385, 386, 387, 396

= *crataegella* auct., nec Linnaeus, 1767 – 13, 122, 134

= *centurionalis* auct, nec Hübner, 1825 – 4, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 78

laetella (Zeller, 1846) – cifra mohailonca – 4, 22, 23, [180], 184

murana (Curtis, 1827) – fali zuzmóilonca – 4, [22], 51, 180, 396

truncicolella (Stainton, 1849) – szürke mohailonca – 4, 22, 45, 51, 167, 177, 180, 183, 184, 189, 211, 235, 294, 385, 386, 396

pallida (Curtis, 1827) – mocsári mohailonca – 4, 13, 15, 36, 45, 51, 52, 77, 119, 126, 167, 178, 183, 184, 189, 194, 235, 260, 274, 296, 297, 301, 321, 333, 363, 386, 387, 396

***Cholius* Guenée, 1845**

luteolaris (Scopoli, 1772) – sárga mohailonca – 167, 177, 180, 189, 211, 221, 235, 260, 294, 297, 310, 321, 33, 3853, 386, 396

= *ochrealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 53, 78, 119, 122, 134, 184

Heliothelinae

***Heliothela* Guenée, 1854**

wulfeniana (Scopoli, 1763) – fenyves kormosmoly – 119, 167, 174, 178, 184, 189, 211, 235, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 385, 386, 396

= *atralis* (Hübner, 1788) – 4, 15, 22, 36, 51, 52, 53, 77, 99, 122

Crambinae

***Chilo* Zincken, 1817**

phragmitella (Hübner, [1810]) – csíkos nádűrómoly – 4, 13, 15, 17, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 167, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 260, 263, 274, 294, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

suppressalis (Walker, 1863) – egyszínű nádűrómoly – 231, 233, 288, 294, 321, 385, 387, 396

***Friedlanderia* Agnew, 1987 (= *Thopeutis* Hübner, 1818)**

cicatricella (Hübner, [1824]) – tarka nádűrómoly – 4, 45, 51, 52, 59, 77, 86, 91, 119, 122, 126, 178, 183, 184, 211, 301, 386, 396

***Pseudobissetia* Bleszyński, 1959**

terrestrellus (Christoph, 1885) – kukorica-fűrómoly – 288, 301, 396

***Calamotropha* Zeller, 1863**

paludella (Hübner, [1824]) – barna nádlevélmoly – 4, 15, 22, 23, 31, 35, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 294, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

aureliellus (Fischer von Röslerstamm, 1841) – arany színű nádlevélmoly – 4, 17, 22, 51, 52, 59, 77, 86, 91, 99, 109, 122, 126, 142, 167, 178, 183, 184, 194, 211, 260, 263, 294, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 387, 396

***Euchromius* Guenée, 1845**

ocellea (Haworth, [1811]) – ezüstcsíkos mozaikmoly – 4, 51, 77, 86, 152, 167, 211, 274, 287, 294, 321, 385, 387, 396

bella (Hübner, 1796) – cifra mozaikmoly – 4, 13, 15, 31, 36, 52, 77, 91, 109, 119, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 211, 232, 235, 280, 287, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Chrysoteuchia* Hübner, 1825**

culmella (Linnaeus, 1758) – kerti fűgyökérmoly – 77, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

= *hortuella* (Hübner, 1796) – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78

***Crambus* Fabricius, 1798**

pascuella (Linnaeus, 1758) – lápréti fűgyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 59, 77, 78, 86, 87, 91, 109, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 243, 263, 274, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

silvella (Hübner, [1813]) – erdei fűgyökérmoly – 4, 13, 15, 23, 51, 52, 74, 77, 86, 91, 109, 119, 142, 167, 178, 211, [235], 387, 396

uliginosellus Zeller, 1850 – mocsári fűgyökérmoly – 4, 51, 77, 178, 301, 363, 387, 396
= *scotica* (Westwood, 1849) – 86, 91

ericella (Hübner, [1813]) – fenyéres fűgyökérmoly – 38, 45, 113, 142, 386

pratella (Linnaeus, 1758) – ékes fűgyökérmoly – 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 86, 87, 91, 99, 109, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 178, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 280, 294, 297, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

= *dumetellus* (Hübner, [1813]) – 4, 13, 15, 23, 45, 51, 52, 59

lathoniellus (Zincken, 1817) – mezei fűgyökérmoly – 109, 126, 167, 177, 178, 189, 211, 221, 235, 262, 274, 294, 301, 333, 363, 385, 386, 387, 396

= *pratella* auct., nec Linnaeus, 1758 – 4

= *nemorella* (Hübner, [1813]) – 77, 86, 91, 99, 119, 183, 184

hamella (Thunberg, 1794) – uzsai fűgyökérmoly – 146, 159, 396

perlella (Scopoli, 1763) – gyöngyházás fűgyökérmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 86, 91, 99, 109, 119, 124, 122, 126, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

= *monochromellus* Herrich-Schäffer, 1853 – 74, 75, 81, 86, 91

***Agriphila* Hübner, 1825**

deliella (Hübner, [1813]) – őszi fűgyökérmoly – 4, 77, 126, 184, 211, 274, 301, 333, 363, 387, 396

tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyászos fűgyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 70, 77, 78, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 26, 2630, 274, 280, 294, 296, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

inquinatella ([Denis & Schiff.], 1775) – közönséges fűgyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 78, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 134, 142, 152, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

brioniellus (Zerny, 1914) – hegyi fűgyökérmoly – 102, 106, 385, 396

selasella (Hübner, [1813]) – fakó fűgyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 23, 45, 51, 52, 53, 70, 77, 86, 91, 99, 109, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 232, 263, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 363, 385, 386, 387, 396, 421

- straminella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyrojtú fügyökérmoly – 77, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 142, 167, 178, 183, 184, 189, 211, 235, 243, 274, 296, 301, 386, 387, 396
= *culmella* auct., nec Linnaeus, 1758 – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 78
- poliellus* (Treitschke, 1832) – okkerszínű fügyökérmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 77, 109, 119, 152, 183, 184, 251, 263, 294, 301, 321, 385, 396
- tersellus* (Lederer, 1855) – magyar fügyökérmoly – 77, 86, 91, 109, 178, 183, 251, 263, 294, 301, 385
= *hungaricus* (A. Schmidt, 1910) – 4, 15, 31, 51, 53, 70, 86, 119, 184, 211, 387, 396
- tolli* (Bleszynski, 1952)*²²⁶ – síksági fügyökérmoly – 77, 81, 86, 93, 91, 109, 115, 122, 129, 142, 152, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- geniculea* (Haworth, 1811) – parlagi fügyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 45, 51, 52, 53, 78, 86, 91, 99, 109, 115, 119, 126, 129, 142, 167, 190, 211, 260, 294, 297, 321, 333, 385, 386, 396, 421
- Catoptria** Hübner, 1825
- permutatellus* (Herrich-Schäffer, [1848]) – gyöngyházcsíkos fügyökérmoly – 4, 45, 52, 82, 114, 167, 274, 386, 396
- myella* (Hübner, [1796]) – alpesi fügyökérmoly – 101, 114
- osthelderi* (de Lattin, 1950) – Osthelder fügyökérmolya (nyugati fügyökérmoly) – 4, 51, 81, 82, 86, 114, 386, 396
- mytilella* (Hübner, [1805]) – fehércsíkos fügyökérmoly – 4, 17, 51, 81, 82, 86, 91, 160, 189, 235, 280, 321, 346, 396
- pinella* (Linnaeus, 1758) – ezüstös fügyökérmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- margaritella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyöngyös fügyökérmoly – 4, 51, 86, 88, 184, 232, 396
- fulgidella* (Hübner, [1813]) – villámmintás fügyökérmoly – 4, 77, 126, 211, 301, 363, 387
- falsella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hálós fügyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
[*persephone* Bleszyński, 1965 – 92, 114 – erroneous]
- confusellus* (Staudinger, 1881) – tarka fügyökérmoly – 4, 31, 51, 86, 88, 109, 184, 187, 211, 280, 396
- verellus* (Zincken, 1817) – kormos fügyökérmoly – 4, 52, 59, 62, 91, 142, 167, 178, 184, 194, 211, 232, 260, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- lythargyrella* (Hübner, [1796]) – szalmasárga fügyökérmoly – 4, 13, 15, 22, 31, 51, 52, 86, 109, 119, 134, 152, 167, 177, 184, 189, 194, 211, 232, 263, 294, 310, 321, 385, 396
- Mesocrambus** Bleszyński, 1957
- candiellus* (Herrich-Schäffer, [1848]) – buckajáró fügyökérmoly – 4, 77, 274, 387
- Metacrambus** Bleszyński, 1957
- carectellus* (Zeller, 1847) – homoki fügyökérmoly – 4, 15, 31, 36, 51, 77, 86, 91, 109, 178, 183, 184, 189, 211, 235, 263, 294, 301, 333, 385, 387, 396
- Xanthocrambus** Bleszyński, 1955
- saxonellus* (Zincken, 1821) – sárga fügyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 53, 77, 78, 86, 91, 109, 119, 122, 134, 152, 167, 177, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 387, 396
- lucellus* (Herrich-Schäffer, [1848]) – zegzugos fügyökérmoly – 4, 36, 51, 52, 59, 77, 91, 99, 134, 178, 184, 189, 211, 235, 263, 294, 301, 321, 363, 385, 387, 396
- Chrysocramboides** Bleszyński, 1957
- craterella* (Scopoli, 1763) – rácsos fügyökérmoly – 4, 13, 15, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 86, 87, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- Chrysocrambus** Bleszyński, 1957

linetella (Fabricius, 1781) – déli fügyökérmoly – 86, 91, 109, 119, 126, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 211, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 392, 396
= *cassentiniellus* (Herrich-Schäffer, 1848) auct. – 4, 17, 36, 51, 52, 59, 78, 363

***Thisanotia* Hübner, 1825**

chrysonuchella (Scopoli, 1763) – tavaszi fügyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

***Pediasia* Hübner, 1825**

fascelinella (Hübner, [1813]) – sávós fügyökérmoly – 4, 36, 77, 91, 119, 134, 184, 189, 232, 235, 294, 310, 321, 363, 385, 387, 396

jucundellus (Herrich-Schäffer, [1847]) – homokháti fügyökérmoly – 4, 51, 86, 126, 184, 251, 301, 363, 396

luteella ([Denis & Schiff.], 1775) – agyagsárga fügyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

contaminella (Hübner, [1796]) – mocsos fügyökérmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 211, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 363, 385, 386, 396

aridella (Thunberg, 1788)*²²⁷ – sziki fügyökérmoly – 4, 15, 22, 23, 51, 77, 91, 109, 126, 178, 183, 184, 211, 301, 310, 321, 333, 363, 386, 387, 396

= *kenderesiensis* Fazekas, 1987 – 80, 81, 85, 86, 221, 251

= *salinellus* ssp. *nepos* Rothschild, 1911 – 13

matricella (Treitschke, 1832) – alföldi fügyökérmoly – 4, 77, 126, 184, 220, 251, 333, 363, 387

***Platytes* Guenée, 1845**

cerussella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – törpe fügyökérmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 86, 91, 99, 109, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

alpinella (Hübner, [1813]) – moharágómoly – 4, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 74, 77, 91, 99, 109, 126, 134, 142, 167, 178, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

***Ancylolomia* Hübner, 1825**

palpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – magyar csőrösömoly – 4, 13, 15, 31, 51, 86, 109, 119, 122, 152, 184, 211, 274, 396

tentaculella (Hübner, [1796]) – olasz csőrösömoly – 301, 304, 306

***Talis* Guenée, 1845**

quercella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pannon fügyökérmoly – 4, 13, 15, 23, 31, 51, 52, 77, 86, 91, 109, 119, 122, 134, 178, 183, 184, 211, 221, 294, 301, 385, 396

Schoenobiinae

***Scirpophaga* Treitschke, 1832**

praelata (Scopoli, 1763) – kócsagmoly (hófehér nádromoly) – 4, 13, 15, 17, 23, 36, 51, 52, 77, 119, 122, 178, 184, 189, 211, 235, 260, 301, 363, 387, 396

***Schoenobius* Duponchel, 1836**

gigantella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – óriás nádfűrómoly – 4, 13, 15, 17, 23, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 263, 274, 294, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

***Donacaula* Meyrick, 1890**

forficella (Thunberg & Wenner, 1794) – fakó nádfűrómoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 119, 122, 126, 134, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 235, 243, 263, 274, 294, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

mucronella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ritka nádúrómoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 142, 167, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 221, 235, 263, 274, 294, 301, 321, 385, 386, 387, 396

Cybalomiinae

Hyperlais Marion, 1959

dulcinalis (Treitschke, 1835) – homoki tűzmoly – 4, 77, 294, 301, 385, 387, 396

Acentropinae

Acentria Stephens, 1829

ephemerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – törpe vízimoly – 126, 142, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 235, 260, 274, 297, 301, 3330, 386, 387, 396
= *nivea* (Olivier, 1791) – 4, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 99, 122

Parapoynx Hübner, 1825

stratitotata (Linnaeus, 1758) – közönséges vízimoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 387, 396

nivalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehér vízimoly – 4, 51, 77, 122, 126, 142, 184, 363, 387, 396

Elophila Hübner, 1822

nymphaeata (Linnaeus, 1758) – tarka vízimoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 35, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 263, 274, 294, 296, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

rivulalis (Duponchel, 1833) – déli vízimoly – 4, 316

Cataclysta Hübner, 1825

lemnata (Linnaeus, 1758) – békalencsemoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

Nymphula Schrank, 1802

nitidulata (Hufnagel, 1767) – díszes vízimoly – 224, 235, 294, 301, 363, 385

= *stagnata* (Donovan, 1806) – 4, 15, 31, 35, 36, 51, 52, 59, 77, 119, 122, 126, 178, 184, 189, 211, 260, 263, 386, 396

Odontiinae

Eurrhysis Hübner, 1825

pollinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – galajszövő kormosmoly – 4, 13, 15, 23, 36, 45, 51, 52, 77, 78, 99, 119, 122, 142, 167, 180, 189, 211, 235, 294, 363, 385, 386, 387, 396

Titanio Hübner, 1825

normalis (Hübner, 1796) – szulákszövő kormosmoly – 4, 13, 15, 35, 52, 77, 119, 174, 178, 211, 294, 347, 385, 387, 396

Atralata Sylván, 1947

albofascialis (Treitschke, 1829) – fehérécsíkos kormosmoly – 4, 13, 14, 15, 34, 35, 51, 52, 53, 77, 119, 134, 178, 180, 183, 294, 385, 386, 387, 396

Cynaeda Hübner, 1825

dentalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyakori ciframoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 35, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

gigantea (Wocke, 1871) – magyar ciframoly – 4, 15, 77, 119, 146, 387

Aporodes Guenée, 1854

floralis (Hübner, [1809]) – articsókaevő tűzmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 77, 119, 122, 134, 152, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 232, 235, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 396

***Epascestria* Hübner, 1825**

pustulalis (Hübner, [1823]) – atracélrágó tűzmoly – 4, 17, 20, 35, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 263, 274, 280, 294, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 387, 396

***Ephelis* Lederer, 1863**

cruentalis (Geyer, 1832)*²²⁸ – ázsiai tűzmoly – E – 46

Evergestinae***Evergestis* Hübner, 1825**

frumentalis (Linnaeus, 1761) – tavaszi dudvamoly – 4, 13, 15, 17, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

forficilis (Linnaeus, 1758) – veteménymoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

extimalis (Scopoli, 1763) – kerti dudvamoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

limbata (Linnaeus, 1767) – közönséges dudvamoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 77, 78, 99, 119, 122, 134, 135, 152, 167, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396

pallidata (Hufnagel, 1767) – szalmaszínű dudvamoly – 4, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 178, 180, 183, 184, 189, 211, 232, 235, 260, 263, 274, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

= *straminalis* Hübner, 1793 – 13

politalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pompás dudvamoly – 4, 51, 122, 134, 184, 221, 294, 310, 321, 385, 396

aenealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – patinás dudvamoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396

alborivulalis (Eversmann, 1843) – keleti kormosmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 37, 119, 160, 180, 211, 313 – V (50 000 Ft)

Glaphyriinae***Hellula* Guenée, 1854**

undalis (Fabricius, 1781)*²²⁹ – zegzugos tűzmoly – 96, 184, 321, 396

Pyraustinae***Paracorsia* Marion, 1959**

repandalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szalmaszínű tűzmoly – 4, 17, 23, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 122, 126, 134, 142, 167, 178, 180, 183, 184, 194, 211, 232, 243, 263, 274, 294, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Loxostege* Hübner, 1825**

turbidalis (Treitschke, 1829) – ürömrágó tűzmoly – 4, 51, 77, 99, 126, 134, 184, 211, 294, 301, 321, 363, 385, 387, 396

deliblatica Szent-Ivány & Uhrík-Mészáros, 1942 – kénszínű tűzmoly – 363, 387

= *sulphuralis* Hübner, 1813 nec Thunberg, 1784 – 4, 77

aeruginalis (Hübner, 1796) – cifra tűzmoly – 4, 36, 51, 52, 122, 134, 177, 184, 189, 211, 220, 221, 223, 232, 235, 263, 294, 385, 396

sticticalis (Linnaeus, 1761) – muszkamoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 28, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
fascialis (Hübner, [1796])^{*230} – csikos kormosmoly – 4

***Ecpyrrhorrhoe* Hübner, 1825**

diffusalis (Guenée, 1854) – villányi tűzmoly – 43, 177, 189, 329, 330
rubiginalis (Hübner, [1796]) – rozsdavörös tűzmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Pyrausta* Schrank, 1802**

cingulata (Linnaeus, 1758) – fehéröves kormosmoly – 4, 13, 15, 17, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 134, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 212, 232, 235, 260, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
rectefascialis Toll, 1936^{*231} – lengyel kormosmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 51, 52, 53, 74, 77, 119, 134, 152, 177, 178, [180], 183, 189, 211, 212, 232, 235, 297, 321, 385, 396
virginalis (Duponchel, 1832) – alföldi bíbormoly – 4, 17, 51, 74, 77, 122, 152, 189, 211, 220, [235], 294, 301, 385, 396
sanguinalis (Linnaeus, 1767) – vérszínű bíbormoly – 4, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
castalis Treitschke, 1829^{*232} – déli bíbormoly – 4, 36, 189, [235], 316
despicata (Scopoli, 1763) – réti bíbormoly – 126, 142, 167, 177, 178, 180, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 333, 363, 385, 386, 387, 396
= *cespitalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 4, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 134, 135, 183, 184, 189, 321
= *tendinosalis* Bremer, 1864 – 13
porphyralis ([Denis & Schiffermüller], 1775)^{*233} – tarka bíbormoly – 4, 13, [22], 23, [180]
aurata (Scopoli, 1763) – aranyló bíbormoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
purpuralis (Linnaeus, 1758) – közönséges bíbormoly – 4, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
ostrinalis (Hübner, [1796]) – ritka bíbormoly – 4, 15, 17, 23, 51, 52, 59, 74, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 263, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 385, 386, 387, 396
falcatalis Guenée, 1854 – hegyi bíbormoly – 4, 15, 45, 51, 52, 119, 178, 363, 378, 386, 396
obfuscata (Scopoli, 1763)^{*234} – félholdas kormosmoly – 4, 13, 15, 77, 119
nigrata (Scopoli, 1763) – fehérpettyes kormosmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 78, 119, 122, 134, 142, 152, 167, 177, 178, 180, 189, 211, 232, 235, 260, 294, 297, 301, 321, 333, 385, 386, 396
coracinalis Leraut, 1982^{*235} – fekete kormosmoly – 167
= *nigralis* (Hübner, 1793) nom. praecoc. – 4

***Uresiphita* Hübner, 1825**

gilvata (Fabricius, 1794) – feketeöves dudvamoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 142, 167, 178, 180, 189, 211, 232, 235, 280, 294, 301, 310, 321, 363, 385, 386, 396
= *limbalis* auct., nec Linnaeus, 1767 – 77, 99, 119, 122, 134, 184

***Nascia* Curtis, 1835**

ciliaris (Hübner, 1796) – sásrágó tűzmoly – 4, 45, 51, 52, 59, 77, 99, 122, 126, 134, 142, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 260, 263, 274, 294, 296, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396

***Sitochroa* Hübner, 1825**

- palealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kénszárnyú dudvamoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 34, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- verticalis* (Linnaeus, 1758) – világossárga dudvamoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 87, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- Anania** Hübner, 1823
- fuscalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke tűzmoly – 4, 13, 15, 17, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 235, 260, 264, 274, 280, 294, 297, 385, 386, 387, 396
- lancealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hosszúsárnyú tűzmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 235, 264, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396
- coronata* (Hufnagel, 1767) – koronás dudvamoly – 4, 15, 17, 22, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 264, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- = *sambucalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 13
- stachydalis* (Germar, 1821) – mocsári dudvamoly – 4, 15, 36, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122, 152, 167, 178, 184, 189, 211, 235, 260, 262, 264, 274, 280, 297, 301, 321, 386, 387, 396
- perlucidalis* (Hübner, 1809) – lápréti tűzmoly – 4, 51, 52, 77, 78, 99, 126, 142, 167, 178, 180, 183, 184, 194, 211, 221, 243, 260, 264, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 321, 385, 386, 387, 396
- luctualis* (Hübner, 1793) – fehérfoltos kormosmoly – 4, 13, 15, 23, 119, 169, 211, 264 – V (10 000 Ft)
- terrealis* (Treitschke, 1829) – barnásszürke tűzmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 34, 36, 45, 51, 52, 77, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 260, 264, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 385, 386, 387, 396
- crocealis* (Hübner, [1796]) – okkerszárnyú tűzmoly – 4, 13, 15, 17, 23, 31, 36, 51, 52, 77, 78, 119, 122, 126, 134, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 232, 235, 264, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 385, 396
- verbascalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyszínű dudvamoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 264, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- funebri* (Ström, 1768) – aranyvessző-kormosmoly – 4, 13, 15, 119, 142, 167, 264, 386
- = *octomaculata* Linnaeus, 1771 – 5
- = *atralis* Fabricius, 1775 – 13
- hortulata* (Linnaeus, 1758) – tarka csalánmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 264, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- Sclerocona** Meyrick, 1890
- acutellus* (Eversmann, 1842) – hegyesszárnyú tűzmoly – 4, 17, 22, 31, 36, 51, 52, 59, 77, 122, 126, 134, 178, 180, 183, 184, 189, 211, 235, 243, 260, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 333, 385, 386, 387, 396
- Psammotis** Hübner, 1825
- pulveralis* (Hübner, [1796]) – rozsdasárga tűzmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 126, 134, 142, 167, 178, 180, 183, 184, 194, 211, 221, 232, 243, 260, 263, 274, 294, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- Ostrinia** Hübner, 1825
- quadripunctalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)*²³⁶ – turjáni kormosmoly – 4, 167
- palustralis* (Hübner, [1796]) – mocsári tűzmoly – 4, 51, 52, 99, 126, 178, 184, 211, 243, 363, 396 – V (5 000 Ft)
- nubilalis* (Hübner, [1796]) – kukoricamoly – 4, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 70, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

***Paratalanta* Meyrick, 1890**

pandalis (Hübner, [1825]) – halványsárga tűzmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 114, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 274, 294, 297, 333, 363, 385, 386, 387, 396, 421

hyalinalis (Hübner, [1796]) – üvegszárnyú tűzmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 36, 45, 51, 52, 78, 99, 114, 119, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

Spilomelinae***Udea* Guenée, 1845**

ferrugalis (Hübner, [1796]) – rozsdabarna tűzmoly – 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

= *martialis* (Guenée, 1854) – 4, 13, 15, 17, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 78

fulvalis (Hübner, [1809]) – hullámos tűzmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 45, 51, 52, 77, 78, 119, 122, 126, 134, 180, 184, 189, 211, 232, 294, 296, 301, 310, 321, 333, 385, 386, 396

lutealis (Hübner, [1809]) – sárgás tűzmoly – 46, 51, 78, 119, 152, 160, 167, 180, 211, 221, 321, 396

prunalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hegyi tűzmoly – 13, 119, 134, 142, 167, 211, 221, 294, 297, 385, 386, 396

= *nivalis* (Fabricius, 1781) – 4, 15, 22, 31, 45, 51, 52, 78, 180

accolalis (Zeller, 1867) – láperdei tűzmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 178, 180, 184, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 263, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 363, 385, 386, 387, 396

olivalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – olajszínű tűzmoly – 4, 13, 15, 20, 22, 23, 31, 34, 36, 45, 51, 52, 78, 119, 134, 167, 180, 189, 211, 221, 235, 243, 294, 297, 385, 386, 396

numeralis (Hübner, 1796) – mediterrán tűzmoly – 392

***Patania* Moore, 1888 (= *Pleuroptya* Meyrick, 1890)**

ruralis (Scopoli, 1763) – csalánevő tűzmoly – 4, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 31, 45, 51, 52, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 135, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

balteata (Fabricius, 1798)*²³⁷ – szömörceárgó tűzmoly – E – [4], 146

***Mecyna* Doubleday, 1849**

flavalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csalánszövő tűzmoly – 13, 15, 23, 51, 77, 78, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 180, 183, 184, 189, 211, 221, 232, 235, 243, 274, 280, 294, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

lutealis (Duponchel, 1832) – citromszínű tűzmoly – 119, 178, 297, 396

= *citralis* (Herrich-Schäffer, 1849) – 4, 15, 51

trinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tetemtoldó-tűzmoly – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 51, 52, 78, 119, 134, 142, 167, 180, 184, 211, 221, 260, 280, 294, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396

***Agrotera* Schrank, 1802**

nemoralis (Scopoli, 1763) – ligeti tűzmoly – 4, 13, 15, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 99, 119, 122, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 184, 189, 211, 235, 243, 262, 274, 280, 294, 297, 301, 385, 386, 396

***Diasemia* Hübner, 1825**

reticularis (Linnaeus, 1761) – betűmintás tűzmoly – 126, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 232, 235, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 297, 301, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

= *litterata* (Scopoli, 1763) – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 59, 77, 99, 119, 122

***Diasemiopsis* Munroe, 1957**

ramburialis (Duponchel, 1834) – moszatpáfrány-tűzmoly – 436

***Cydalima* Lederer, 1863**

perspectalis (Walker, 1859) – puszpáng-tűzmoly – Inv – 295, 309, 333, 385, 386, 387, 396, 421

***Duponchelia* Zeller, 1847**

- fovealis* Zeller, 1847*²³⁸ – pontusi tűzmoly – Szn; Inv – 136, 310, 412
- Spoladea*** Guenée, 1854
- recurvalis* (Fabricius, 1775)*²³⁹ – trópusi tűzmoly – E – 281, 445
- Hodebertia*** Leraut, 2003
- testalis* (Fabricius, 1794)*²⁴⁰ – selyemkóró-tűzmoly – E – 352
- Palpita*** Hübner, 1808
- vitrealis* (Rossi, 1794) – hófehér tűzmoly – RM – 224, 294, 301, 333, 385, 387
= *unionalis* (Hübner, 1796) – 4, 51, 88, 167, 184, 211, 232, 310, 321, 396
- Dolicharthria*** Stephens, 1834
- stigmatosalis* (Herrich-Schäffer, [1848]) – balkáni tűzmoly – 4, 5, 193, 220, 396
- punctalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hosszúlábú tűzmoly – 4, 15, 17, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 330, 333, 363, 385, 386, 387, 396
- Antigastra*** Lederer, 1863
- catalaunalis* (Duponchel, 1833)*²⁴¹ – gyöngymoly – 4, 77, 396
- Metasia*** Guenée, 1845
- ophialis* (Treitschke, 1829) – kígyósávós tűzmoly – 4, 13, 15, 17, 23, 36, 51, 52, 53, 77, 99, 119, 114, 134, 135, 167, 177, 178, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 260, 274, 280, 294, 296, 310, 321, 333, 385, 386, 387, 396
- Nomophila*** Hübner, 1825
- noctuella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges vándormoly – RM – 4, 13, 15, 17, 22, 23, 31, 36, 45, 51, 52, 53, 59, 77, 78, 99, 119, 122, 126, 134, 142, 167, 177, 178, 180, 183, 184, 189, 194, 211, 221, 232, 235, 243, 260, 262, 263, 274, 280, 294, 296, 297, 301, 310, 321, 333, 363, 385, 386, 387, 396

Megjegyzések és kiegészítések egyes családokhoz, genuszokhoz és fajokhoz Notes to certain families, genera and species

- *¹ *Triodia amasinus* (Herrich-Schäffer, [1851]) – eddig egyetlen publikált magyarországi adata létezik (Gyulai et al. 1974), de bizonyító példány nincs. A fajnak újabb egyedei hazánkból nem ismeretesek. Déli-délkeleti (pontusi) faj, honossága nálunk nem valószínű.
- *² *Pharmacis carna* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – eddig egyetlen magyarországi példánya ismert Gyöngyössolymosról (Szabóky 1980). Újabb egyedei az utóbbi évtizedekben nem kerültek elő. Tőlünk északabbra élő hegyvidéki faj, honossága nálunk nem valószínű.
- *³ **Nepticulidae – Törpemolyfélék** – Nieukerken et al. (2016) nyomán.
- *⁴ *Trifurcula subnitidella* (Duponchel, 1843) – azon kevés törpemoly (Nepticulidae) fajok egyike, amely nem a tápnövény levelében, hanem a szárában (*Lotus corniculatus*), a héj alatt aknázik – lásd Nieukerken 1990, Lepiforum.de, és több más internetes blog.
- *⁵ *Incurvaria koeneriella* (Zeller, 1839) – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására; Karsholt & Razowski 1996, Karsholt & Nieukerken 2007, version 1.3 (visited 2017.V.10.). az ezredfor-duló utáni magyar fajlisták csak az említett fórumok alapján tartják nyilván.
- *⁶ *Phylloporia bistrigella* (Haworth, 1828) – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására; Karsholt &

Razowski 1996, Karsholt & Nieukerken 2007, version 1.3 (visited 2017.V.10.). az ezredfor-duló utáni magyar fajlisták csak ezek alapján tartják nyilván.

– *⁷ *Antispila petryi* Martini, 1898 – az évtizedekig a *treitschkiella* (F. von Röslerstamm, 1843) szinonimájaként nyilván tartott fajt a tenyésztési tapasztalatok és egyéb beható vizsgálatok nyomán emelték ismét valid faj rangjára Nieukerken & al. (2017). A fajról újabb hazai adatok csak nemrég váltak ismeretessé Tóth et al. (2022) révén.

– *⁸ *Nemophora mollella* (Hübner, 1813) – Gozmány (1965) Budapestről, Balogh (1967) Reskovits régi gyűjtési adatát (1940.VII.4.) idézve Egerből említi, a későbbi publikációk csupán ez utóbbit ismételik. A fajról egyéb közlés ill. újabb adat Magyarországról nem ismeretes.

– *⁹ Az *Eudarcia* nem újabban a **Meessiidae** önálló családban szerepel – lásd Laštůvka et al., 2023, Pastorális 2022, Lepiforum.de, Lepiwiki, Wikipedia és egyéb internetes fórumok, de mint alsócsalád („Meessiinae”), továbbra is érvényes névként van a Tineidae családon belül is.

– *¹⁰ *Eudarcia pagenstecherella* (Hübner, 1825) – Gozmány (1965) még *vinculella* HS. néven közölte Budapestről. Egyéb hazai előfordulási adatáról csak Petrich (2001b) révén van tudomásunk. A fajt újabban önálló családi rangra emelték.

– *¹¹ **Psychidae – Csőzsákos-molyfélék** – Arnscheid & Weidlich (2017) nyomán (lásd még Fazekas 2015 is).

– *¹² *Dahlica triquetrella* (Hübner, 1813) – a faj három különböző formában fordul elő: bisex és két parthenogenetikus (az utóbbiak a kromoszómáikban különböznek; vagy diploid-vagy tetraploid). Magyarországon előfordul a bisex és parthenogenetikus forma is (Weidlich 2014).

– *¹³ *Dahlica lichenella* (Linnaeus, 1761) (parth. f.) – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatok (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélküli utalás a faj magyarországi előfordulására: Karsholt & Razowski 1996, s ennek nyomán Fazekas 2002c, 2015c, Szabóky et al. 2002.

– *¹⁴ *Dahlica (Brevantennia) herrmanni* Weidlich, 1996 – Magyarországról leírt faj, amely bizonyítottan eddig csak a Mátrából ismert (Weidlich 1996). A *herrmanni*-hoz hasonló hazai gyűjteményi egyedek [pl. a Gozmány (1965) által *thomanni*, *banatica* és *inconspicuella* néven közöltek] ellenőrzést kívánnak.

– *¹⁵ *Bacotia claustrrella* (Bruand, 1845) – a fajt Gozmány (1965) szögletes zárójelben közölte, és így van említve a Kiskunsági Nemzeti Park molylepke-faunáját ismertető dolgozatban is, Pészerről (Gozmány & Szabóky 1986); bizonyító példány nem áll rendelkezésünkre. Karsholt & Razowski (1996) feltehetően előbbieket téves értelmezésű jelzése nyomán került át a hazai névjegyzékekbe (Fazekas 2002c, 2015c, Pastorális 2007, 2012, Szabóky et al. 2002), azonban ez ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utaláson ill. félreértésen alapulhat – lásd Wikipedia: a faj hazai előfordulásáról máig nincs tudomásunk.

– *¹⁶ *Epichnopterix plumella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – a faj hazai előfordulását Gozmány & Szabóky (1986) jelezte Csévharasztról, később Buschmann (2003) számos helyről közölte (in coll. Mátra Múzeum Gyöngyös). Ez utóbbi meghatározások azonban ellenőrzést kívánnak. A régebbi hazai irodalomban önálló fajként közölt *Epichnopterix kovacsi* Sieder, 1955 (magyar zsákhordólepke) újabban csak az *E. plumella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) = *pulla* Esper, 1785 alfajának van minősítve (Arnscheid & Weidlich 2017, Fazekas 2015). Úgy tűnik, nálunk a törzsalak és az alfaj egyaránt előfordul. Minden egyéb régebbi „*plumella*” közlés a *Rebelia plumella* (Ochsenheimer, 1810) fajra vonatkozik.

– *¹⁷ *Bijugis pectinella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – a faj hazai előfordulását Gozmány (1965) *Psychidea pectinella* F. ssp. *perlucidella* BRD. néven a Dunántúlról, valamint Kisújszállásról és Sárospatakról ismertette. A későbbi faunalistáján (Gozmány 1968) viszont *Rebelia perlucidella* BRD. és átlátszó zsákhordólepke magyar névvel közölte, erre azonban a nevezéktani változásokat ismertető dolgozatában (Gozmány 1985) nem tért ki. Feltehetően ennek nyomán Szabóky (1999) szintén *R. perlucidella*-t említ az Aggteleki NP számos helyéről, ezek a meghatározások azonban ellenőrzést kívánnak. Jelen ismereteink szerint ugyanis a *Rebelia perlucidella* déli és keleti elterjedésű faj, areája Magyarország területét nem éri el. A Szabóky et al. (2002) valamint a későbbi faunalistákon (Pastorális 2007 – 2012) a *perlucidella* (Bruand, 1853) fajnév tévesen a *pectinella* (Denis & Schiffermüller, 1775) szinonimjaként van feltüntetve – jóllehet önálló fajokról van szó –, Fazekas (2015) dolgozatában és a Pastorális et al. (2016) listában viszont a *perlucidella* név már nem is szerepel.

– *¹⁸ A *Rebelia* Heylaerts, 1900 – a nem egyes fajainak nevei körül jelentős eltérések vannak a különböző, eddig megjelent hazai irodalmi források között. A problémakörbe elmélyedni itt nem áll módunkban, követjük a legújabb, Arnscheid & Weidlich (2017) Európa Psychidae faunáját feldolgozó munkát (lásd Fazekas 2015 is). Megjegyezzük még, hogy a faunafüzetben Gozmány (1965) által említett s faunánkból már régebben törölt „*Rebelia hungarica* Meier” nem létező „faj”, a név csupán általánosságban utalt valami nem konkretizált magyarországi gyűjtőhelyre – lásd Hauser 2012.

– *¹⁹ *Rebelia sapho* (Millière, 1865) – a fajt konkrétan eddig csak Fazekas (2007b) közölte a Mecsekből, illetve Szabóky (1999) az Aggteleki Nemzeti Parkból, ezek azonban ivarszervi ellenőrzést kívánnak. Az említett közléseken kívül a faj egyéb hazai adata nem ismert.

– *²⁰ *Rebelia kruegeri* Turati, 1914) – Fazekas 2002c, 2015. Magyarországon a *kruegeri* törzsalakja nem él, csak annak alfaja, a ssp. *danubiella* Loebel, 1941 (lásd Arnscheid & Weidlich 2017, Fazekas 2015), melyet nálunk mindeddig önálló fajként tartottunk számon. Az eddig ismert régi gyűjtésű hazai *danubiella* egyedek helyes megnevezése tehát *Rebelia kruegeri* Turati, 1914 subsp. *danubiella* Loebel, 1941 – dunavidéki zsákhordólepke. Újabb adatközlés a *danubiella*-ról évtizedek óta nem látott napvilágot a hazai szakirodalomban.

– *²¹ **Tineidae – Ruhamolyfélék** – Gaedike (2015, 2019) és a Lepiforum.de weboldal nyomán.

– *²² *Archinemapogon yildizae* Koçak, 1981 – Gozmány (1965) *laterellus* Thnbg. néven közölte Kaposvárról. A faj újabb adatai csak a Fazekas (2001a) és Szabóky (2011, 2019) munkáiból ismeretesek.

– *²³ *Nemapogon koenigi* Căpușe, 1967 – mint a magyar fauna új tagját Sziráki & Szöcs (1989) *albipunctella* Haworth, 1828 néven ismertették, a későbbi fajlistákon pedig végig *wolffiella* Karsholt & Nielsen, 1976 néven szerepelt (Pastorális 2007 – 2012, Pastorális et al. 2016). Az újabb vizsgálatok és irodalmi forrás-kutatások szerint a faj érvényes neve *Nemapogon koenigi* Căpușe, 1967 (Lepiforum.de, visited 2017.XI.10.). Hazánkból a fajról a fentebb említett közlés (Sziráki & Szöcs 1989) óta újabb publikált előfordulási adat nem ismeretes.

– *²⁴ *Nemapogon gravosaellus* G. Petersen, 1957 – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására (Karsholt & Razowski 1996), melyet az ezredforduló utáni fajlisták (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002) ellenőrzés nélkül vettek át. Hazai adata mindmáig nem ismeretes.

– *²⁵ *Triaxomasia caprimulgella* (Stainton, 1851) – csak Ócsáról volt ismeretes (Gozmány 1965), a faj újabb hazai adatáról csupán Petrich (2001b) révén van tudomásunk.

- *²⁶ *Infurcitinea argentimaculella* (Stainton, 1849) – a fajnak eddig csak egyetlen, igen régi kalocsai előfordulása ismeretes (Gozmány 1965). Újabb adat közlése hazánkból tudomásunk szerint az óta nem látott napvilágot.
- *²⁷ *Haplotinea ditella* (Pierce & Metcalfe, 1938) – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására: Karsholt & Razowski 1996, Karsholt & Nieukerken 2007. Fazekas (2002c) és Szabóky et al. (2002) csupán ellenőrzés nélkül ismétlik. Előfordulása nem zárható ki, általunk viszont sem külföldi, sem hazai publikált adata a szakirodalomból nem ismert.
- *²⁸ *Cephimallota angusticostella* (Zeller, 1839) – Gaedike & Mally (2011) nyomán Buschmann (2012a) közölte faunára újként; a megelőző időkben „*angusticostella*” néven publikált előfordulási adatok (pl. Horváth 1997) valószínűleg a *crassiflavella* Bruand, 1850 (= *simplicella* Zeller, 1952 nec Herrich-Schäffer, 1851) fajra vonatkoznak (Bálint & Katona 2015, Buschmann 2012a). A hazai gyűjtemények „*angusticostella*” kinézetű egyedei ellenőrzést kívánnak, mert habitus alapján a két fajt nem mindig lehet egyértelműen elhatárolni egymástól a gyakran alig észlelhető szárnyszegélyi világosabb foltozottság vagy nem foltozottság alapján, csak az ivarszervi vizsgálat nyújt megbízható determinációt.
- *²⁹ *Elatobia fuliginosella* (Lienig & Zeller, 1846) – a fajt eddig csak Petrich (1988) közölte Agárdról. Újabb adatok az óta nem ismeretesek.
- *³⁰ *Tinea dubiella* Stainton, 1859 – a fajt eddig csak Petrich (1988) közölte szintén Agárdról. Újabb adatok az óta nem ismeretesek.
- *³¹ *Niditinea striolella* (Matsumura, 1931) – a fajt eddig csak Gozmány (1965) közölte még *piercella* Bentinck néven a Budai hegyekből. Újabb hazai adatok az óta nem ismeretesek.
- *³² *Pelecystola fraudulentella* (Zeller, 1852) – faunára újként Szeőke (2016) közölte. A faj rendszertani helyzete a Tineidae családon belül nem tisztázott; a Lepidoptera Svenska fjarilar a Triaxomasia nem után tünteti fel, a Lepiforum.de weboldalon (visited 2020.IX.10.) valamint Aarvik et al. (2017) munkájában a család végén találjuk. Mi ez utóbbit követjük.
- *³³ *Oinophila v-flava* (Haworth, 1828) – Gozmány (1965) Budapestről közölte, újabb egyedei is innen származnak (Fenyőgyöngye 1976 és Mátyás-hegy 1977; Szabóky 1982). A faj egyéb publikált adatáról nincs tudomásunk.
- *³⁴ *Rhigognostis incarnatella* (Steudel, 1873) – faunára újként Szabóky (1984) közölte Sopronhórpácsról (ERTI-fénycsapda). Újabb hazai előkerüléséről nincs információnk.
- *³⁵ *Eidophasia zukowskyi* Amsel, 1938 – a faj az előző névjegyzékekben (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002, Pastorális 2012, Pastorális et al. 2016) még *syenitella* (Herrich-Schäffer, [1854]) = *zukowskyi* Amsel, 1938 néven található, a közelmúlt beható vizsgálatai alapján (Baraniak & Shon 2016) viszont mindkettő önálló fajnak minősül. Szétválasztásuk csak ivarszervi vizsgálattal lehetséges. A máig egyetlen ismert hazai egyed Szabóky (1985) *zukowskyi* Amsel 1938 néven közölte, a fentiek miatt azonban a határozás ellenőrzést kíván.
- *³⁶ *Glyphipterix pygmaeella* Rebel, 1896 – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására; Karsholt & Razowski 1996, Karsholt & Nieukerken 2007, s ezek nyomán szerepel az ezredforduló utáni hazai névjegyzékekben. Publikált adata mindmáig nem ismeretes.

– *³⁷ *Digitivalva arnicella* (Heyden, 1863) – a fajt faunára újként Szöcs (1973) közölte Simon-tornyáról, Pillich Ferenc 1917.V.29.-i gyűjtése nyomán. Az elmúlt több mint száz évben újabb hazai adata tudomásunk szerint nem látott napvilágot.

– *³⁸ *Digitivalva reticulella* (Hübner, [1796]) – a fajt Gozmány (1956) csak szögletes zárójelben ismertette. Ennek ellenére szerepel a nagy európai checklistákon (Karsholt & Razowski 1996, Karsholt & Nieuken 2007, version 1.3, visited 2017.X.1.), ahonnan azt a későbbi magyar fajjegyzékek (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002) konkrét hazai adatok ismerete nélkül vették át és szerepel az óta is faunánk nyilvántartásában. Magyarországról bizonyító példány és publikált adata tudomásunk szerint mindmáig nem ismeretes.

– *³⁹ *Digitivalva perlepidella* (Stainton, 1849) – ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására (Karsholt & Razowski 1996). Ennek nyomán került az ezredforduló utáni hazai névjegyzékekbe, bizonyító példány és publikált adata viszont ismereteink szerint mindmáig nem ismeretes.

– *⁴⁰ *Acrolepiopsis tauricella* (Staudinger, 1871) – a fajt Szöcs (1969) *Acrolepia karolyii* néven írta le, később kiderült, hogy a Badacsonyan gyűjtött s nevelésekből származó egyedek mind a *tauricella* Stgr. faj példányai. A csak piritógyökéren (*Tamus communis*) előforduló s aknázó életmódot folytató monofág fajnak a Szöcs (1973) által közölt adatokon kívül újabb példányai nem ismeretesek, a később napvilágot látott hazai publikációk csupán ezt ismétlik.

– *⁴¹ *Ochsenheimeria capella* Möschler, 1860 – a fajt Gozmány (1965) szögletes zárójelben ismertette (az MTM gyűjteményében csak egy, mai határainkon kívüli, delibláti példány van). Karsholt & Razowski (1996) konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalása nyomán került a hazai névjegyzékekbe (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002), és szerepel az óta is nyilvántartásunkban (Pastorális 2007 – 2012, Pastorális et al. 2016, Pastorális & Buschmann 2018), előfordulását tudomásunk szerint eddig még senki nem publikálta.

– *⁴² *Ochsenheimeria urella* Fischer von Röslerstamm, 1842 – a fajt Gozmány (1965) Peszéréről jelezte, új adata az óta sem ismeretes.

– *⁴³ *Ochsenheimeria vacculella* Fischer von Röslerstamm, 1842 – Gozmány (1965) Gyónról közölte. A fajról újabb adat az eltelt évtizedekben nem vált ismeretessé.

– *⁴⁴ *Heliodines roesella* (Linnaeus, 1758) – a fajt Gozmány (1955) és Szabóky (1982, 2019) is csak néhány dunántúli lelőhelyről közölte. Hazai előfordulásáról több évtizede nincs publikált új adatunk, de Buschmann Ferenc gyűjteményében van kettő példány (Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VII.10. fénycsapda, és Tápióság, Nagy-rét, 2014.VII.25., leg. & coll. Buschmann F.). Nappal repülő faj, az említett egyedek ellenben 125 W-os HGL izzóval működtetett fénycsapdába, illetve gyűjtőlepedőre repültek. Ezek egyben a faj első alföldi előfordulási adatai is.

– *⁴⁵ **Scythropiidae – Hálószővő molyfélék** – A *Scythropia crataegella* (Linnaeus, 1767) fajt egyes újabb feldolgozások önálló család rangjára emelve a Bedelliidae és Lyonetiidae családok között szerepeltetik – lásd Aarvik et al. (2017), Laštůvka et al. (2023), Lepiforum.de, Lepiwiki, Pastorális (2022), Wikipedia és egyéb internetes fórumok.

– *⁴⁶ **Lyonetiidae – Ezüstös fehér molyfélék** – Fazekas 2023 nyomán.

– *⁴⁷ *Leucoptera cytisiphagella* Klimesch, 1938 – Magyarországról leírt faj, melyet Gozmány (1956) Pécsről említ. Újabb hazai előfordulási adatáról nincs tudomásunk – lásd Fazekas 2023.

- *⁴⁸ *Leucoptera heringiella* Toll, 1938 – Gozmány (1956) Fonyódról (és Kaposvárról) közölte, a faj későbbi közlései csupán ezt ismétlik. Hazai előfordulásáról az elmúlt száz évben újabb adat nem ismeretes – lásd Fazekas 2023.
- *⁴⁹ *Bucculatrix ratisbonensis* Stainton, 1861 – a faj hazai előfordulását Gozmány (1956) Budapestről jelezte, az eltelt évtizedekben újabb adatáról nincs tudomásunk.
- *⁵⁰ *Bucculatrix regaella* Chrétien, 1907 – a faj hazai előfordulását Szabóky et al. (2009) tévesen *B. herbalbella* Chrétien, 1915 néven közzéték Csákberényből – lásd törölt fajok is.
- *⁵¹ *Caloptilia rhodinella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – a faj Karsholt & Razowski (1996) katalógusában még önállóként volt feltüntetve (lásd az előző magyar fajlistákat is), azóta a *Caloptilia azaleella* (Brants, 1913) faj szinonimjává lett visszaminősítve (Lepiforum.de). Az *azaleella* fajt Szabóky (2012) közölte először hazánk területéről, de újabban előkerült egy Kiskunhalason 1937-ben gyűjtött példány is (Fazekas 2016b).
- *⁵² *Povolnya leucapennella* (Stephens, 1835) – Gozmány (1956, 1968) *sulphurellum* Haw. – néven közölte Kaposvárról, Fazekas (2001) csupán ezt ismétli. A faj újabb hazai előfordulási adatáról Gozmány óta nincs tudomásunk.
- *⁵³ *Millieria dolosalis* (Heydenreich, 1851) – a fajt egyes internetes fórumok (és Pastorális 2011) **Millieridae – Milliermolyfélék** néven önálló család rangján ismertetik, de ez szakmai körökben nem egyértelműen elfogadott. Jelen munkában követjük a Lepiforum.de és a hazai hagyományos besorolást, azaz a Choreutidae családon belüli alcsaládi beosztást.
- *⁵⁴ *Tebenna micalis* (Mann, 1857) – Magyarországról csak a Gozmány (1955) által közölt kaposvári előfordulásról tudunk (lásd Fazekas 2001a is), egyéb publikált adata nem ismert. A faj hazai előfordulása megerősítést kíván.
- *⁵⁵ *Oxyptilus* Zeller, 1841 = *Crombrugghia* Tutt, 1906 – a Lepiforum.de weboldal, valamint Aarvik et al. (2017) nyomán.
- *⁵⁶ *Hellinsia distinctus* (Herrich-Schäffer, [1855]) – a fajt eddig csak Gozmány (1963) közölte Budapest környékéről. Az elmúlt évtizedekben újabb hazai adatáról nincs tudomásunk.
- *⁵⁷ *Epermenia strictellus* (Wocke, 1867) – a fajt Gozmány (1956) Budapestről és Pécelről közölte, Szabóky (2018) a Zemplén hegységből. Egyéb publikált adata nem ismeretes.
- *⁵⁸ A **Cochylini** tribusban a *Cochylis* Treitschke, 1829 nem az alábbiak szerint felosztásra került: *Thyralia* Walsingham, 1897, *Longicornutia* Razowski, 1960, *Neocochylis* Razowski, 1960, *Cochylischroa* Obraztsov & Swatschek, 1958, *Brevicornutia* Razowski, 1960, *Ponto-turania* Obraztsov, 1943 – Kovács & Kovács 2020b és a Lepiforum.de nyomán.
- *⁵⁹ *Phtheochroa procerana* (Lederer, 1863) – a faj magyarországi előfordulásáról több évtizede nincs új adatunk.
- *⁶⁰ *Cochylimorpha halophilana* (Christoph, 1872) – a fajt Szabóky (1992) tévesen *jaculana* (Snellen, 1883) és „sótűrő pirosmoly” (sic!) magyar néven ismertette, de a Szabóky et al. 2002-es fajlistán már fehérkeretes fűrómoly magyar névvel szerepelt, a példány ellenben valójában egy *C. halophilana* (Christoph, 1872) egyed volt (Szabóky et al. 2006, 2007). A fajt helyesen Buschmann (2004) közölte először, és a magyar nevét szikiüröm-fűrómoly névre korrigálta (a lárvája ugyanis a sziki üröm (*Artemisia santonicum*) szárában él), mely magyar nevet előtte az időközben a *halophilana* faj szinonimájává süllyesztett, de a Szabóky et al. (2002) listán még önállóként feltüntetett *Cochylimorpha clavana* (Constant, 1888) viselte.

- *⁶¹ *Cochylimorpha elongana* (Fischer von Röslerstamm, 1839) – újabb egyede több évtized után Farmosról (sziki tanösvény, 2017.VIII.4., vödörcsapda) került elő (Buschmann 2022b).
- *⁶² *Cochylimorpha jucundana* (Treitschke, 1835) – Magyarországról csak a J. Klimesch által 1937-ben Pécsen gyűjtött két példány ismeretes. Újabb előkerüléséről nincs információnk. Úgy tűnik, a faj nem él nálunk, csak alkalmilag jelenik meg egy-egy példánya (Buschmann 2022a).
- *⁶³ *Eugnosta magnificana* (Rebel, 1914) – a faj magyarországi előfordulásáról több évtizede (1936 óta) nincs új adatunk (Buschmann 2022a). Nálunk valószínűleg kihalt.
- *⁶⁴ *Cochylis* Treitschke, 1829 – lásd fentebb, az 58-as számú megjegyzést.
- *⁶⁵ *Falseuncaria degreyana* (McLachlan, 1869) – a fajnak az utolsó hazai gyűjtési adatai az 1950-es évek elejéről származnak Kaposvárról és a Budai hegyekből (Buschmann 2022a). Az eltelt évtizedekben előfordulásáról ill. adat-közléséről nincs tudomásunk.
- *⁶⁶ *Acleris fimbriana* (Thunberg & Becklin, 1791) – az MTM gyűjteményében csak a II. világháborút megelőző évtizedekből vannak példányok (Buschmann 2022a). Annak ellenére, hogy a faj fő tápnövénye a kökény (*Prunus spinosa*) és az áfonya (*Vaccinium* ssp.), a Gozmány (1968) fajjegyzékében történt említésen kívül konkrét adatközlés ismereteink szerint eddig nem látott napvilágot a hazai szakirodalomban, melynek feltehetően határozási problémák az okai.
- *⁶⁷ *Cnephasia pumicana* (Zeller, 1847) – mint faunánkra új gabonakártevő fajt Szeőke (1995) ismertette. Fazekas az ivarszerwi vizsgálataira, valamint Razowski (1989, 2001, 2002) munkáira és a vele ezzel kapcsolatos levelezéseire hivatkozva a *pasiuana* (Hübner, 1799) faj szinonim névének minősítette (Fazekas 2010). Emiatt a korábbi magyar névjegyzékekben (Pastorális 2012, Pastorális et al. 2016) is ekként szerepelt. Újabb vizsgálatok szerint azonban a *pumicana* önálló faj, hernyójának életmódjában és tápnövényeiben is különbözik a *pasiuana* fajtól: a *pumicana* főként gabona- (Szeőke 1995) és egyéb fűféléken (*Poaceae*), a *pasiuana* ellenben fészkesvirágzatú növényeken (*Asteraceae*) és más kétszikűeken fejlődik ki, – lásd még a Lepiforum.de weboldalon írottakat (visited 2017.VIII.21).
- *⁶⁸ *Cnephasia eculliana* Réal, 1951 – feromoncsapdai gyűjtésekből faunára újként Sziráki (1980) közölte, de bizonyító példányok az MTM gyűjteményében nincsenek („kipreparálhatatlanul összeragadtak a szárnyaik.” – in pers. comm. Sziráki Gy.), a Buschmann (2012) által közölt Tápió-vidéki előfordulás (Nagykáta, Cseh-domb) bizonyító egyede pedig Ignác Richter (Szlovákia) gyűjteményében található. A fajról egyéb hazai adatközlés nem ismeretes.
- *⁶⁹ *Lozotaenia forsterana* (Fabricius, 1781) – hazai előfordulását Gozmány (1968) és ennek nyomán csak a jelenkori faunajegyzékek említik. A faj egyéb ismertetéséről nincs tudomásunk.
- *⁷⁰ *Isotrias rectifasciana* (Haworth, 1811) – hazai előfordulását Gozmány (1968) fajjegyzékén kívül csak Ács & Szabóky (1993) közölte a Bükk hegységéből, de utóbbi esetében a megha-tározások helyessége ellenőrzést kíván. A faj egyéb közléséről nincs tudomásunk.
- *⁷¹ *Isotrias stramentana* (Guenée, 1845) – a Lepifórumra konkrét adatokkal feltöltött fotó alapján közölte faunára újként Buschmann & Pastorális (2018). (Örkény, 2000.V.11., leg., gen. & det. Rudolf Bryner). Újabb magyarországi adatai az óta nem kerültek közlésre.
- *⁷² *Endothenia ericetana* (Humphreys & Westwood, 1845) – a fajnak eddig csak egyetlen magyarországi példánya ismeretes: Szögliget, 2016.VII.8., leg., det. & coll. Pastorális G. (Buschmann & Pastorális 2019).

- *⁷³ *Endothenia sororiana* (Herrich-Schäffer, 1851) – a faj magyarországi előfordulását csak Gozmány (1968) és ennek nyomán a jelenkori faunajegyzékek említik, a konkrét adatait lásd Buschmann 2022a. Egyéb hazai közléséről nincs tudomásunk.
- *⁷⁴ *Celypha siderana* (Treitschke, 1835) – a fajt Gozmány (1968) faunajegyzékén kívül csak Ács & Szabóky (1993) említi a Bükk hegység több pontjáról. Az óta újabb adatok ezeken kívül nem ismeretesek.
- *⁷⁵ *Phiaris micana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – a fajt *olivana* Treitschke néven jelezte Szabóky (1995) az Őrségből, s ez alapján szerepel a Szabóky et al. (2002) fajjegyzékben. Egyéb adatáról nincs tudomásunk.
- *⁷⁶ *Argyroproce roseomaculana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – a fajt Gozmány (1968) jelezte névjegyzékében és ennek nyomán az ezredforduló utáni fajlisták is feltüntették, ám az MTM gyűjteményében nincs bizonyító példány (Buschmann 2022a). Razowski (2001) szerint „In Mitteleuropa nur aus Ungarn nich bekkant” – azaz „Közép-Európában csak Magyarországról nem ismert”. A fentiekre tekintettel Buschmann (2022a) törölni szándékozta a magyar faunából, ez azonban elcsúszott. Ugyanis a régi névjegyzék (Gozmány 1968) jelzésén kívül Fazekas (2002d) közölte konkrét adatok nélkül a Baranya megye lepkefaunáját ismertető munkájában Kárászról, illetve Dombóvár-Gunarasról 2012.VII. 18-i dátummal (Fazekas et Schreurs 2014). Egyéb közlés nem ismert hazánk területéről.
- *⁷⁷ *Epinotia signatana* (Douglas, 1845) – hazai előfordulását Gozmány (1968) és Jablonkay (1972b), illetőleg ezek nyomán a jelenkori faunajegyzékek említik. Konkrét adatokkal történt (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) közléséről nincs tudomásunk.
- *⁷⁸ *Epinotia cruciana* (Linnaeus, 1761) – publikált adatai eddig csak Szabóky (1981, 2019) közlései által ismeretesek (Buschmann 2022a). Mivel a faj nem szederféléken (*Rubus* ssp.), hanem fűzféléken (*Salix* ssp.) fejlődik ki, a hibás és félrevezető „szeder-tükrösmoly” magyar nevet itt fűzlevél-tükrösmoly-ra helyesbítjük.
- *⁷⁹ *Epinotia nigricana* (Herrich-Schäffer, 1851) – Magyarországról egyetlen simontornyai példány ismeretes (1910.IV.12., leg. Pillich Ferenc, ex larva *Abies excelsa*-ról, coll. MTM; lásd Buschmann 2022a, Gozmány 1968, Szabóky et al. 2014 és jelenkori faunajegyzékek). A faj konkrét adatokkal történt egyéb közléséről több mint száz év óta nincs tudomásunk; nálunk valószínűleg nem is él.
- *⁸⁰ *Pelochrista lugubrana* (Treitschke, 1830) – a faj Gilligan & Wright 2013 nyomán az *Eucosma* nemből át lett sorolva a *Pelochrista* nembe – lásd Lepiforum.de stb. fórumok.
- *⁸¹ *Eucosma fulvana* Stephens, 1834 – Gozmány (1968) még önálló fajként jelezte, később visszaminősítették a *hohenwartiana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) szinonimjává. Agassiz & Langmaid (2004) kifejezetten Nagy-Britanniai tapasztalatok alapján emelték ismét valid faji rangra, ennek helyességét azonban a kontinens példányain végzett beható vizsgálatok sem ivarszervi, sem DNS, sem nevelési/tápnövényi tapasztalatai nem erősítik meg. Emiatt a *fulvana* faji önállósága továbbra is bizonytalan és vitatott, és általában csak a *hohenwartiana* ökológiai formájának tekintik (Haslberger & Segerer 2016, www.Lepiforum.de). A Buschmann (2022b) által közölt s ivarszervileg megvizsgált gyűjteményi példányai (Bükk, Mátra, Tápó-vidék) ennek értelmében nem biztos, hogy valóban „*fulvana*”-k, és az összes, morfológiai alapon ezen a néven meghatározott hazai példány ellenőrzést kíván.

- *⁸² *Eucosma conformana* (Mann, 1872) – Magyarországról csupán az MTM-ben őrzött kettő példány ismert (Budapest, 1929.VI.17. leg. Balogh I., – lásd Buschmann 2022a). A faj újabb közléséről Gozmány (1968) névjegyzéke óta nincs tudomásunk.
- *⁸³ *Eucosma aemulana* (Schläger, 1849) – az MTM gyűjteményében egyetlen, Szöcs József által Száron gyűjtött és *Solidago virga-aurea* szárából kinevelt példány van (1968.VIII.13., leg. Szöcs J.); Buschmann 2022a. A faj hazai előfordulását ennek alapján jelezte Gozmány (1968) és a jelenkori fajjegyzékek. Újabb magyarországi közléséről nincs tudomásunk. Valószínűleg fénykerülő faj.
- *⁸⁴ *Eucosma fervidana* (Zeller, 1847) – a faj előfordulását az MTM gyűjteményében őrzött három, Budapesten gyűjtött példány alapján csak Gozmány (1968) és ennek nyomán a jelenkori faunajegyzékek említik (Buschmann 2022a). Konkrét adatokkal történt (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) egyéb magyarországi közléséről nincs tudomásunk.
- *⁸⁵ *Ancylis myrtillana* (Treitschke, 1830) – a faj előfordulását csak Gozmány (1968) és ennek nyomán a jelenkori faunajegyzékek említik, de az MTM gyűjteményében nincs bizonyító példány és publikált adata sem ismeretes. A máig egyetlen, konkrét adattal történt közlését (Sopron Tolvaj-árok 2004.V.29.) lásd Buschmann 2022a,b.
- *⁸⁶ *Grapholita larseni* (Rebel, 1903) – hazai előfordulását Gozmány (1968), illetve ennek nyomán csak a jelenkori faunajegyzékek említik (Buschmann 2022a). Konkrét (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) adatokkal történt közléséről nincsenek információink.
- *⁸⁷ *Pammene christophana* (Möschler, 1862) – a faj hazai előfordulását Gozmány (1968) és a jelenkori faunajegyzékek említik, lásd Buschmann 2022a. Konkrét adatokkal (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) történt közléséről nincs tudomásunk.
- *⁸⁸ *Pammene ochsenheimeriana* (Lienig & Zeller, 1846) – a faj hazai előfordulását csak Gozmány (1968) és a jelenkori faunajegyzékek említik, konkrét adatokkal (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) történt közléséről nincs tudomásunk (Buschmann 2022a).
- *⁸⁹ *Dichrorampha consortana* Stephens, 1852 – a faj hazai előfordulását több, mint száz évvel ezelőtti egyedek alapján jelezte Gozmány (1968), a jelenkori fajjegyzékek csupán ezt ismétlik – lásd Buschmann 2022a is. Az elmúlt évtizedekben konkrét adatokkal történt (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) újabb példányok közléséről nincs tudomásunk.
- *⁹⁰ *Dichrorampha alpinana* (Treitschke, 1830) – hazai előfordulását csak Gozmány (1968) és a jelenkori faunajegyzékek említik. Az elmúlt évtizedekben a faj konkrét adatokkal történt (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) közléséről nincs tudomásunk.
- *⁹¹ *Holcopogon bubulcellus* (Staudinger, 1859) – Gozmány (1955) hazánk homokos területeire jellemző fajként említi (Gozmány & Szabóky 1986), ennek ellenére előfordulásáról évtizedek óta nincs új publikált adatunk. Újabban *H. adsecllella* (Eversmann, 1844) néven tartják számon és a *bubulcellus* név alfaji névvé degradálódott (lásd Lepiforum.de).
- *⁹² *Schiffermuelleria grandis* (Desvignes, 1842) – a magyar fauna új tagjaként Szabóky (1985) ismertette a Mátrából. Újabb publikált hazai előfordulási adatai az óta nem kerültek nyilvánosságra.
- *⁹³ *Denisia similella* (Hübner, [1796]) – a faj hazai előfordulását Gozmány (1958) Sopronból közölte. Újabb magyarországi közlése csak a Bakonyból ismeretes (Szabóky 2019).

- *⁹⁴ *Pleurota proteella* Staudinger, 1880 – a faunafüzeti sajnálatos elírás (Gozmány 1958) miatt a fajt nálunk évtizedekig *brevispinella* (Zeller, 1847) néven jegyezték: téves interpretálás. A *brevispinella* néven közölt adatok mindegyike a *proteella* Staudinger, 1880 (= *malatya* Back, 1973) fajra vonatkoznak – lásd pl. Buschmann & Pastorális 2018.
- *⁹⁵ **Depressariidae – Laposmolyfélék** – Aarvik et al. 2017, illetőleg Kovács & Kovács 2020a nyomán – lásd még Laštůvka & al. 2023, Pastorális 2022 is.
- *⁹⁶ *Agonopterix thapsiella* (Zeller, 1847) – a fajt egyedül Gozmány (1958) említi Budapestről, a közlés alapja ellenőrzést kíván. Újabb hazai adatáról nincs tudomásunk.
- *⁹⁷ *Agonopterix petasitis* (Standfuss, 1851) – a fajt Gozmány (1958) Budapestről és Dunapenteléről (ma Dunaújváros) ismertette. Újabb hazai adatáról nincs tudomásunk.
- *⁹⁸ *Agonopterix subpropinquella* (Stainton, 1849) – faunára újként Szabóky (1980) Sopronból és Fonyódról közölte, újabb hazai adatáról nincs tudomásunk.
- *⁹⁹ *Agonopterix alstromeriana* (Clerck, 1759) – a fajnév helyes írásmódja *alstromeriana* és nem *alstroemeriana*, ahogy az a magyar szakirodalomban eddig alkalmazásban volt.
- *¹⁰⁰ *Agonopterix angelicella* (Hübner, [1813]) – a faj hazai előfordulását eddig csak Gozmány (1958) ill. Gozmány & Szabóky (1986) közölte Ócsáról. Újabb adatáról nincs tudomásunk.
- *¹⁰¹ *Agonopterix senecionis* (Nickerl, 1864) – faunára újként Szabóky (1981) illetőleg Ronkay & Szabóky (1981) közölte a Zemplénből (Rostalló). Egyéb hazai adata eddig csak a Bakonyból ismeretes (Szabóky 2019).
- *¹⁰² *Agonopterix selini* (Heinemann, 1870) – A Depressariidae család fajait kutató Peter Buchner elvégezte és publikálta az *A. selini* faj példányainak revízióját (Buchner 2017), és annak keretén belül leírta az új neotípust, valamint további két tudományra új fajt, az *A. lessini* és *A. paraselini*-t. Kutatása eredményei szerint az *A. selini* előfordul Magyarországon, viszont a két másik fajról nincs adat. A leírások megjelenése után több példány vizsgálata bebizonyította, hogy az *A. paraselini* előfordul Szlovákiában is (pl. Szlovák karszt NP), ezért szükséges lenne elvégezni a hazai példányok vizsgálatát is, mert valószínű előfordulhat a karszt magyarországi, Jós-vafő-térségi részén is.
- *¹⁰³ *Agonopterix medelichensis* Buchner, 2015 – eddig csak a faj leírásában közölt egyetlen, konkrét adat nélküli (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) magyarországi példánya ismeretes: „Budapest, coll. Staudinger”. A leírást és a hasonló fajoktól történő megkülönböztetést lásd Buschmann & Pastorális 2015; recens előfordulása megerősítést kíván.
- *¹⁰⁴ *Agonopterix doronicella* (Wocke, 1849) – Gozmány (1958) csak régi gyűjtésű egyedek alapján jelezte Budapestről. A fajról újabb adatokat az eltelt évtizedekben tudomásunk szerint senki nem közölt, de Buschmann F. gyűjteményében van egy általa Mátrafüreden 2007.VI.25.-én gyűjtött példány.
- *¹⁰⁵ *Depressaria cervicella* Herrich-Schäffer, [1854] – a fajt Gozmány (1958) Budapestről és Vörösről közölte, egyéb adata csak Petrich (2001b) révén ismert. Újabb publikált példányról az eltelt évtizedekben nincs tudomásunk.
- *¹⁰⁶ *Ethmia iranella* Zerny, 1940 – mint a magyar fauna új tagjáról számolt be Szöcs (1973) Ágasegyházán és Peszéken gyűjtött példányok alapján (lásd Gozmány & Szabóky. 1986 is). A Duna–Tisza közén több helyen lokálisan nem ritka (fénycsapdai adatok), az ország más részein való előfordulása csak Szabóky (2019) révén ismert a dunántúli Literről.

- *¹⁰⁷ *Carcina quercana* (Fabricius, 1775) – a faj rendszertani helyzete az elmúlt évtizedekben többször is változott; hol önálló családként (Peleopodidae), hol alcsaládi vagy tribusszinten (Carcinini) szerepelt s hol az Oecophoridae, hol a Depressariidae családban volt feltüntetve. Jelenleg ismét a Depressariidae család egyik alcsaládja (Peleopodinae – Laštůvka & al. 2023), de feltehetően nem ez a végleges helye.
- *¹⁰⁸ *Odites kollarella* (O. Costa, 1832) – a faj a Lecithoceridae családból áthelyezésre került a Depressariidae családba – lásd Kovács Z. & Kovács S. 2020a és Lepiforum.de.
- *¹⁰⁹ *Ascalenia vanella* (Frey, 1860) – Magyarországról csak a Gozmány (1958) és Petrich (2001) Velencei-tó környéki közlései ismeretesek. A fajról egyéb adatismertetés tudomásunk szerint az utóbbi évtizedekben nem történt.
- *¹¹⁰ *Isidiella nickerlii* (Nickerl, 1864) – a fajnak csak a Gozmány (1958) által közölt budapesti előfordulása ismert. Az eltelt évtizedekben újabb hazai adatáról nincs tudomásunk.
- *¹¹¹ **Gelechiidae – Sarlósajkú-molylepkéfélék** – Huemer & Karsholt 2020 nyomán
- *¹¹² *Aproaerema* Durrant, 1897 (= *Syncopacma* Meyrick, 1925, = *Lixodessa* Gozmány, 1957) – Aarvik et al. 2017 szerint.
- *¹¹³ *Aproaerema wormiella* (Wolff, 1958) – a fajt Gozmány & Szabóky (1986) közölte a Kiskunsági Nemzeti Park molyfaunáját ismertető munkájukban, de az MTM-ben e néven őrzött példányok téves határozásoknak bizonyultak. Ivarszervi vizsgálattal bizonyított *wormiella* egyedről Szabóky et al. (2007) számoltak be először, az óta több más helyről is előkerült.
- *¹¹⁴ *Aproaerema azosterella* (Herrich-Schäffer, 1854) – a fajt Gozmány (1958) Isaszegről közölte, de később már az *albifrontella* Hein. szinonimjának tartva, nem kapott magyar nevet (Gozmány 1968). A fajt Elsner et al. (1999) viszont „Nomen dubium”-nak minősítik. Újabban Bidzilya & Karsholt (2013) a vizsgálataik nyomán újra valid faj rangjára emelték. Nemrég Jan Liška (CZ-Praha, pers. com.) Örkénynél több hím és nőstény egyedet gyűjtötte, ami segíteni tudja majd a határozásokat és revíziókat, mert a nőstény még nem volt ismert. Ez alapján lett meghatározva a Vértesben gyűjtött példány is (Pastorális & Szeőke 2011), így a faj visszakerült faunánk nyilvántartásába.
- *¹¹⁵ *Aproaerema linella* (Chrétien, 1904) – a fajt Gozmány (1957) *schoenmanni* néven írta le és Budapest környékéről közölte. Újabb publikált hazai adatáról csak Petrich (2001b) révén van tudomásunk. Az egyes rokon *Aproaerema* fajoktól csak ivarszervi vizsgálattal választható el, s bizonyára ez az oka, hogy az elmúlt évtizedekben újabb adata nem látott napvilágot.
- *¹¹⁶ *Aproaerema captivella* (Herrich-Schäffer, 1854) – a fajt Gozmány (1958) csak Fonyódról említette ssp. *sarothamnella* Z. néven (lásd még Fazekas 2001 is). Újabb publikált adatáról nincs tudomásunk, de a faj az utóbbi években ismertté vált pl. a gyöngyösi Sár-hegyről (számos példány leg. & coll. Buschmann F.; publikálatlan adatok).
- *¹¹⁷ *Iwaruna klimeschi* Wolff, 1958 – a faj bizonyított hazai előfordulásáról Pastorális (2000) tanulmánya révén van tudomásunk (Csákberény, Bucka-hegy), újabb *klimeschi* adatok a budai Sas-hegyről és a Bakonyból (Szabóky 2012, 2019) vannak. A rokon *Aproaerema* fajoktól megbízhatóan csak ivarszervi vizsgálattal választható el.
- *¹¹⁸ *Mesophleps trinotella* (Herrich-Schäffer, 1856) – a fajt Li & Sattler (2012) vizsgálati megállapításai nyomán a *Crossobela* Meyrick, 1923 nemből átsorolták a *Mesophleps* Hübner, 1825 genus fajai közé (Lepiforum.de).

- *¹¹⁹ *Neofaculta infernella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – a fajt faunára újként Szöcs (1973) közölte Kőszegről és Sopronbátfalváról. Az eltelt évtizedekben újabb hazai előfordulási adata eddig csak a Bakonyból vált ismertté (Szabóky 2019).
- *¹²⁰ *Bryotropa patockai* Elsner & Karsholt, 2003 – tudományra nemrég leírt faj, ismert Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából és Magyarországról. Hazai példányait Szabóky Csaba gyűjtötte az Aggteleki Nemzeti Park területén (Pastorális et al. 2000). Újabb egyedei bizonyára a nehezen felismerhetőség miatt eddig nem kerültek elő.
- *¹²¹ *Bryotropa tachyptilella* (Rebel, 1916) – a faj leírása és elterjedése a faunafüzetben tévesen „*dryadella* Z” (Zeller, 1850) néven jelent meg (Gozmány 1958). Emiatt hosszú ideig e néven közölte minden hazai publikáció az előfordulási adatait. Egyébként nem ritka.
- *¹²² *Bryotropa galbanella* (Zeller, 1839) – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatokat (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására; Karsholt & Razowski, 1996, s ennek nyomán Szabóky et al. 2002: téves. Észak- és Nyugat-európai faj, nálunk nem él, illetve bizonyító példányról vagy publikált hazai adatáról nincs tudomásunk.
- *¹²³ *Bryotropa basaltinella* (Zeller, 1839) – a faunafüzetben (Gozmány 1958) szögletes zárójelben ismertette s a névjegyzékében sem tüntette fel (Gozmány 1968). Előfordulásáról csak Fazekas & Schreurs (2010) és Petrich (2001b) révén van tudomásunk, de a rokon fajokhoz való nagyfokú hasonlósága miatt a meghatározásaik ivarszervi ellenőrzést kívánnak.
- *¹²⁴ *Bryotropa similis* (Stainton, 1854) – a faunafüzetben (Gozmány 1958) még szögletes zárójelben közölte s a későbbi névjegyzékében sincs feltüntetve (Gozmány 1968), Szabóky et al. (2002) viszont – nem tudni milyen alapon – szerepeltetik. Ivarszervileg megvizsgált hazai egyedekről csak Karsholt & Rutten (2005) munkájából értesülhettünk; az MTM gyűjteményé-ben őrzött „*umbrosella* Zeller, 1839” példányok mind a *similis* faj egyedei voltak. Újabb *similis* példányokról azonban azóta sincs tudomásunk.
- *¹²⁵ *Ptycerata (Caulastrocecis) cryptoxena* (Gozmány, 1952) – a Magyarországról (Budapest környékéről) leírt faj, mely évtizedekig a *furfurella* (Staudinger, 1871) szinonimneveként szerepelt. Bidzilya & Karsholt (2021) vizsgálataik nyomán ismét valid faj rangjára emelték, megállapítva a *furfurella*-tól eltérő elterjedési területét is – lásd idézett irodalom és egyéb internetes fórumok. Ennek értelmében tehát a *C. furfurella* (Staudinger, 1871) néven közölt eddigi hazai adatok mind a *cryptoxena* (Gozmány, 1952) fajra értendők és javítandók.
- *¹²⁶ *Megacraspedus* Zeller, 1839 – Huemer & Karsholt 2018 szerint
- *¹²⁷ *Megacraspedus podolicus* (Toll, 1942) – Huemer & Karsholt (2018) vizsgálatai szerint a *Megacraspedus balneariellus* ssp. *podolicus* tulajdonképpen két önálló faj, és megállapították, hogy a *balneariellus* Dél-Európában él, a *podolicus* pedig Ausztria, Magyarország, Románia, Ukrajna és Oroszország területén, és egészen az Altáj hegységig előfordul; lásd Buschmann & Pastorális 2019 is. Következésképp az eddig *balneariellus* ssp. *podolicus* néven közölt hazai adatok mindegyike csak a *podolicus* fajra értendő.
- *¹²⁸ *Megacraspedus lagopellus* Herrich-Schäffer, 1860 – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás magyarországi előfordulására; Karsholt & Razowski 1996, s ennek nyomán Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002. A faj hazai előkerüléséről eddig semmilyen adattal nem rendelkezünk (lásd Gozmány 1958 is).
- *¹²⁹ *Dirhinosisia cervinella* (Eversmann, 1844) – Buschmann (2000) tévesen *Chionodes lugubrella* (Fabricius 1794) néven publikálta, a példányok valójában a *cervinella* (Eversmann, 1844)

faj képviselői (rev. & det. G. Elsner). A helyreigazítás megtörtént (Buschmann 2003, Szabóky 2001, Tokár & Gomány 2004). A *cervinella* eddig csak a gyöngyösi Sár-hegyről ismert hazánkban, és ott is csak ott, ahol a bugás macskamenta (*Nepeta pannonica*) nagyobb számban terem, valódi tápnövénye, hernyója és életmódja azonban továbbra is ismeretlen.

– *¹³⁰ *Psamathocrita* sp. – az eddig ismert kettő in det. hazai példány (Hódmezővásárhely és Csákberény) után nemrég több példány is előkerült a Jászságban (Alattyán, Bereki-erdő, leg. Buschmann). Ezekből néhány el lett küldve molekuláris vizsgálatra és megállapítást nyert, hogy azok a *P. argentella* Pierce & Metcalfe, 1942 faj egyedei (det. J. Junnilainen, pers comm.).

– *¹³¹ *Gladiovalva aizpuruai* Vives, 1990 – Spanyolországból leírt faj, amely feltehetően adventív úton került Közép-Európába; Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is megtalálták (Elsner et al. 1999, Szabóky et al. 2014). Érdekes viszont, hogy a gyűjtési helyek (Kistápe és Tolnanémedi) említésén kívül konkrét, napra szóló adatot tudomásunk szerint hazai periódikában még senki nem publikált.

– *¹³² *Isophrictis anthemidella* (Wocke, 1871) – Gozmány (1958) a faunafüzetben mint a *striatella* faj ökológiai változatát ismertette, az újabb vizsgálatok nyomán önálló faji rangot kapott. Magyarországi előfordulását csak Povolný (1983) jelezte (Bükk hg., Eger, Várhegy, 1941. VI.29., leg. Reskovits), egyéb konkrét hazai adatok (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) eddig nem ismertek. A *striatella* fajtól csak nevelés útján vagy ivarszervi vizsgálattal választható el, ezért szükséges lenne elvégezni a faj hazai, főként hegyvidéki egyedeinek revízióját.

– *¹³³ *Metzneria paucipunctella* (Zeller, 1839) – a hazai szakirodalomban *M. tristella* Rebel, 1901 (ólomszínű sarlósmoly) néven közölt példányok minden bizonnyal téves határozások s az eléggé változatos *paucipunctella* fajhoz tartozó egyedek lehetnek. Ivarszervileg megvizsgált ill. meghatározott „*tristella*” egyed Magyarországról eddig nem ismert, a faunafüzet morfológiai leírásán (Gozmány 1958) alapuló meghatározás pedig nem kielégítő és elfogadható. A valódi *M. tristella* bizonnyaltan csak az Ibériai félszigeten fordul elő, lásd Huemer 2021.

– *¹³⁴ *Metzneria artificella* (Herrich-Schäffer, 1861) – a fajról a faunafüzeti (Gozmány 1958) és a Kiskunsági Nemzeti Park molylepkéit ismertető dolgozat (Gozmány & Szabóky 1986) alföldi adatain kívül egyéb közlés nem található a hazai szakirodalomban, amelynek oka bizonyára a tápnövény (*Echinops ruthenicus*) ma már lokális ritkasága lehet.

– *¹³⁵ *Metzneria subflavella* Englert, 1974 – a fajról irodalmi téren a leíró szerző által közölt peszéri adaton kívül (Gozmány & Szabóky 1986, Elsner et al. 1999), csak Petrich (2001b) révén van tudomásunk. Az elmúlt években viszont több helyről is előkerült: coll. Pastorális MTM-gyűjtemény; coll. Buschmann Jászberény; Lepiforum.de-képtár (nem publikált adatok).

– *¹³⁶ *Pragmatodes parvulata* (Gozmány, 1957) – a fajt a leírásakor és a faunafüzetben történt ismertetésében Gozmány (1958) egyaránt csak a Budakeszi Hársbokor-hegyről közli. Újabb hazai adatáról azóta sincs tudomásunk.

– *¹³⁷ *Monochroa simplicella* (Lienig & Zeller, 1846) – a fajt Gozmány (1958) nem ismertette a faunafüzetben, de az MTM gyűjteményében van egy példány Bátorligetről (védett láp, 1949. VI.30., leg. Kaszab Z., det. Ole Karsholt 1986). Ez alapján került fel az európai checklistára (Karsholt & Razowski 1996), s onnan át a hazai fajjegyzékekbe (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002 stb.). Újabb gyűjtési adatáról ellenben nincs tudomásunk.

– *¹³⁸ *Monochroa niphognatha* (Gozmány, 1953) – a fajt a leírásakor és a faunafüzetben Gozmány (1953, 1958) egyaránt csak a bátorligeti őslápból említi. Azóta adatot senki nem publikált.

róla. Újabb példánya a Tápió-vidékről került elő (Tápióság, Nagy-rét, 2014.VI.21., leg. & coll. Buschmann F., det. Z. Tokár); publikálatlan adat.

– *¹³⁹ *Monochroa* sp. 1 – kinézete és információk a fajról az Elsner et al. (1999) Közép-Európa sarlósajkú molyait (Gelechiidae) bemutató könyvében található. A faj leírására majd a készülő *Monochroa* genusz revízióját tárgyaló tanulmány keretén belül kerül sor, melynek feldolgozása folyamatban van.

– *¹⁴⁰ *Sophronia grandii* Hering, 1933 – a fajt Gozmány (1958) a faunafüzetben nem közölte, a későbbi fajjegyzékében viszont az *ascalis* Gozmány, 1951 mellett olasz sarlósmoly magyar névvel már szerepelt (Gozmány 1968); az ezredforduló első fajlistái (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002) ezt nem vették figyelembe. A közelmúlt beható vizsgálatai kiderítették, hogy a két faj (*ascalis* & *grandii*) lényegében egy faj, így a prioritás értelmében a *grandii* Hering, 1933 az érvényes név (Huemer & Karsholt 2020). Következésképp az eddigi összes hazai *ascalis*-közlés *grandii*-ként értendő, a magyar név viszont marad az *ascalis* turjáni sarlósmoly neve.

– *¹⁴¹ *Filatima ukrainica* Piskunov, 1971 – a fajt faunára újként Szabóky et al. (2006) közzölték egy Gyón-Dabason Schmidt Antal által 1917-ben gyűjtött s ivarszervileg azonosított példány alapján. Ismereteink szerint újabb egyede az elmúlt bő száz évben még nem került elő.

– *¹⁴² *Chionodes luctuella* (Hübner, 1793) – Gozmány (1958) Budapestről közölte. A fajról újabb ismertetés az elmúlt évtizedekben nem látott napvilágot.

– *¹⁴³ *Chionodes ignorantella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – eddig csak egyetlen példánya ismert Izsákról (Gozmány et al. 1985). A fajról újabb ismertetés az elmúlt évtizedekben nem látott napvilágot.

– *¹⁴⁴ *Gelechia asinella* (Hübner, [1796]) – Gozmány (1958) konkrét lelőhelyi adat nélkül a Zemplén hegységből közölte; Szabóky (2018) csak ezt ismétli. A fajról adatismertetés az utóbbi évtizedekben nem látott napvilágot

– *¹⁴⁵ *Gelechia basipunctella* Herrich-Schäffer, [1854] – Gozmány (1958) a faunafüzetben *Lita albicans* Heinemann néven közölte Budapestről, illetőleg Budaörsről (Gozmány 1985). A faj újabb hazai publikált adatáról nincs tudomásunk.

– *¹⁴⁶ *Gnorimoschema herbichii* (Nowicki, 1864) – a fajt Gozmány (1958) a Budakeszi Hársborkor-hegyről közölte. Az eltelt évtizedekben újabb hazai adatról nincs tudomásunk.

– *¹⁴⁷ *Scrobipalpa halonella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – a fajt csak Elsner et al. (1999) és Povolný (2002) említik Magyarországról (mindkét forrás Budapest környékéről jelezte), de a pontos adat nem ismert. Hazai periodikában eddig még senki nem publikálta, előfordulása azonban – mint a vastövű imola (*Centaurea scabiosa*) levelein kifejlődő faj – nem zárható ki, a félrevezető *fehérüröm-sarlósmoly* magyar név pedig imolalevél-sarlósmoly-ra változik.

– *¹⁴⁸ *Scrobipalpa pauperella* (Heinemann, 1870) – sokáig csak Elsner & al. (1999) és Povolný (2002) nyomán tartottuk nyilván faunánkban. Recens adatát Szabóky (2010) *klimeschi* Povolný, 1967 néven a Naszályból közölte, ill. Pastorális & Szeőke (2011, 2018) a Vértes hegységből. Egyéb hazai előfordulásáról nincs tudomásunk.

– *¹⁴⁹ *Scrobipalpa stangei* (Hering, 1889) – a fajt Gozmány (1958) *Gnorimoschema saltenellum* Schöyen néven (helyesen *saltenella* Meess, 1910) a bocsai homokos-szikes területekről jelezte, illetve ennek nyomán a Közép-Európa sarlósajkú molyait (Gelechiidae) bemutató könyvükben Elsner et al. (1999) említik. Gozmány (1958) óta újabb hazai előfordulási adatáról nem tudunk.

– *¹⁵⁰ *Scrobipalpa gallicella* (Constant, 1885) – a faj magyarországi előfordulásáról eddig csak Povolný (2002) konkrét adatokat (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalása nyomán van tudomásunk. Publikált adata hazai periodikából nem ismeretes, de Buschmann F. gyűjte-ményében van kettő, ivarszeri vizsgálattal meghatározott egyed a farmosi szikeseokról.

– *¹⁵¹ *Scrobipalpa salinella* (Zeller, 1847) – Gozmány (1958) még *salicorniae* Her.(ing) néven ismertette, az egy évtizeddel későbbi fajjegyzékében (Gozmány 1968) viszont már *salinella* Z. = *salicorniae* Her. néven adta közre. Szöcs (1977) és Povolný (2002) munkáiban is ekként találjuk, Petrich (2001) pedig szinonimnév nélkül Agárdról, Dinnyésről és Pákozdról jelezte. Egyéb publikált adatai nem ismertek, de úgy tudjuk, Hódmezővásárhelyen és a Hortobágyon is gyűjtötték. A közelmúlt vizsgálatai viszont azt bizonyították, hogy a *salicorniae* (Hering, 1889) és a *salinella* (Zeller, 1847) két különálló, valid faj (Huemer & Karsholt 2010). Így szerepelnek már a Lepiforum.de weboldalon is (visited 2023.X.15.). Az ott bemutatott fotókon jól láthatók a két faj közötti különbségek. Hogy a magyarországi *salinella* egyedek között van-e *salicorniae* példány is, annak megállapítására a rendelkezésre álló anyag vizsgálata szükségeltetik.

– *¹⁵² *Scrobipalpula tussilaginis* (Frey, 1867) – a fajt Gozmány (1958) a Fauna Regni Hungariae-ra hivatkozva közölte, Szöcs (1977) ezt megismételve kiegészíti: „magyarországi bizonyító példány nem ismeretes”. A fajról publikált adatközlés eddig csak Epölről ismert (Szabóky & Kutassy 2013).

– *¹⁵³ *Ephysteris diminutella* (Zeller, 1847) – Gozmány (1958) *Gnorimoschema diminutella* Rbl. néven Győnről közölte, Jablonkay (1972) pedig Egerből jelezte. A későbbi névjegyzékben *Ephysteris subdiminutella* STT. és homoklakó sarlósmoly néven jelent meg (Gozmány 1968, 1985) és Petrich (2001) is ezen a néven publikálta Agárdról. Az ezredforduló utáni első fajlisták (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002) viszont Povolný 2002 nyomán kihagyták. A *diminutella*-t nemrég megtalálták Szlovákiában (Pastoralis & al. 2013), így nem meglepő, hogy nálunk is újra megkerült (Gyöngyös, Sár-hegy, 2016.VII.2., leg., det. & coll. Jan Liška). Ezáltal a *diminutella* Zeller, 1847 faj visszakerülhetett a hazai molyfauna nyilvántartásába.

– *¹⁵⁴ *Caryocolum junctella* (Douglas, 1851) – a fajt eddig csak Gozmány (1958) közölte Simon-tornyáról, Szabóky et al. (2014) csupán ezt ismétlik. Újabb hazai adatáról az elmúlt évtizedekben nem jelent meg közlemény.

– *¹⁵⁵ **Elachistidae – Fűaknázó-molyfélék** – Kaila 2019 nyomán

– *¹⁵⁶ *Perittia farinella* (Thunberg, 1794) – a fajt eddig csak Budapestről és Izsákról ismerjük (Gozmány 1955, Gozmány & Szabóky 1986). Annak ellenére, hogy a hátulsó szárnyainak erezete alapján (az M³ – Cu¹ ér különálló) biztonsággal elválasztható a színében és méretében rendkívül hasonló *Elachista argentella* fajtól, feltehetően az azzal összetéveszthetőség okán az említett irodalmi források kivételével egyéb publikált hazai adatáról nincs tudomásunk.

– *¹⁵⁷ *Stephensia brunnicella* (Linnaeus, 1767) – a fajnak eddig csak a Gozmány (1955) és Szöcs (1977) által ismertett budapesti és kaposvári előfordulása ismert, a későbbi közlések (Fazekas 2001a, Szabóky 1982b) csupán ez utóbbit ismétlik. Újabb publikált adatáról nincs tudomásunk.

– *¹⁵⁸ *Elachista festucicolella* Zeller, 1853 – a faj szerepelt a faunafüzetben (Gozmány 1955) és homoki fűaknázómoly névvel a régi névjegyzékben is (Gozmány 1968), de később (Gozmány 1985) téves határozás miatt törölte. Szabóky (2004) az általa gyűjtött és ivarszerileg meghatározott példányát így faunára újként közölhette, de már ezt megelőzően is publikálta *klimeschi* Parenti, 1981 néven (Szabóky 1998). A *klimeschi* név azonban csak a *festucicolella* szinonimája (Kaila & al., 2015). Az *E. festucicolella* új adata Fazekas & Schreurs (2014) révén ismeretes.

- *¹⁵⁹ *Elachista disemiella* Zeller, 1847 – hazai előfordulását egyedül Gozmány (1955) említi Budapestről. Újabb adatáról nincs tudomásunk, aminek egyik oka az lehet, hogy külső alaktani ismérvek alapján a fehér alapszínű rokon fajktól elválasztani nem lehet.
- *¹⁶⁰ *Elachista pomerana* Frey, 1870 – a fajt Gozmány (1955) egyetlen Ócsán talált akna alapján közölte. Bizonyító példány csak a közelmúltban vált ismertté a csákerényi Bucka-hegyről (Pastorális & Szeőke 2018). Egyéb publikált adatáról nincs tudomásunk.
- *¹⁶¹ *Elachista elegans* Frey, 1859 – a magyar faunára újként Ács & Szabóky (1993) ismertette a Bükkből; a meghatározás ellenőrzést kíván. A faj egyéb hazai közléséről nincs tudomásunk.
- *¹⁶² *Heinemannia laspeyrella* (Hübner, [1796]) – eddig egyedül Gozmány (1958) ismertette Budapestről. Újabb publikált adatáról nincs tudomásunk.
- *¹⁶³ *Coleophora (Metriotes) lutarea* (Haworth, 1828) – Aarvik et al. (2017) és a Lepiforum.de weboldal (visited 2017.V.14) nyomán.
- *¹⁶⁴ *Coleophora (Goniodoma) auroguttella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – Aarvik et al. (2017) és a Lepiforum.de weboldal (visited 2017.V.14) nyomán.
- *¹⁶⁵ *Coleophora violacea* (Ström, 1783) – a faj helyes és érvényes tudományos és magyar neve csak a közelmúltban került tisztázásra (Buschmann & Richter Ig. 2015). A fajnak közel száz év után a Szabóky et al. (2009) által közöltek az első konkrét hazai adatai.
- *¹⁶⁶ *Coleophora frischella* (Linnaeus, 1758) – a *trifolii* – *frischella* – *alcionipennella* fajnevek körüli határozási és nevezéktani anomáliákat Stübner (2007) tisztázta. Ennek nyomán került sor a hazai fajok és magyar neveik revíziójára (Buschmann et al. 2014), mely dolgozatban faunára új fajok is bemutatásra kerültek.
- *¹⁶⁷ *Coleophora cuprariella* Lienig & Zeller, 1846 – ezen a néven Szöcs adatát (Leányfalu, 1971.VI.3. leg. Szöcs J.) Szabóky (1981b) közölte faunára újként, de bizonyító példány nincs az MTM gyűjteményében. A faj később az *alcyonipennella* (Kollar, 1832) szinonimjává minősült vissza (Gozmány 1985, Baldizzzone & al. 2006). Stübner (2007) revideálta ezt az álláspontot és a *cuprariella*-t újra valid státuszba helyezte, a faj elterjedése viszont csak Törökország és egyes közeli görög szigetekre terjed ki, Magyarországig nem hatol.
- *¹⁶⁸ *Coleophora niveiciliella* O. Hofmann, 1877 – Magyarországról csak a Gozmány (1956) által említett s az 1910-es években gyűjtött példányok ismertek (Budapest, Farkas-völgy, leg. Uhrik-Mészáros Tivadar, coll. MTM). Tápnövénye az irodalom szerint az *Inula conyza*. Az említett élőhely azóta elpusztult, jobbára beépítésre került, a faj eltűnt a magyar faunából.
- *¹⁶⁹ *Coleophora eurasiatica* Baldizzzone, 1989 – hosszú ideig csak a leírás alapjául szolgáló példányok voltak ismertek faunánkban (ezek a bizonyító egyedek Baldizzzone gyűjteményében vannak). Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, diszjunkt elterjedésű faj; erre utal a neve is. Az *eurasiatica* igen hasonlít a *niveicostella* és *albicostella* fajokhoz, azonban kisebb és szürkésebb árnyalatú. Az utóbbi években a Duna–Tisza közének homokos tájain több helyről is előkerült (Buschmann 2012b, Buschmann et al. 2014, Buschmann & Ig. Richter 2016).
- *¹⁷⁰ *Coleophora variicornis* Toll, 1952 – az Issekutz által Pécsen gyűjtött két példány *hieronella* Zeller, 1849 néven volt nálunk is nyilvántartva, melynek szinonimájaként szerepelt a *variicornis*. A *variicornis* önálló faji státuszát Nuss & Stübner (2003) vizsgálatai nyomán kapta vissza. Az MTM Coleophoridae gyűjteményének rendezése során ivarszervileg is megvizsgált említett *hieronella* példányok viszont *variicornis*-nak bizonyultak, ezért törlődött a faunánkból (Buschmann

et al. 2014, Buschmann & Ig. Richter 2016), helyébe a *variicornis* Toll, 1952 fajnév került. A *variicornis* az utóbbi években több helyről is előkerült hazánkban.

– *¹⁷¹ *Coleophora dignella* Toll, 1961 – a faunafüzetben és a régi névjegyzékben (Gozmány 1956, 1968) Staudinger téves megnevezése által egyaránt „*colutella* F.” néven került közlésre, az ezredforduló utáni fajjegyzékekben pedig *kasyi* Toll, 1961 néven szerepelt (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002). A név körüli többszörös anomália csak Baldizzzone & Tabell 2005-ös dolgozata nyomán került tisztázásra (Buschmann et al. 2014), a faj helyes és érvényes nevének első említésével viszont már Szabóky (2011) Kohanóczy Attila molylepke-gyűjteményéről írott munkájában találkozhattunk.

– *¹⁷² *Coleophora obscenella* Herrich-Schäffer, [1855] – a faj a faunafüzetben (Gozmány 1956) és a régi névjegyzékben (Gozmány 1968), továbbá számos hazai közleményben *virgaureae* Stainton, 1857 néven szerepelt: téves. Magyarországon nem a *virgaurea*, hanem az *obscenella* faj él, – lásd a törölt fajknál is (Buschmann & Richter Ig. 2015).

– *¹⁷³ *Coleophora nomgona* Falkovitsh, 1975 – a faj a faunafüzetben és a régi névjegyzékben (Gozmány 1956, 1968) tévesen „*quadrifariella* Staudinger, 1880” néven szerepelt, a Tompánál és Kelebiánál gyűjtött egyedek ellenben a később leírt *nomgona* fajhoz tartoznak – lásd a törölt fajknál is. Az elmúlt bő fél évszázadban újabb példányok előkerüléséről nincs információink (Buschmann et al. 2014); a környezeti változások következtében valószínűleg már kipusztult faunánkból.

– *¹⁷⁴ *Coleophora bucovinella* Nemes, 1968 – az utóbbi évek vizsgálatai kimutatták, hogy a tévesen az *albilineella* Toll, 1960 faj szinonimjának tartott *bucovinella* faj önálló és ez honos Közép-Európában, míg az *albilineella* csak az Ibériai-félszigeten fordul elő (Baldizzzone et al. 2006, Buschmann & Richter 2015).

– *¹⁷⁵ *Coleophora musculella* Mühlig, 1864 – Gozmány (1956) Budapestről, Szócs (1977) Nagykovácsiról közölte, de a fajnak az MTM gyűjteményében nincs bizonyító példánya. Buschmann (2012) a Tápió-vidékről közölte ugyan, ez azonban téves határozáson alapult. Jelenleg nem rendelkezünk hazai bizonyító egyeddel. A *musculella* magyarországi előfordulása ezért kérdéses, és valószínűleg nem él nálunk.

– *¹⁷⁶ *Coleophora paripennella* Zeller, 1839 – a „*paripennella*” fajnév körüli anomáliák csak nemrég kerültek tisztázásra. Magyarországon a *C. paripennella* eddig csak Szakonyfaluról (coll. MTM.), Epölről (Szabóky & Kutassy 2013) és a gyöngyösi Sár-hegyről (Buschmann & Ig. Richter 2015) ismert (lásd még a *C. violacea* fajnál írottakat is).

– *¹⁷⁷ *Coleophora ucrainae* Baldizzzone & Patzak, 1991 – ivarszervi vizsgálat révén bebizonyosodott, hogy az irodalmi előzmény nélkül Gozmány által listára felvett „*C. champhorosmella* Constant, 1885” (Gozmány 1968) – azaz *punctulatella* Zeller, 1849 (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002) – valójában a később leírt *ucrainae* faj képviselője (Buschmann & Pastorális 2015, Buschmann & Ig. Richter 2016). A bizonyító példány azóta sajnos elpusztult, létezéséről csak a róla készült fotó tanúskodik (Szeged, Fehér-tó, 1952.VIII.13., leg Gozmány L., GP. 19951 IgR, rev. & det. Budashkin; fotó www.coleophoridae.bluefile.cz). A bárányparéjos (*Champhorosma annua*-s) élőhelyekhez kifejezetten ragaszkodó *ucrainae* újabb egyedei az elmúlt évtizedekben még nem kerültek elő, igaz, nem is kereste senki.

– *¹⁷⁸ *Coleophora salicorniae* Heinemann & Wocke, 1877 – az MTM gyűjteményében e néven őrzött két példány ivarszervi vizsgálata során bebizonyosodott, hogy azok téves határozások voltak (Buschmann 2016). Azóta a faj célzatos kutatás révén több helyen is előkerült (Szabóky &

Takács 2019) és tudomásunkra jutott egy Dabas-Örkényen gyűjtött, ivarszervi vizsgálattal igazolt hiteles példány is.

– *¹⁷⁹ **Scythrididae – Zöldmolyfélék:** – a hazai szakirodalmi ismeretek és adatközlések, valamint a nemzetközi nyilvántartások között (pl. Bengtsson 1997) számos eltérés mutatkozik – lásd alább, az egyes fajokra vonatkozó megjegyzéseket. Ezért a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) vonatkozó gyűjteményi részének mielőbbi szakmai revíziójára és az irodalmi közlések egyeztetésére lenne szükség.

– *¹⁸⁰ *Scythris subseliniella* (Heinemann, 1877) – Gozmány (1955) csak Simontornyáról említi (a soproni előfordulásról bizonyító példány nem áll rendelkezésre – lásd u.o.), a meghatározás azonban kétséges. Ugyanis a faj ismert elterjedési területe Dél-Franciaországra korlátozódik. A *subseliniella* hazai előfordulásáról adat az eltelt évtizedekben nem látott napvilágot.

– *¹⁸¹ *Scythris tabidella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – a fajt egyedül Gozmány (1955) jelezte Budapestről. Hazai közleményben az eltelt évtizedekben újabb adata nem látott napvilágot.

– *¹⁸² *Scythris aerariella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – Gozmány (1955) szintén Budapestről közölte. Újabb adata csak a Bakonyból ismert (Szabóky 2019).

– *¹⁸³ *Scythris flaviventrella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – a fajt Gozmány (1955) bizonyító példány nélkül Wocke igen régi irodalmi utalására hivatkozva említette a faunafüzetben, az ezredforduló utáni névjegyzékek csupán ezt ismétlik. Magyarország jelenkori területéről semmilyen konkrét publikált *flaviventrella* adatunk nincs.

– *¹⁸⁴ *Scythris subcinctella* (Bruand, [1851]) – a fajnak ivarszervi vizsgálattal megerősített előfordulása eddig csak – *crassiuscula* (Herrich-Schäffer, [1855]) néven – Csákberényből, a Bucka-hegyről ismert (Pastorális 2000). Egyéb hazai adatáról nincs tudomásunk.

– *¹⁸⁵ *Scythris bifissella* (O. Hofmann, 1889) – a fajt csak Karsholt & Razowski (1996) európai checklistája illerőleg Bengtsson (1997) Európa Scythrididáit ismertető könyve alapján tartották nyilván az ezredforduló utáni magyar névjegyzékek. Konkrét hazai adatával csak Pastorális & Szeőke (2011, 2018) Vértes hegységről írott dolgozataiban találkozhatunk.

– *¹⁸⁶ *Scythris pascuella* (Zeller, 1855) – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására (Bengtsson 1997, Karsholt & Razowski 1996, Karsholt & Nieukerken 2007, version 1.3, és ezek nyomán Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002). Hazai periódikában a fajról adat még nem látott napvilágot.

– *¹⁸⁷ *Scythris terrenella* (Zeller, 1847) – a fajt Gozmány (1955) a faunafüzetben *parvella* HS. néven Sopronból közölte, majd mint faunára új fajt *terrenella*-ként Szabadszállásról (Gozmány & Szabóky 1986). Később *tributella* néven Buschmann (2012d) a Tápió-vidékről (Farmos) Szabóky és társai (2014) Tolnanémediből, illetve Szabóky (2019) a Bakony hegység több pontjáról jelezte. A faj nevezéktanával és elterjedési kérdéseivel nemrégiben Bengtsson (2024) foglalkozott s megállapította, hogy a *tributella* (Zeller, 1847) úgy tűnik csak Szicíliában élő endemikus faj, a *terrenella* (Zeller, 1847) = *parvella* Herrich-Schäffer, 1855 viszont szinte egész Európában, Közép- és Dél-Európában pedig gyakori. Bengtsson (2024) megállapításai szerint tehát a hazánkban eddig *parvella* illetőleg *tributella* néven közölt előfordulási adatok a *terrenella* (Zeller, 1847) fajra érvényesek.

– *¹⁸⁸ *Scythris paullella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – csak Gozmány (1955) említette kétes adatként Peszéréről, bizonyító példány nélkül. A fajról adatismertetés (pontos helyszín, dátum, gyűjtő) ismereteink szerint még nem látott napvilágot hazánkból.

- *¹⁸⁹ *Scythris palustris* (Zeller, 1855) – Bengtsson (1997) nyomán került a hazai fajok nyilván-tartásába (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002) annak ellenére, hogy a szerző nem említette Ma-gyarországot, csak általánosságban Közép-Európát. A fajnak konkrét hazai előfordulása máig nem ismeretes, de élőhelyigénye és tápnövényei révén (mohafélék és *Hieracium pilosella*) nem zárható ki.
- *¹⁹⁰ *Scythris laminella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – a fajt eddig csak Gozmány (1955) közölte Simontornyáról. Konkrét adata az eltelt évtizedekben hazai közleményben nem látott napvilágot.
- *¹⁹¹ *Scythris apicistrigella* (Staudinger, 1870) – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatot nélkülöző utalás (pontos helyszín, dátum, gyűjtő) a faj magyarországi előfordulására (Karsholt & Nieukerken 2005, Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea, version 1.2).
- *¹⁹² *Scythris knochella* (Fabricius, 1794) – számunkra ismeretlen eredetű, ugyancsak konkrét adatot nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására (Karsholt & Nieukerken 2005, Lepi-doptera, Moths. Fauna Europaea, version 1.2).
- *¹⁹³ *Scythris punctivittella* (O.Costa, 1836) – számunkra ismeretlen eredetű, szintén konkrét adatot nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására (Karsholt & Nieukerken 2005, Lepi-doptera, Moths. Fauna Europaea, version 1.2).
- *¹⁹⁴ *Blastobasis glandulella* (Riley, 1871) – a faj *Blastobasis huemeri* Sinev, 1994 és erdei avarevómoly néven vált ismertté a magyar faunában. Úgy tűnik, élőhelyekben azonban nem vá-logatós, és az erősen szikes helyek kivételével mindenütt előfordul, többfelé gyakori.
- *¹⁹⁵ *Mompha conturbatella* (Hübner, 1819) – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatok nélküli (pontos helyszín, dátum, gyűjtő) utalás a faj magyarországi előfordulására (Koster & Si-nev 2003, Karsholt & Nieukerken 2005, 2007. Hazai előfordulásáról/adatáról eddig nincs tuda-másunk.
- *¹⁹⁶ *Mompha confusella* Koster & Sinev, 1996 – a faj Koster & Sinev (2003) alapján került a magyar névjegyzékbe (Szabóky et al. 2006), pontos hazai adatait Fazekas (2008b) publikálta. Újabb előfordulásokról nincs tudomásunk.
- *¹⁹⁷ *Mompha sturnipennella* (Treitschke, 1833) – Gozmány (1958) és Szöcs (1977) is *nodicol-ella* Fuchs néven közzéték Kaposvárról. A fajnak az elmúlt évtizedekben újabb hazai adatai nin-csenek.
- *¹⁹⁸ *Lypusa tokari* Elsner, Liška & Petrů, 2008 – a faj leírásakor a megvizsgált magyarországi egyedek között a szerzők nem találtak *L. maurella* példányt, ezért a *maurella* magyarországi elő-fordulása kérdéses, megjegyezve, hogy a *maurella* és *tokari* fajok csak ivarszervi vizsgálat által választhatók szét. Igen érdekes viszont, hogy Aarvik et al. (2017) Észak-Európa minden orszá-gából, újabban pedig Csehországból is (Laštůvka & al. 2023), csak a *maurella*-t jelzik s nem a *tokari*-t. Lehet, hogy nálunk mind a két faj él.
- *¹⁹⁹ *Amphisbatis incongruella* (Stainton, 1849) – hazánkból csak a Gozmány (1958) által közölt igen régi budapesti előfordulásáról tudunk. Újabb publikált adata nem ismeretes.
- *²⁰⁰ *Acharia apicalis* (Dyar, 1901) – a fajt *A. stimulea* (Clemens, 1860) néven közölte Gyulai P. & Gyulai P.-né. Az óta kiderült, hogy az Európába behurcolt lepkefaj az *Acharia apicalis* és nem a *stimulea*. Magyarországról eddig csak egyetlen adattal rendelkezünk (Gyulainé Garai A. & Gyulai P. 2008). Úgy tűnik, a faj hazánk területén nem telepedett meg.

- *²⁰¹ *Jordanita fazekasi* Efetov, 1998 – a Villányi- és a Mecsek hegységben gyűjtött példányok alapján Magyarországról leírt faj, újabb adatai nem ismeretesek (Fazekas 2002a, 2009).
- *²⁰² **Sesiidae – Szitkárfélek (üvegszárnyú-lepkék):** – Fazekas (2017) nyomán.
- *²⁰³ *Microsphecia* (*Zenodoxus*) *brosiformis* (Hübner, [1813]) – a fajt Issekutz (1955) *Microsphecia tineiformis* ssp. *brosiformis* néven közölte az ország néhány pontjáról. Jelen ismereteink szerint önálló, valid fajok: *tineiformis* (Esper, 1789) és *brosiformis* (Hübner, [1813]). Az ezredforduló után megjelent listákon (Fazekas 2002, Szabóky et al. 2002) mindkét név szerepel, utóbbiban lucernaszitkár, illetve kígyószisz-szitkár magyar nevekkal. Ma már tudjuk, hogy a déli elterjedésű *tineiformis* areája nem éri el a Kárpát-medencét, és bizonyító példány hiányában Pastorális (2007) törölte. A *brosiformis* fajt Fazekas (2004) Pécsről, illetőleg az ország több pontjáról jelezte a *Tinthia*-génusz tagjaként (Fazekas 2017), az érvényes és elfogadott rendszertani besorolás szerint azonban a *Microsphecia* nembe tartozik. A *brosiformis* folyófün (*Convolvulus*) él, ezért a megtévesztően hibás magyar nevét („kígyószisz-szitkár”; Fazekas 2017, Szabóky et al. 2002) folyófüszitkár névre helyesbítjük.
- *²⁰⁴ *Sesia melanocephala* Dalman, 1816 – a faj magyarországi előfordulásáról csak Laštůvka (1990) adatok nélküli (pontos helyszín, dátum, gyűjtő) közlése nyomán tudtunk, pontos hazai előfordulását Fazekas (2017) közölte.
- *²⁰⁵ *Synanthedon flaviventris* (Staudinger, 1883) – számunkra ismeretlen eredetű, konkrét adatot (pontos helyszín, dátum, gyűjtő) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására (Karsholt & Razowski, 1996, Karsholt & Nieukerken 2007, Szabóky et al. 2002). Hazai bizonyító példányról nincs tudomásunk – lásd Fazekas 2017.
- *²⁰⁶ *Chamaesphecia anatolica* Schwingenschuss, 1938 – Karsholt & Razowski (1996) konkrét adatot nélkülöző utalása nyomán került az ezredfordulót követő magyar fajlistákra (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002, Pastorális 2007 stb.); Fazekas (2017) pedig Zdenek Laštůvka szóbeli közlésére hivatkozva Gyöngyössolymosról említi. A fajnak egyéb hazai előfordulása nem ismeretes.
- *²⁰⁷ *Chamaesphecia masariformis* (Ochsenheimer, 1808) – a faj Issekutz (1955) szerint „...hazánkban a homokos területeken található”. Hazai előfordulásáról az eltelt évtizedekben újabb adatokkal történt közlésről nincs tudomásunk, Fazekas (2017) is csak ezeket a régi lelőhelyeket ismerteti.
- *²⁰⁸ *Chamaesphecia crassicornis* Bartel, 1912 – hazai előfordulásáról Z. Laštůvka (1990) illetőleg Fazekas (2017) közlése nyomán van tudomásunk, utóbbi Budapestről említi. A fajról egyéb konkrét magyarországi adatok nem ismertek.
- *²⁰⁹ *Synaphe antennalis* (Fabricius, 1794) – Gozmány (1963) bizonyító példány nélkül még *connectalis* néven ismertette Budapestről. Első hiteles hazai adatát Fazekas (1986) a Mecsekből (Kárász) közölte. Újabb adata viszont az óta nem ismeretes.
- *²¹⁰ **Phycitinae** – Slamka 2019 szerint
- *²¹¹ *Pempeliella bulgarica* Slamka & Plant, 2016 – az MTM gyűjteményében őrzött Uhrík-Mészáros Tivadar által 1912-ben a Farkas-völgyben gyűjtött *Pempeliella sororiella* példányok felülvizsgálata kimutatta, hogy azok az újonnan leírt *P. bulgarica* fajhoz tartozó egyedek. Újabb magyarországi példányok Uhrík gyűjtései óta nem ismeretesek, viszont a faj a Szlovák-karszt Nemzeti Park területén egyes helyeken nem ritka (pl. Pelsőc). Valószínűleg a magyarországi oldalon (Aggteleki NP) is előfordul, de figyelmen kívül marad, ill. nincs felismerve.

- *²¹² *Pima boisduvaliella* (Guenée, 1845) – csak igen régi adataink vannak az ország középső részéről és Kemenessömjénről. Az utóbbi évtizedekben a faj nem került elő hazánk területén.
- *²¹³ *Pempelia compositella* (Treitschke, 1835)) – csak a közelmúltban került átsorolásra a *Khorassania* nemből a *Pempelia* génuszba (Slamka 2019). Úgy tűnik – lásd Lepiforum, hogy a faj fő tápnövénye nem az üröm (*Artemisia*), hanem a napvirág (*Helianthemum chamaecistus*).
- *²¹⁴ *Phycita torrenti* Agenjo, 1962 – a fajt Gozmány (1963) *Ph. metzneri* néven Budapestről közölte, az MTM gyűjteményében őrzött „metzneri” példányok felülvizsgálata viszont kimutatta, hogy azok az Agenjo által leírt *torrenti* fajhoz tartozó egyedek (Pastoralis & Slamka 2015). A *torrenti* faj újabb példányairól nemrég Szabóky (2014) közölt új adatokat. Egyébként a *Phycita metzneri* (Zeller, 1846) érvényes neve újabban *Ph. poteriella* (Zeller, 1846), lásd Plant & Slamka 2016.
- *²¹⁵ *Hypochalcia propinquella* (Eversmann, 1842) – a fajt Gozmány (1963) *affiniella* HS.-ként ismertette, de a hazai molylepkék nevezéktani és taxonómiai helyzetét helyesbítő dolgozatában (Gozmány 1985) már *bruandella* Guenée, 1845 = *affiniella* Herrich-Schäffer, 1849 néven közölte. A későbbi vizsgálatok nyomán a *bruandella* faj alfaji szinten áthelyeződött a *propinquella* (Eversmann, 1842) fajhoz, és így találjuk a legutóbbi magyar fajjegyzékekben is; *propinquella* subsp. *bruandella* Guenée, 1845 = *affiniella* Zeller, 1848 (Pastoralis 2012, Pastoralis et al. 2016). A *bruandella* faj körüli problémával nemrég Leraut (2014) foglalkozott ismét, és annak faji státuszát revidálva önálló faji rangra emelve megállapította, hogy az csak Franciaországban és Olaszország északi részén fordul elő, míg a *propinquella* Ausztriából, Szlovéniából, Horvátországból és Oroszországból ismert (Lepiforum.de, vizited 2018.VII.20). A két faj rendkívüli hasonlósága miatt az elterjedési kérdések még nem kellően tisztázottak, de az előbbieik alapján úgy tűnik, hogy a Velencei hegységben és a Velencei tó környékén évtizedekig munkálkodó és Petrich Károly által gyűjtött, *bruandella*-ként közölt példányok (Fazekas 1998b, Petrich 2001) a *Hypochalcia propinquella* fajhoz tartoznak.
- *²¹⁶ *Acrobasis fallouella* (Ragonot, 1871) – a fajt Gozmány (1963, 1968) *fallouella* Rag.-ként ismertette. Leraut (1997) katalógusában jelent meg a *fallouella* a *glaucella* Staudinger, 1859 faj szinonimájaként, s ettől kezdve a nemzetközi szakirodalomban ellenőrzés nélkül mindenütt így tüntették fel. Magyarországon ezen a módon először Szabóky (2000) közölte, az óta minden hazai munkában ekként szerepelt, lásd pl. a magyar lepkevilágról legutóbb megjelent kiadványt (Pastoralis et al. 2016). Az újabb vizsgálatok viszont azt bizonyították, hogy ez a szinonimizálás (Leraut 1997) megalapozatlan és téves volt; a *fallouella* és a *glaucella* is önálló, valid fajok (Gozmány 1963, Leraut 2014). A rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnik, az elterjedési területeik sem fedik egymást sehol, a két faj valódi areája viszont további kutatások tárgyát képezi. Szlovák és cseh kollégák közlik (Pastoralis et al 2017), hogy a saját gyűjteményeikben az egyes példányok átvizsgálása során az összes csehországi, szlovákiai, magyarországi és szlovéniai példányuk *fallouella*-nak bizonyult, ezekről a területekről egyetlen *glaucella* példányt sem tudtak kimutatni. Ivarszeri vizsgálattal bizonyított *glaucella* példány hazánkból továbbra sem ismeretes, ezért a 2000 után „*glaucella*” néven közölt adatok az előzőekben ismertett okoknál fogva mind a *fallouella* fajra értendők – lásd Gozmány 1963 is.
- *²¹⁷ *Apomyelois bistriatella* (Hulst, 1887) – a magyar fauna új tagjaként *bistriatella* subsp. *neophanes* Durrant, 1915 néven Szabóky (1996) közölte Hegyesmagosról. Később Pastoralis & Szeőke (2011) a Vértesből, Buschmann (2012) a Tápió-vidékről jelezte. Az újabb vizsgálatok szerint azonban a *neophanes* Durrant, 1925 név csak a *bistriatella* egyik szinonimneve – lásd Fauna-eu-org; Lepiforum.de; Wikipedia (visited 2018.VII.23.) és hasonló fórumok.

- *²¹⁸ *Apomyelois ceratoniae* (Zeller, 1839) – a fajt eddig egyedül Gozmány (1963) említette Budapestről és Isaszegről, igen régi példányok alapján. Újabb hazai egyedekről ismertetés az elmúlt évtizedekben nem látott napvilágot.
- *²¹⁹ *Asalebria geminella* (Eversmann, 1844) – évtizedekig csak a Gozmány (1963) által jelzett egyetlen példány volt ismert Magyarországról, újabb egyedei a Tápió-vidékről kerültek elő (Buschmann 2012c). Röviddel ez után az Alföld számos pontján megtalálták, fotózták és közzé tették a „Lepkék és bogarak” nevű hazai internetes közösségi csoportban (Patalenszky Adrien és mások): sajnos ezek az előfordulási adatok eddig nem kerültek publikálásra.
- *²²⁰ *Euzopherodes vapidella* (Mann, 1857) – a fajt Magyarországról eddig csak Gozmány (1963) és Fazekas (1996, 1998) említette, újabb előfordulási adatokról nincs információnk. Jobbára déli elterjedésű faj, hazánkban valószínűleg nincsenek megtelepedett populációi.
- *²²¹ *Ancylosis deserticola* (Staudinger, 1870) – a fajt eddig csak Gozmány (1963), illetve Gozmány & al. (1985) említik a Duna–Tisza közének több helyéről; az „*eremita* Gozmány, 1951” néven közölt adatok is ehhez a fajhoz tartoznak – lásd Gozmány 1985. Megjegyezzük, hogy az „*eremita*”-név nem a *deserticola*, hanem a *limoniella* Chrétien, 1911 faj junior szinonimja, amelynek elterjedési területe tőlünk keletre van s nem éri el a Kárpát-medencét. A *deserticola* fajnak újabb adatai az elmúlt évtizedekben nem láttak napvilágot hazánkban.
- *²²² *Homoeosoma kasyellum* Roesler, 1965 – Magyarországról leírt faj (holotípus: Budafok, paratípus: Ágasegyháza); a típuspéldányok kivételével egyéb hazai adatai nem ismertek. Újabb Leraut nézete alapján a Lepifórumon (visited 2018.VII.15) a *Homoeosoma* génuszba sorolva találjuk. Rendkívül hasonlít az *Ancylosis sareptella* (Herrich-Schäffer, 1861) fajhoz, attól csak ivarszervi vizsgálattal választható el.
- *²²³ *Ephestia woodiella* Richards & Thomson, 1932 – a hazai szakirodalomban „*parasitella* HBN.” – szőlőrágó karcsumoly néven tűnt fel először (Gozmány 1968). Az ezredfordulót követő fajlisták (Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002) *E. parasitella* Staudinger, 1859-ként közlik, de Pastorális (2007) checklistáján már *E. unicolorella* subsp. *woodiella* Richard & Tompson, 1932 néven találjuk. Így szerepelt a Pastorális et al. (2016) névjegyzékben is. Az újabb vizsgálatok viszont arra derítették fényt, hogy két önálló fajról van szó; az *unicorella* Staudinger 1881 tőlünk délkeletre, Törökországban és Szíriában fordul elő, míg Európa nyugati részén a *woodiella* Richard & Tompson, 1932 (= *parasitella* auct. nec Staudinger, 1859 – partim) él (Leraut 2014).
- *²²⁴ *Anerastia dubia* Gerasimov, 1929 – a faunafüzetben (Gozmány 1963) és az eddig megjelent magyarországi névjegyzékekben egyaránt önálló fajként van jelezve, azonban a típuspéldányokon végzett behatóbb vizsgálatok azt bizonyították, hogy a *dubia* és *lotella* között jelzett alaki és ivarszervi különbségek csupán fajon belüli eltérések (Bidzilya et al. 2020). Ezért a *dubia* név visszaminősült a *lotella* szinonimájává.
- *²²⁵ *Scoparia conicella* (La Harpe, 1863) – a faj első és máig egyetlen adatát Fazekas (1999) adta közre. A hozzá megtevesztésig hasonlító *S. basistrigalis* fajtól lényegében csak ivarszervi vizsgálattal választható el. A *conicella*-nak újabb hazai adatai nem ismeretesek.
- *²²⁶ *Agriphila tolli* (Bleszynski, 1952) – Fazekas (1985) szerint Magyarországon csak a faj *pelsonius* Fazekas, 1985 nevű alfaja él, a név tehát helyesen: *Agriphila tolli* (Bleszynski, 1952) ssp. *pelsonius* Fazekas, 1985. Egyébként több-kevesebb gyakorisággal az ország minden részén előfordul (Fazekas 1994).

- *²²⁷ *Pediasia kenderesiensis* Fazekas, 1987 – validitása mai napig kérdéses és nemzetközileg nem elfogadott, csupán az *aridella* fajon belüli változataként értékelik – lásd Buschmann & Pastorális 2018, Wikipedia és egyéb internetes fórumok.
- *²²⁸ *Ephelis cruentalis* (Geyer, 1832) – elkóborolt példány egyedi lelete, a faj Magyarországon nem honos. Egyetlen hazai előfordulásáról Szabóky (1981) számolt be, újabb adatok máig nem ismeretesek.
- *²²⁹ *Hellula undalis* (Fabricius, 1781) – elkóborolt példány(ok) ritka egyedi lelete, a faj Magyarországon nem honos. Első hazai adatáról Petrich (1989) számolt be. Újabban Epölön is előkerült (Szabóky & Kutassy 2013) és a Bakonyból is van közölt példánya (Szabóky 2019).
- *²³⁰ *Loxostege fascialis* (Hübner, 1796) – a faj taxonómiai helyzete az utóbbi évtizedekben többször változott. Hazai előfordulását Gozmány (1963) ismertette Budapest környékéről. Újabb példány(ok)ról az elmúlt évtizedekben senki nem közölt adatot, de Buschmann F. Mátrafüred-Pálosvörösmarton (2004.VII.18.) gyűjtötte egy példányát (publikálatlan adat).
- *²³¹ *Pyrausta rectefascialis* Toll, 1936 – nemrég kétségek merültek fel a *rectefascialis* faji önállóságáról, de az újabb vizsgálatok kimutatták, hogy úgy a faj morfológiája, mint bionómiája is különbözik a hasonló és általában gyakoribb *P. cingulata* (Linnaeus, 1758) fajtól.
- *²³² *Pyrausta castalis* Treitschke, 1829 – a faunafüzetben hazánk területéről csak egyetlen, Pécs környékén gyűjtött egyed alapján közölte Gozmány (1963), Fazekas (2013) csupán ezt az adatot ismételte. Újabb példány nem ismeretes, a faj valószínűleg nem is él Magyarországon.
- *²³³ *Pyrausta porphyralis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hitelesnek elfogadott magyarországi előfordulása csak Kőszeg környékéről ismert (Gozmány 1963). A fajjal kapcsolatos egyéb információk Fazekas (2001) munkájában találhatók; az utóbbi évtizedekben publikált adata nem került nyilvánosságra. Úgy tűnik, senki nem gyűjtötte hazánk területén.
- *²³⁴ *Pyrausta obfuscata* (Scopoli, 1763) – Gozmány (1963) konkrét lelőhely nélkül, mint Magyarország síkvidékein előforduló fajt közölte, de a Kiskunsági NP lepkevilágát bemutató tanulmányban már csak így emlékezett meg róla: „Peszer – egyetlen hím példány a szakirodalomban” (Gozmány & Szabóky 1986). Hazai periodikában eddig csak Ács & Szabóky (1993), valamint Balogh (1967) jelezte Reskovits (1963) nyomán a Bükk hegységből, egy 1927.V.1.-én Reskovits által gyűjtött példány alapján. A faj egyéb publikált adatáról nincs tudomásunk.
- *²³⁵ *Pyrausta coracinalis* Leraut, 1982 – a faj hazai előfordulását egyedül Gozmány (1963) említi *nigralis* (Hübner, 1793) néven Jósvalőről, Szabóky (1999) csak ezt ismétli. Az elmúlt évtizedekben újabb magyarországi előfordulásáról nincs tudomásunk.
- *²³⁶ *Ostrinia quadripunctalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – faunafüzetben Gozmány (1963) Bátorligetről, majd Szabóky (1999) az Aggteleki Nemzeti Park területéről közölte. A faj egyéb hazai előfordulási adata nem ismeretes.
- *²³⁷ *Patania balteata* (Fabricius, 1798) – Gozmány (1963) a faunafüzetben csak bizonyító egyed nélküli budapesti előfordulását említette. A faj első, egyben máig egyetlen konkrét adattal rendelkező hazai példányát Szabóky (1996) közölte a Mezőhegyeshez közeli Pitvarosról (leg. Kovács Sándor Tibor). A fajról újabb adat azóta nem ismeretes.
- *²³⁸ *Duponchelia fovealis* Zeller, 1847 – a faj első hazai adatát Szabóky (1994) közölte. Azóta több helyről is előkerült (Tóth (2021). Trópusi vándor faj, Európa legtöbb országából, többek között még Norvégiából is vannak megjelenési adatai. Nálunk üvegházakban olykor kártevőként is el tud szaporodni (Agrárágazati Közlemények 2014 március 25-i szám).

– *²³⁹ *Spoladea recurvalis* (Fabricius, 1775) – vándor faj, Magyarországról csupán egyetlen, az ERTI Szalafő-alsószeri fénycsapdája által befogott példányról tudunk (Szabóky & Buschmann 2010). Újabb előfordulási adata csak a közelmúltban vált ismertté.

– *²⁴⁰ *Hodebertia testalis* (Fabricius, 1794) – trópusi, vándorlásra hajlamos faj, elterjedésének súlypontja Afrika déli és keleti része. Magyarországról eddig csak egyetlen példánya ismert (Lévai et al. 2015). Újabb előfordulási adatáról nincs tudomásunk. Annak ellenére, hogy fő tápnövénye a behurcolt és agresszíven terjedő inváziós növény, a főleg homoki tájakon sok felé egyeduralkodóan tömegessé vált selyemkóró (*Asclepias syriaca*), úgy tűnik, a lepke nem telepedett meg hazánkban.

– *²⁴¹ *Antigastra catalaunalis* (Duponchel, 1833) – déli faj, melynek csak igen régi adatai ismertek Vörsről és a Kecskeméthez közeli Szikráról (Gozmány 1963). Magyarországra vándorlásai alkalmával ritkán jut el. Újabb hazai előfordulásairól Szabóky (2019) révén tudunk.

Magyarország területéről publikált, de itt a névjegyzékből különböző okok miatt újabb adat vagy példány előkerüléséig kihagyott fajok **The formerly recorded species omitted from the present checklis**

A jegyzék eddigi nyomtatásban vagy elektronikus formában megjelent változataiból (Pastorális 2007, 2010, 2011, 2012, Pastorális, Buschmann & Ronkay 2016, Pastorális & Buschmann 2018) számos Magyarországról publikált faj kellő indoklással ki lett hagyva. A kihagyott fajok névsora az említett jegyzékekben, ill. Buschmann & Pastorális (2018) közleményében található. A kihagyásra többnyire téves határozás, a faj taxonómiai értelmezésének változása, illetve csak nagyon régi (pl. 19. századi) bizonyító példány vagy annak hiánya miatt került sor. Újabb adat vagy bizonyító példány előkerülése esetén a faj ismét be lesz sorolva a jegyzékbe.

Az említett jegyzékekhez viszonyítva az alábbi fajok lettek kihagyva:

1. A fajjal kapcsolatos publikált adatok téves határozáson alapulnak:

Scrobipalpa smithi Povolný & Bradley 1965 – Buschmann & Pastorális 2019, Huemer & Karsholt 2010.

2. A taxon értelmezése megváltozott (taxonómiai státusza kétséges, ill. degradálásra került sor synonyma, subspecies vagy forma szintre):

Pyroderces klimeschi Rebel, 1938 – Fazekas 2020.

Megacraspedus balneariellus (Chrétien, 1907) – Huemer & Karsholt 2018, Buschmann & Pastorális 2019.

Megacraspedus separatellus (Fischer von Röslerstamm, 1843) – Huemer & Karsholt 2018, Buschmann & Pastorális 2019.

Scythris tributella (Zeller, 1847) – Bengtsson 2024.

Anerastia dubia Gerasimov, 1929 – Bidzilya & al. 2020.

3. Nagyon régi adat vagy bizonyító példány nincs, illetőleg a faj előfordulása a jelenkori Magyarországon semmilyen formában nem bizonyított:

- Oiketicoides lutea* (Staudinger, 1870) – ismeretlen eredetű téves utalás a faj magyarországi előfordulására (Karsholt & Nieukerken 2005, version 1.2).
- Euhypnomena stannella* (Thunberg & Wenner, 1794) – ismeretlen eredetű, konkrét adatot (gyűjtő, dátum, pontos helyszín) nélkülöző utalás a faj magyarországi előfordulására: Karsholt & Razowski 1996, Karsholt & Nieukerken 2007, version 1.3.; Fazekas 2002c, Szabóky et al. 2002.
- Lyonetia ledi* Wocke, 1859 – Fazekas 2022a.
- Phtheochroa purana* (Guenée, 1845) – Buschmann 2022a.
- Phtheochroa duponchelana* (Duponchel, 1843) – Buschmann 2022a.
- Cochylimorpha perfusana* (Guenée, 1845) – Buschmann 2022a, Fazekas 2024e.
- Cochylimorpha callosana* (Herrich-Schäffer, 1856) – Fazekas 2024e.
- Clepsis rolandiana* (Linnaeus, 1758) – Buschmann 2022a.
- Phiaris obsoletana* (Zetterstedt, 1839) – Buschmann 2022a.
- Phiaris micana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Buschmann 2022a.
- Phiaris scoriana* (Guenée, 1845) – Buschmann 2022a.
- Pelatea klugiana* (Freyer, [1834]) – Buschmann 2022a.
- Ancylis unguicella* (Linnaeus, 1758) – Buschmann 2022a.
- Epinotia thapsiana* (Zeller, 1847) – Buschmann 2022a.
- Epinotia rubiginosana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Buschmann 2022a.
- Eucosma cumulana* (Guenée, 1845) – Buschmann 2022a.
- Epiblema cnicicolana* (Zeller, 1847) – Buschmann 2022a.
- Dichrorampha cinerosana* (Herrich-Schäffer, 1851) – Buschmann 2022a.
- Dichrorampha distinctana* (Heinemann, 1863) – Buschmann 2022a.
- Selania leplastrana* (Curtis, 1831) – Buschmann 2022a.
- Grapholita difficilana* (Walsingham, 1900) – Buschmann 2022a.
- Pammene gallicana* (Guenée, 1845) – Buschmann 2022a.

Új fajok a névjegyzékben 2018 után New species in the list after 2018

- Trifurcula subnitidella* (Duponchel, 1843) – Boldsystems.
- Coptodisca juglandiella* (Chambers, 1874) – Takács, Szabóky, Tóth, Bozsó, Kutas, Molnár, Richter 2020.
- Eudarcia kasyi* (Petersen, 1971) – Gulyás, Tamási, Bernát & Takács 2024.
- Dahlica weidlichii* Arnsheid, 2020 – Arnsheid 2020.
- Lichenotinea pustulatella* (Zeller, 1852) – Szabóky 2023.
- Trichophaga scandinaviella* Zagulajev, 1960 – Buschmann & Pastorális 2019.
- Bucculatrix ulmicola* Kuznetzov, 1962 – Fazekas, Pastorális & Tokár 2023.
- Caloptilia jurateae* Benktsson, 2010 – Takács, Kőszegi & Szabóky 2024.
- Dialectica scalarisella* (Zeller, 1850) – Takács, Kőszegi & Szabóky 2024.
- Phyllonorycter cerryi* (Gregor, 1952) – Laštůvka A, Laštůvka Z, Liška, Šumpich 2018.
- Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856 – Katona, Schermann & Tóth 2020.
- Phyllocnistis valentinensis* M. Hering, 1936 – Szabóky & Takács 2021.
- Phaulernis dentella* (Zeller, 1839) – Gulyás, Tamási, Bernát & Takács 2024.
- Ditula angustiorana* (Haworth, 1811) – Szabóky 2023.
- Clepsis dumicolana* (Zeller, 1847) – Fazekas & Halász 2020.

- Celypha doubledayana* (Barrett, 1872) – Buschmann & Pastorális 2019 – visszavéve.
Eucosma tetraplana (Möschler, 1866) – Szabóky & Takács 2021.
Epiblema sarmatana (Christoph, 1872) – Buschmann & Pastorális 2019 – a *fuchsiana* Rössler, 1877 (Szabóky & Takács 2018) helyett.
Notocelia mediterranea (Obraztsov, 1952) – Fazekas, Pastorális & Tokár 2023.
Grapholita nigrostriana (Snellen, 1883) – Fazekas 2022.
Denisia albimaculea (Haworth, 1828) – Szeőke 2022.
Aplota palpella (Haworth, 1828) – Szeőke 2022.
Agonopterix cadurciella Chrétien, 1914 – Boldsystems.
Agonopterix subtakamukui Lvovsky, 1998 – Buchner 2020 – a *cluniana* Huemer & Lvovsky, 2000 helyett.
Depressaria sordidatella Tengström, 1848 – Szabóky & Takács 2018.
Cosmopterix feminella Sinev, 1988 – Davey 2024.
Pyroderces sarcogypsa (Meiyerck, 1932) – Fazekas 2020 – a *klimeschi* Rebel, 1938 helyett.
Ptycerata cryptoxena Gozmány, 1954 – Bidzilya & Karsholt 2021 – a *furfurella* Staudinger, 1871 helyett.
Dichomeris acuminatus (Staudinger, 1876) – Takács, Kőszegi & Szabóky.
Megacraspedus podolicus (Toll, 1942) – Huemer & Karsholt 2018 – a *balneariellus* ssp. *podolicus* helyett.
Psamathocrita argentella Pierce & Metcalfe, 1942 – Elsner, Huemer & Tokár 1999 mint „sp”, – Junnilainen, pers. comm.
Monochroa tekovella Kosorín, 2020 – Baraniak, Mleczak & Huemer 2021.
Sophronia grandii Hering, 1933 – Huemer & Karsholt 2020 – az *ascalis* Gozmány, 1951 helyett.
Lanceoptera panochroa Janse, 1960 – Csákberény, leg Z. Tokár in litt.
Ephysteris diminutella (Zeller, 1847) – a Gyöngyös, Sár-hegy, 2.7.2016. leg. & det. J. Liška bizonyító példány alapján visszakerült a listába.
Elachista eleochariella Stainton, 1851 – Szabóky & Takács 2018.
Elachista fulgens (Parenti, 1983) – Parenti † & Pizzolato 2015.
Elachista (Cosmiotes) exactella (Herrich-Schäffer, 1855) – Szabóky 2023.
Coleophora caucasica Stainton, 1867 – Szabóky & Takács 2021.
Coleophora avellanae Tabell & Huener, 2024 – Takács & Kőszegi – 2024.
Coleophora gardesanella Toll, 1953 – Takács & Kőszegi – 2024.
Coleophora gazella Toll, 1952 – Takács, Szabóky, Bozsó & Lendvai 2024.
Coleophora grotenfelti Tabell & Kosorín, 2020 – Tabell & Kosorín 2020.
Coleophora jaernaensis Björklund & Palmqvist, 2002 – Szabóky & Takács 2021.
Coleophora santonici Baldizzzone & Takács 2022 – Baldizzzone, Takács, Szabóky & Bozsó 2022.
Coleophora solenella Staudinger, 1859 – Szabóky & Takács 2021.
Coleophora texanella Chambers, 1878 – Tóth, Dombi & Takács 2024.
Batrachedra parvulipunctella Chrétien, 1915 – Szabóky & Takács 2021.
Batrachedra enormis (Herrich-Schäffer, 1853) – Szabóky 2023.
Batrachedra confusella Berggren, Aarvik, Huemer, Lee & Mutanen, 2022 – Takács, Kőszegi & Szabóky
Scythris terrenella (Zeller, 1847) – Bengtsson 2024 – a *tributella* (Zeller, 1847) helyett.
Paysandisia archon (Burmeister, 1879) – Sáfian, Katona & Tóth 2023.
Bembecia iberica Špatenka, 1992 – Szabóky 2023.
Aglossa caprealis (Hübner, 1809) – Buschmann & Pastorális 2019 – visszavéve a listába.
Udea numeralis (Hübner, 1796) – Buschmann & Pastorális 2019.
Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834) – Takács & Kőszegi 2023.