

# ANTIPSZICHOTIKUMOK ALKALMAZÁSÁNAK SZAKMAI ÉS KÖLTSÉGSZEMPONTOK SZERINTI VIZSGÁLATA

Molnár Annamária, Sárosi Andrea, Faludi Gábor

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb, Pszichiátriai Klinikai Csoport

## ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb Pszichiátriai Klinikai Csoportjának antipszichotikum-rendelési gyakorlatát vizsgálták retrospektív módszerrel, az 1999. évi összes, antipszichotikus kezelésben részesült fekvő beteg elektronikusan rögzített kórrajzának és zárójelentésének feldolgozása alapján. A vizsgálat célkitűzése az antipszichotikumok használatának költség szempontú elemzése, az antipszichotikus kezelésben részesült betegek diagnózis és életkor szerinti megoszlásának vizsgálata, valamint az antipszichotikum átállítás fő tendenciáinak a feltárása volt. A kapott adatok azt mutatták, hogy bár a korszerű szakmai irányelveknek megfelelően az új típusú antipszichotikumok használata növekszik, a betegek 61%-a azonban jelenleg is hagyományos neuroleptikumot kap. Az elemzés költség-szempon-tú vizsgálatai az atípusos szerek magasabb gyógyszerköltségeit támasztották alá. A vizsgálat eredménye szerint az összes költség 90%-a az atípusos antipszichotikummal kezelt betegek-re jutott, akik az összes betegszám 39%-át jelentik, s csupán az összes költség 10%-a jutott a betegek fennmaradó 61%-ának, akik hagyományos neuroleptikummal történő kezelésben részesültek. Mind az életkor, mind a diagnózis szerinti értékelés során találtunk olyan jellegzetes eltéréseket az antipszichotikum eloszlásban, mely ezen tényezőknek az antipszichotikum kiválasztására gyakorolt hatását sejtetik. Az antipszichotikum váltás fő tendenciáinak elemzése azt mutatta, hogy a klinikai gyakorlatban az esetek számottevő részében a hagyományos antipszichotikumok előnyben részesítése indokolt lehet az új típusú szerek választásával szemben.

**KULCSSZAVAK:** atípusos antipszichotikum, hagyományos antipszichotikum, költség-szem-pontok

## COMPARISON OF PERSONS WITH FIRST AND REPEATED SUICIDE ATTEMPTS

The authors examined the ordering practice of antipsychotics in the Department of Psychiatry, Semmelweis University Kútvölgyi Clinical Centre. The electronically registered case histories and medical reports of all in-patients during the year 1999 who received antipsychotic treatment were reviewed retrospectively. The aim of the study was to analyse the cost-related aspects of the use of antipsychotic medications, to reveal the breakdown of patients treated with antipsychotics by diagnosis and age. The study also aimed to identify the main trends of switching to another antipsychotic medication. Data showed that in accordance with the latest professional guidelines the use of novel antipsychotics is in increase. Still, 61% of the patients receive conventional neuroleptics. The cost-related investigations of the analysis confirmed that the atypical antipsychotics are more expensive. According to study data, 90% of all costs go to 39% of the patients, who take novel antipsychotics, whereas the rest 61% of patients receive conventional neuroleptics and use only 10% of all costs. Based on the analysis of the use of antipsychotics by age and diagnosis, there were characteristic patterns found that may suggest that these factors have an effect on the choice of antipsychotic medication. Analysis of the main trends of switching antipsychotics revealed that in clinical practice there are many cases when the conventional neuroleptics are preferable than the novel antipsychotics.

**KEYWORDS:** conventional neuroleptics, atypical antipsychotics, cost-related aspect