

AZ ANTIKONVULZÍVUMOK ALKALMAZÁSA ADJUVÁNSKÉNT SZKIZOFRÉN PSZICHÓZISOKBAN

Bartkó György és Szabó Tibor

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet, III. Pszichiátriai Osztály, Budapest

ADJUNCTIVE USE OF ANTICONSULSANTS IN SCHIZOPHRENIA

The purpose of the study is to give a review of the literature of the application of anticonvulsants as adjuvant in schizophrenia and related disorders. As symptoms in schizophrenia occur in more dimensions and there is a demand to influence affective and behavioural symptoms in psychosis, combined pharmacotherapy is justified, although present therapeutic guidelines give preference to antipsychotic monotherapy. Antipsychotics and anticonvulsants use complementary mechanisms to decrease the overstimulation that has a role in the development of psychoses. Anticonvulsants have mostly been studied in bipolar diseases, and, as a consequence, besides those, they are widely used in schizoaffective disorders only. Adjuvant carbamazepine therapy is only recommended for a small group of schizophrenic patients, in case there are violent episodes in the disease-process and an EEG abnormality. The combination of new atypical antipsychotics (risperidone, olanzapine) and valproate seems promising, as it has faster and more favourable therapeutic effect than antipsychotic monotherapy. The recommended place and role of the combination of atypical antipsychotics and valproate is discussed in detail in the study.

KEYWORDS: adjuvant pharmacotherapy, carbamazepine, valproate, schizophrenia

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány célja, hogy irodalmi áttekintést nyújtson az antikonvulzívumok alkalmazásáról adjuvánsként szkizofréniában és rokon zavarokban. A szkizofrén kórképek több tüneti dimenzióban jelentkező kibomlása és a pszichózissal kapcsolatos hangulat- és magatartászavarok hatékony befolyásolásának igénye alátámasztja a kombinált farmakoterápia létjogosultságát, bár a jelenlegi kezelési irányelvek az antipszichotikus monoterápiára való törekvést részesítik előnyben. Az antipszichotikumok és az antikonvulzívumok komplementer mechanizmusokkal csökkentik a pszichózisok kialakulásában szerepet játszó túlstimuláltságot. Az antikonvulzív szereket leginkább a bipoláris kórképekben vizsgálták és ennek megfelelően széleskörű alkalmazásuk a fentiekén kívül a szkizoaffektív zavarokra terjed ki. Az adjuváns karbamazepin kezelés csak a szkizofrén betegek szűk körében javasolt, ha a kórlefolyásban violens epizódok szerepelnek és EEG abnormalitás is kimutatható. Az új atípusos antipszichotikumok (risperidon, olanzapin) és a valproat kombinációja ígéretesnek tűnik, mivel gyorsabb és kedvezőbb terápiás hatással jár, mint az antipszichotikus monoterápia. Az atípusos antipszichotikumok és a valproat kombinációjának javasolt helye és szerepe a parciális és non-reszponder betegek kezelésében a tanulmányban részletes ismertetésre kerül.

KULCSSZAVAK: adjuváns farmakoterápia, karbamazepin, valproat, szkizofrénia
