

A BARLANGOK LEPKEVENDÉGEI

A telet imágó, vagyis kifejlett alakban, „valódi” lepkéként átvészelő fajok szinte kivétel nélkül behúzódnak valahová – a legtöbb bagolylepke leginkább avar vagy fakéreg alá, míg a nappali lepkék különféle résekbe, üregekbe, barlangokba. De a 2013-as Év Lepkéje megtisztelő címet viselő citromlepkének erre sincs szüksége, „ő” ugyanis azok közé a rovarok közé tartozik, amelyeknek nem árt a fagy, bárhol lepottyanthatja magát, hogy átteleljen. A teletelő lepkék általában olyannyira elbújnak, hogy hiába is keresnénk őket



Ennek az Európában, így hazánkban is széleskörűen elterjedt, közepes termetű éjszakai lepkének két, egymást részben átfedő generációja júniusban és júliusban, illetve július végétől áttelelve júniusig repül. Ősszel egy ideig még élénkek, emelgetik a szárnyaikat, esetleg helyet is változtatnak, majd a barlangbejárathoz nem túl közel, de nem is távol, a mennyezeten és az oldalfalakon csakhamar elülnek – a bejárat közelében és a barlang mélyén csak kivételesen találni egy-egy példányt.

A nyugalmi időszak számukra és a többi teletelő lepkéfaj számára veszélyeket is rejteget, mert ilyenkor a sötétben tevékenykedő pókok, sőt a lassú ragadozó csigák zsákmányául eshetnek.

Az éjszaka repülő lepkék másik nagy családjának, az araszolóknak kevés faja telel át kifejletten. Ám, amelyik mégis, mint a Közép-Európában gyakori kutyabenge-araszoló, aktív korszakában, tehát nyáron is szívesen tölti a nappalokat barlangban. Nagyjából a vörös csipkésbagolylepkével egy időben vonul el telelni, de attól eltérően, szinte kizárólag az oldalfalakon, meglehetősen alacsonyan található. Szárnyára ritkábban csapódik ki a pára, nem képződnek rajta nagy vízcseppek.

A barlang szájához legközelebb a tarkalepkéket, köztük a rókalepkéket, a gyászlepkét és a nappali pávaszemet találjuk. Ők testük felett összecsapott szárnyakkal ülnek, és nem szokásuk csoportokba verődni.

A lepkék rendkívül fejlett érzékszerveik segítségével a barlang szájából kiáramló párás és a környezettől eltérő hőmérsékletű és feltehetőleg eltérő szagú levegő nyomvonalán aránylag nagy távolságról is eljutnak téli szállásukra. Feltehető,

TÁRSASAN

A kutyabenge-araszoló gyakran ül kisebb, 3-4 tagú csoportokban – persze feltehetőleg nem egymás társaságát, hanem a megfelelő környezetet keresik

KRISTÁLYGÖMBÖK

A finom szőrrel borított vörös csipkésbagolylepke valóságos meteorológiai műszer: a levegő nedvességtartalmának függvényében több-kevesebb vízcsepp rakódik rá



