

# BÚVÓPATAK

A Hargitáról érkező Vargyas-patak Homoródalmas határában szűk völgybe kényszerül. A Vargyas-szoros mészkőszurdoka 4 km hosszan vágódott be a Pelső-hegység északi tömbjébe, látványos sziklaalakzatokat és 125 ismert barlangot hozva létre. A barlangok, a völgy bevágódását követve öt, egymás feletti szinten helyezkednek el, legalsó a mai is alakuló, patakos (aktív) barlangrendszer.

A felszínen is megfigyelhető karsztjelenségek közül a legmeglepőbb a patak időszakos „eltűnése”: a máskor rohanó, bővizű patak a különösen száraz időszakokban, elsősorban az aszályos nyarakon két, 150–200 méteres szakaszon teljesen a felszín alá kényszerül, hogy aztán a Felső- és részben az Alsó-vízkelet karsztforrásaiban bukkanjon a felszínre. Így történt ez például az elmúlt két évben is.

Azt még nem tudjuk, hogy mit hoz a 2014-es nyár, de az élővilág próbál alkalmazkodni az időszakosan szélsőségesé váló körülményekhez. A rend-

kívül lecsökkent vízhozamú, el-eltűnő patak medrében kisebb tavak maradnak vissza, melyekben számos állat talál menedékre az aszályos időben. A vízben természetes pisztrángok és domolykók várják a vízszint emelkedését, a parton gyepi békák és nemritkán keresztes viperák hűsölnek. Mivel a szurdokban mindig van valamennyi víz (ellentétben kiszáradó környezetével), esténként – a látogatók távozását követően – medvék is lejárnak inni a völgytalpra.

SZÖVEG: JAKAB GUSZTÁV–TÓTH ATTILA  
FOTÓ: JAKAB GUSZTÁV

**TELJESEN ELTŰNT**  
a patak vize a Felső-vízkelet fölött

**GYEPI BÉKA HŰSÖL**  
a patakmeder visszamaradt pocsolójában



**A VARGYAS-PATAK** az Alsó-Mál és a Mál-tető között szűk völgyszakaszba kényszerül

