

Az áttelelő hagyma sikeres termesztésének titka

AZ AUGUSZTUSBAN VETETT ÉS A KÖVETKEZŐ ÉV MÁJUS VÉGÉN, JÚNIUS ELEJÉN FŐLSZEDETT ÁTTELELŐ HAGYMA VAGY NYÁRI HAGYMA VETÉSÉVEL HÁZIKERTBEN IS ÁTHIDALHATÓ E NAGY MENNYISÉGBEN HASZNÁLT ZÖLDSÉG NYÁR ELEJEI HIÁNYA.

DR. TERBE ISTVÁN

Sokan próbálkoztak már az áttelelő hagyma termesztésével, kevés sikerrel. Volt, akinek kifagyott, volt, akinek termésképzés nélkül mag-szárát nevelt a nyári vetés. A fajta és a vetésidő helyes megválasztása döntő mértékben befolyásolja a termesztés sikerét! Ha későn vetünk, vagy rossz fajtát választunk, akkor nem erősödik meg ősszel eléggé a hagyma és a gyenge növény télen elfagy. A túl korai vetés pedig a jarovizálódás veszélyével jár, és a túlfejlődött növény tél folyamán megszerzi a virágzáshoz szükséges hideghatást, és tavasszal termésképzés nélkül magszárba megy. Nálunk a legjobb – fajtától függően – az augusztus elejei, augusztus végi vetés. Ilyen esetben október végére ceruzavastagságú, 3-4 leveles növények fejlődnek, amelyeket a nagyobb hidegek nem károsítanak.

A tavaszi vetéshez hasonlóan ilyenkor is alkalmazhatjuk a szalagos vetést; négy 20 cm-es keskenysor után egy szélesebb, 60-cm-es művelőutat hagyunk. Ahol nagyobb terület áll rendelkezésre, 25-35 cm-es normál sortávolságra vetünk, amit kézi műveléssel, horolóval, kapával és gereblyével könnyen tisztán tarthatunk. Folyóméterenként 40 szemet vessünk, és mivel nyári vetésről van szó, a magot a kiszáradás veszélye miatt mélyebbre, 3-4 cm-re helyezzük el a talajban. Kelést követően alkalmazzunk kelesztő öntözést (5 mm, azaz 5 liter/m²).

Nem minden fajta alkalmas átteleltetési termesztésre, ezért vásárláskor győződjünk meg a tasakon a mag alkalmasságáról! Javasolt faj-

ták a *Lisزابoni fehér* és a *Fertődi ezüstfehér*, amelyek tavasz végén, nyár elején piacon is jól értékesíthetők. A jobb termés érdekében tavasszal nitrogénnel vagy összetett műtrágyával (NPK+mikroelemek) fejtrágyázzuk, hogy pótoljuk a téli csapadékkal kimosódott tápanyagot, és ezáltal lendületesebb legyen a fejlődés.

Az áttelelő vöröshagymát május végén, június folyamán szedhetjük fel. Természetesen lehetőség nyílik korábbi betakarításra is, így már március közepétől zöldhagymaként, április végétől pedig főzőhagymaként fogyaszthatjuk, illetve értékesíthetjük.



Az áttelelő hagyma termesztésével áthidalható a nyár eleji hagymahiány