



Gondoljunk a jövőre

BÁR NOVEMBERBEN KEVESEBB A DERŰS NAP ÉS EGYRE ALACSONYABB A LEVEGŐ ÉS A TALAJ HŐMÉRSÉKLETE, A GYAKORI ESŐZÉSEK MIATT JELENTŐSEN JAVULHAT A TALAJ VÍZTARTALMA, AMI ELŐSEGÍTI A TÁPANYAGOK FELVÉTELÉT ÉS RAKTÁROZÁSÁT. A TÉLI HÓNAPOK ALATT A NÖVÉNYEK MINIMÁLISRA CSÖKKENTIK ÉLETFOLYAMATAIKAT ÉS NYUGALMI ÁLLAPOTBA KERÜLNEK.

DR. KOLEVA ROSZICA

Lombhullás után szakítsunk időt a károsítók gyérítését szolgáló mechanikai növényvédelmi munkákra, amelyek a megelőző szerepük miatt nagy jelentőséggel bírnak. Sok olyan rovar- és gombafaj van, amely a gyümölcsfákon vagy azok közvetlen környezetében – a talajban, a lehullott levelekben – telél át. Ellenük a nyugalmi időszakban is hatékonyan védekezhetünk. Ennek érdekében novemberben is folytatjuk a beteg, lehullott levelek összegyűjtését és megsemmisítését az ott telelő kórokozók

későbbi fertőzéseinek megakadályozására. A kórokozók mellett ezzel elpuszíthatjuk az almát, a körtét és a szilvát is rendszeresen károsító *almalevel-sátorosmoly* és *almalevel-aknázómoly* telelő alakjait (bábok, kifejlett hernyók), amelyek szintén a lehullott levelek aknáiban telelnek át.

A gyümölcsfák körüli ápolási és fatisztogatási munkákat már most érdemes elkezdni a fákon vagy közvetlen környezetükben (pl. a talajban) telelő kártevők gyérítése érdekében annak ellenére, hogy

a nyugalmi időszak végéig még sok idő áll rendelkezésünkre. A tisztogatási munkák során az idősebb fák repedező törzsét kéregkaparó vassal, a kisebb kéregrepedéseket drótkéfével tisztítsuk meg, arra ügyelve, hogy az egészséges kérgen vagy hánccsrészen véletlenül se ejtsünk sebeket (főképp). A kéregkaparékot gondosan gyűjtsük össze a fa alá terített ponyvába vagy papírba, majd égessük el vagy jó mélyen ássuk el a talajba. A fenti eljárással sok kártevő telelő alakja pusztítható el, ilyen például az alma-, a szilva-, a barackmoly és a keleti gyümölcsmoly gubója, a pajzstetvek, a körte-levélbolha kifejlett egyedei, a piros- és barna gyümölcsfa-takácsatkák téli tojásai és a gyűrűs szövőlepke petecsomói.



Fontos!

Az alma és az őszibarack lisztharmatának kórokozója a fehér bevonatú, gertyaszerű vesszők rügyeiben telel. Mivel a felső rügyek a legfertőzöttebbek, a vesszők felső részét levágva jelentősen mérsékelhetjük a kórokozó elsődleges fertőzéseit a következő év tavaszán.

A faápolási teendők során vágjuk le a sérült, a letört vagy a károsítókkal (monília, tűzelhalás, vértetű) fertőzött vesszőket, ágakat. A beteg részeket mindig úgy távolítsuk el, hogy az egészséges részből is vágjunk egy kb. 5-8 cm-es darabot. Gondoskodjunk a metszési felületek gyors lezárására sebkezelő anyaggal (pl. *Fadoktor*, *Fagél*). A monília kora tavaszi fertőzési lehetőségeinek csökkentésére szedjük le (a magasan lévőket hernyózó ollóval) és semmisítsük meg a fán maradt monília gyümölcsöket, valamint a meggyfák esetében a kórokozó gomba micéliumával fertőzött száraz vagy rákos részeket is (képen). A sebek gyors lezárását se mulasszuk el. Távolítsuk el a taplógombákkal berakódott vagy az úgynevezett rejtett életmódú kártevők (szűbogarak, kéregmoly, farontó lepkék, almafaszitkár) járataival átfurkált, száraz, korhadt fás részeket, mert ezek a károsítók telelőhelyei is.

KEDVES OLVASÓNK!

**Jövő évi első lapszámunk
2018. január 10-én jelenik meg!**

Javaslatokat, észrevételeket, ötleteket a kertikalendarium@gmail.com e-mail címre, valamint a szerkesztőség címére (1591 Budapest, Pf.: 294) várjuk.

Kellemes pihenést, hasznos felkészülést és jó olvasást kívánunk!

A szerkesztőség