



Használjuk ki a növények egymásra kedvező hatását a vegyes ültetéssel

Tervezzük meg a veteményest

Áprilisban a virágba borult és kizöldült természet már visszavonhatatlanul azt jelzi, hogy itt a tavasz, ezzel együtt a kerti teendőink is megbokrosodnak. Ez a hónap a legszeszélyesebb az évben, számíthatunk fagyokra és nyári melegre egyaránt, így nem árt, ha alaposan felkészülünk minden eshetőségre. Az időjárás kilengései ellen praktikus védekezési eszköz a fátyolfólia, ami egyaránt védi a növényeket a hidegtől és az erős napsütéstől, illetve a kiszáradástól.

HORVÁTH ANETT

Márciusban a palántázásé, a talajelőkészítésé és a metszésé volt a főszerep, áprilisban a legtöbb dolgunk a vetéssel és a kiültetéssel lesz. Most lehet szabadföldbe vetni a burgonyát, mángoldot, kései zöldborsót, nyári retket, jégsalátát, káposztaféléket, a hónap végén pedig a babokat, tökféléket és a csemegekukoricát. Az ültetést megelőzően érdemes a tervezéssel kezdeni: gondoljuk át, mit hova ültetünk és a legjobban, ha ezt papírra is vetjük.

Kiemelten fontos a vetésváltás betartása, vagyis ugyanarra a helyre ne vessük 4-5 évig ugyanazt a növényt. Ennek egyszerű oka, hogy az adott területen a kártevők annyira felszaporodhatnak, hogy a következő évben még több gondot okozhatnak az előző évvel azonos kultúrának.

Zöldtrágyaként vethetünk sarkantyúkat, ami remekül árnyékolja a talajt, nedvesen tartva azt. Erre a célra a facélia vagy mézontófü is kiváló, ami hosszú

gyökereivel javítja a talaj szerkezetét és a beporzó méheknek is gazdag táplálékforrást kínál.

A jó idővel együtt a kártevők is felbukkanak, ezért nem árt néhány óvintézkedést bevetni ellenük. Érdemes kedvező növénytársításokat alkalmazni, kihasználni a növények egymásra gyakorolt jótékony kölcsönhatását. Jó szomszédai egymásnak például a sárgarépa és a hagyma, a kapor és az uborka, a zeller és a káposztafélék, a bab és a borsikafű.

Ha retkünk levele lukacsos, minden bizonnyal földibolhák vetették meg a lábukat a növényen. Ez a rovar viszont csak a száraz helyeken érzi jól magát, így alapos locsolással költözésre kényszeríthetjük őket. Jó megelőzés ugyanerre a problémára, ha fátyóflóliát terítünk az egész sorra.



A sarkantyúka talajtakarónak alkalmas növény, ráadásul salátában is felhasználhatjuk a virágát és a levelét

Ilyentájt már sok bosszúságot szoktak okozni a levéltetvek, de ha türelmesen várunk, az éhes katicák lárváinak felmentő serege hamarosan megérkezik, és mire észrevesszük, már hűlt helyüket találjuk.

A kiskertekben talán a csigák okozzák a legtöbb fejtörést. Ellenük sörcsapda, éles, fizikai akadály vagy az indiai futókacsa vethető be.

A bio növényvédelem igazi Jolly Jokere a csalánlé, ami permetezve vagy belocsolva nemcsak elűzi a nem kívánt betolakodó rovarokat, hanem a



A mézontófű sok vadméheknek, dongónak nyújt táplálékot, és a talajszerkezetet is javítja

benne található kovasav segít kialakítani és fenntartani a növények jó kondícióját, ellenálló képességét.

Gyümölcsfaink védelmére jó megoldást jelentenek a különböző biológiai csapdák. A sárga ragacsos lapokat virágzás után felhelyezve hatékonyan gyéríthetjük a káros rovarokat, csakúgy, mint a feromoncsapdákkal, amik segítségével érzékelhetően csökkenthetjük egyebek mellett az almamoly peterakását. Ha van a kertünkben őszibarackfa, akkor észrevehetjük, hogy a kihajtó levelekkel együtt a táfina is megjelent. Ilyenkor a lehető leggyorsabban távolítsuk el és semmisítsük meg a beteg leveleket, emellett használjunk zsurlóleves permetlevet a gombás fertőzés elterjedése ellen.

Nem árt elővenni a csapadékgyűjtő edényünket is a pince mélyéről. Palántáink akkor érzik magukat a legjobban, ha lágy esővízzel locsoljuk őket, ugyanakkor az előző évek száraz időszakai arra intenek, hogy minden cseppet becsüljünk meg.

Csalánlé receptje




Sokoldalú segítőnk a csalán

Szedjünk 1 kg friss csalánt a kevésbé forgalmas utak széléről vagy patakpartról. A bátrabbak kesztyű nélkül is megpróbálkozhatnak vele, mert a csaláncsípés jótékony hatású, főleg a reumás panaszokkal küzdők számára. Az összegyűjtött növényt aprítsuk fel egy nagyobb, zárható edényben, ami fából, agyagból, kőből vagy műanyagból, de semmiképpen sem fémből készült. Majd engedjük fel a tartályt 10 liter eső- vagy forrásvízzel. Ha ennek híján vagyunk, akkor állott csapvizet használjunk. Fontos, hogy a csalánt ellepje a víz, ha másképp nem

sikerül, tegyünk rá követ nehezeknek. Ezt követően nincs más dolgunk, mint naponta egyszer megkeverni és várni, hogy megérjedjen a biolevünk, amihez tavasszal 14 nap szükséges, de nyáron elég 4-5 nap is. A folyamat jó irányba haladását jellegzetes szag jelzi, ami a szomszédok szempontjából kellemetlen lehet, ezért érdemes egy maréknyi zeolitot (zeolitalapú macskaalom is megfelelő) tenni az edény tetejére, ami csökkenti a tolakodó szaghatást. Kijuttatás előtt át kell szűrni a kész levét egy sűrű szövésű szitán vagy gézlapon keresztül, ezután használhatjuk 1:10 arányú hígításban lombrágyaként vagy talajra locsolva. Az elkészült lé jól tárolható, nyugodtan megtarthatjuk a maradékot. A növényi maradványokat ne dobjuk ki, hanem tegyük a komposztba. A nitrogénben gazdag csalánleves kezelést érdemes hetente, 10 naponta elvégezni. A bab, borsó, fokhagyma és vöröshagyma kivételével valamennyi zöldségfélének kedveli és szinte kivirul ettől a gyors, egyszerű és olcsó tápoldattól!

Zsurlólé receptje



A mezei zsurló főzetét gombás betegségek és lágy testű rovarok ellen vethetjük be

Alapanyagként gyűjtsünk vizes élőhelyek környékén kb. fél kg mezei zsurlót és áztassuk 5 liter vízben egy éjszakán keresztül. Másnap főzzük lassú tűzön kb. 30 percig. Leszűrés után ötszöröseire hígítva használhatjuk.

Az avatatlan szem azonban könnyen összetéveszti a növényt a mocsári zsurlóval, ezért ha biztosra akarunk menni, akkor vegyünk a patikában vagy a drogériában szárított mezei zsurló hajtást, amiből 20 dekányit áztassunk 10 liter esővízben 30 percig. Ezután forraljuk 45 percig, majd kihűlés után szűrjük le és hígítsuk a tízszeresére. Az így kapott törzsoldatot használat előtt ismét tízszeresre hígítva juttassuk ki 24 órán belül!

Ahogy a csalánlé esetében hetente, kéthetente ismételjük meg a gombabetegségek ellen védeni kívánt növényeinket, de a kezelést semmiképpen ne a tűző napon végezzük, hanem inkább reggel vagy este. A főzettel a takácsatkák és a levéltetvek ellen is ellenállóbbá tehetjük a lombzotatot.