

Nyitnikék Rákosmentén

MÁSODIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG A BUDAPESTI KERTBARÁT KÖRÖK JÓ RÉSZÉNEK RÉSZVÉTELÉVEL A TAVASZVÁRÓ NYITNIKÉK SZAPORÍTÓANYAG BÖRZÉT ÉS SZAKMAI NAPOT A VIGYÁZÓ SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.

Nagy volt a nyüzsgés az asztalok körül, ahol az érdeklődők sokféle növény magját, gumóját, dugványát szerezhették be. A szaporítóanyaghoz az ajándékozók saját tapasztalataikat is megosztották a növény elhelyezéséről, ápolásáról. Mint András Károly, a budapesti kertbarát körök elnöke elmondta, 10 kertbarát kör vett részt az eseményen. A környezet állapotán kétkézi cselekvéssel lehet javítani, kicsit földszagúan, mondta köszöntőjében: ami helyben megterem, az nem terheli szállítással a környezetünket. Szent-Miklós Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a kiskerteket is szakszerűen műveljük, az adottságainknak megfelelően válasszunk fajtát akár zöldségről, akár szőlőről vagy gyümölcsről van szó.

Zatykó Lajos a palántanevelés célravezető fogásait ismertette, hangsúlyozva, hogy nem szabad türelmetlenkedni, a várható kiültetési időből visszszámolva vessük el a magokat. A palántanevelés ideje két hónap a paprika és paradicsom esetében, míg egy hónap a salátánál. A melegigényes zöldségeket május közepén ültethetjük ki, tehát március közepe előtt nem érdemes nekikezdeni a palántanevelésnek. Általános hiba az is, hogy nem figyelünk eléggé a hőmérséklet, a víz, a tápanyagok és a fény harmonikus ellátására. Kora tavasszal a hideg és a fényszegény idő akadályozza a növények fejlődését, ilyen körülmények közt nem szabad túllöntözni vagy túltrágyázni a palántákat, mert úgy sem tudják fölhasználni.

Zsigó György növényorvos is hangsúlyozta, hogy minden vegyszeres beavatkozáznál fontosabb a megfelelő körülmények fenntartása a növények számára. A magok csávázására a Polyversum, a Mycosop, illetve a Trianium biokészítményeket javasolta,

talajfertőtlenítésre pedig a Contans WG, a Magnicur Energy, a Biobest és a Trianium P bioszereket. A csírkori betegségeket mankocob hatóanyagú gombaölő szerekkel lehet meggátolni – 18 ilyen szernek van engedélye.



Dísznövények magvetéséről beszélt Komiszár Lajos egyetemi főtanácsos. Legfontosabb dolgunk az egyvári virágágy megtervezése, lényege, hogy illeszkedjen a környezetéhez és jól látható legyen benne minden virág. Az ágyás közepe felé magasabb és világosabb virágokat helyezünk el, és alacsony termetekkel szegélyezzük a csoportot. Érdemes úgy is társítani a fajok, hogy egymás után fejlődjenek, például az afrikai aranyvirág hamarabb nő meg, mint a vele együtt vetett dísznapraforgó. A korán vethető fajok közt figyelmünkbe ajánlotta az egyvári szaralábat, a kaliforniai mákot, és az ernyős tatárvirágot.

Bihari Balázs a Valeyrac Exotics kínálatából villantott föl néhány növényt. A viszonylag ismertebb földi-cseresznyétől és mángoldtól az eperspenőig vagy az ehető krizantémig.

H. Cs.