

A cseresznye és a meggy rokonok, a növényvédelmük is hasonló

A 2020-as évben eddig négy nagyobb tavaszi fagyhullámon vagyunk túl, ami elsősorban súlyosan a korábban virágzó barackot károsította, de biztosak lehetünk benne, hogy a cseresznye és a meggy is megsínylette ezt az időjárást. A két gyümölcs közeli rokonságban állnak, a növényvédelmi stratégiájuk is hasonló, de bizonyos részekben eltérnek. Például a virágot támadó monília inkább a meggyet, míg a cseresznyelégység inkább az éde-

Növényvédelmi szempontból négy fontos sarokpontja van a védekezőeszközöknek:

1. A lemosó permetezések nagyon fontosak a „tisztalaphoz”.
2. A monília elleni védekezés, akár virágot vagy termést támadó fajról beszélünk, sarokpontja a védelemnek.
3. A termést és a lombot támadó kórokozók elleni védekezőeszközök a szüretig.
4. A termést támadó károsítók elleni védelem.

A növényvédelmi permetezések számát és az időzítést elsősorban az évszak határozza meg, de e sarokpontok különös odafigyelést igényelnek.

A lemosó permetezéshez 2020-tól a Syngenta Kft. ajánlatában egy új, kétféle réz hatóanyagot tartalmazó **Coprantol Duo**-t találjuk. Ez a készítmény egyesíti a réz-hidroxid és oxiklorid legjobb tulajdonságait egy készítményben.

A virágzókor támadó monília intenzív fertőzéséhez hűvös, csapadékos időjárás szükséges. A tünetek súlyosak, a virágok és a hajtások elszáradnak. A kórokozó gombafonalai a virágkocsányon keresztül behatolhatnak a fás részekbe. Elpusztul a termőnyárs, ezáltal az ott képződő termés. A termésveszteség súlyos esetben 80-90% is le-

het. Hűvös időjárásban a klasszikus triazolok nem nyújtanak megfelelő védelmet, érdemes a hidegben is jól működő **Chorus** használni.

A virágzást követő időszakban a termést és a lombot támadó betegségek ellen továbbra is használható a jól ismert Topas. A permetezések számát az évszak is befolyásolja, de ebben az időszakban mindenképpen széles hatékonyságú



készítményeket érdemes használni.

A rovarkártevők közül a legfontosabb a cseresznyelégység elleni védelem. Fontos a rajzás folyamatos figyelése, de nem szabad megvárni a rajzás-csúcsot. Ahhoz, hogy garantáltan nyümentes legyen a termés, korán el kell kezdeni a védekezőeszközök használatát.

Az idei szezon indulása eddig nagyon is messze esett az ideáltól, de bízunk a jobb folytatásban!

 **Coprantol™ Duo**

 **Chorus®**