

A szőlő molykártevőire a 2020-as évben oda kell majd figyelni

A szőlő molykártevőinek kedvezett a 2019–20-as tél, nem voltak szélsőséges hidegek, sem nagy hőingadozás a nappalok és az éjszakák között. Egy ilyen enyhe tél nem állít komoly akadályt az áttelelés elé, és előfordulhat (nem csak szőlőben), hogy a kora tavaszi időszaktól komoly kártevőnyomással kell szembenéznünk. A vegetáció második felében megjelennek a molykártevők, amelyek nemcsak közvetlen, de közvetett kártételükkel is jelentős problémát okoznak. A klímaváltozás hatására ezek a kártevők általánosan elterjedtek a magyarországi szőlőkben, és bizonyos évjáratokban ott, ahol elmaradt a védekezés nagyon súlyos károkat tudott okozni. A két legjelentősebb faj, ami nálunk előfordul a tarka és a nyerges szőlőmoly. Sok a hasonlóság a két faj életmódja között. A tarka molynek átlagos évben három nemzedéke, míg a nyerges molynek két nemzedéke alakulhat ki. A rajzást feromoncsapdák segítségével könnyedén lekövetethetjük, és így szükség esetén a megfelelő időpontban beavatkozhatunk.

**A szőlőmolyok elleni védekezés több perme-
tezésből áll. A rajzás megfigyelése és a véde-
kezés időzítése létfontosságú.**

A molyok elsősorban a szőlő termését támadják meg, bár az időjárás változásával megjelenhetnek egyéb növényi részeket támadó kártevők is. Tojásait a fiatal, zöld szőlőbogyón helyezik el. A tojásból kikelő lárvák a szőlőbogyó felületén csak rövid ideig mozognak, majd a bogyóba rágják magukat, amelyeket csak akkor hagynak el, ha már azt kiodvasították. Ezután szövedékkel egy újabb bogyót húznak magukhoz és abban folytatják a táplálkozást. Kifejlődésükig 3–5 bogyót károsítanak. Nem az általuk okozott táplálkozásból adódó

veszteség miatt fontosak, hanem az okozott sebzésen keresztül a szürkepenésznek is utat nyitnak. Az első nemzedék elleni védekezés hatékonysága meghatározza az elkövetkezendő nemzedékek egyedszámát. Ha molyveszélyes területen található a szőlőnk, érdemes ragacslos csapdák segítségével figyelni a molyrajzást, és az első jelentős csapdázást követő 4–5 napon érdemes elkezdni a védekezést. A rajzás elhúzódhat, ezért érdemes a védekezéseket megismételni.

Ha elsősorban molykártevők ellen szeretnénk védekezni, az **Affirm** ideális készítmény. Az **Affirm** a hernyókra gyorsan leáll a táplálkozás, és ezután rövid idővel is pusztulnak az egyedek. Az Affirm hatóanyagából nagyon kevés is elegendő a hatáskifejtéshez, és már a lárvák tojásból történő kirágásakor is megkaphatják a letális dózist.



A rovarölő szerek alkalmazásakor figyeljünk oda a méhek, és egyéb beporzásért felelős fajok jelenlétére. Ne kezeljünk, ha előfordulnak a területen beporzó rovarok is. A felelősségteljes védekezés biztosítja a hosszú távú fenntarthatóságot, és csökkenti a környezeti terhelést.

A tudatos és megalapozottan elvégzett védekezés komoly fejfájástól kímélhet meg minket.