

# A nyugati dióburok-fúrólégyleg lett a dió „ősellensége”



Minden történetnek van egy hőse, és a hősnék egy ellensége is, aki megnehezíti a főszereplő életét. Ha történetünk hőse a dió, ma már kijelenthetjük, hogy a nyugati dióburok-fúrólégyleg a legnagyobb ellensége. A többség, mint e cikk írója is, nagy rajongója a diós süteményeknek, mint amilyen a zserbó, ami az ünnepi ebéd elmaradhatatlan része. Mostanában viszont egyre többször kell szembesülnünk a ténnyel, hogy alig van dió a zserbóhoz.

Ha ez a tendencia folytatódik, a dió kikerülhet a természetéből. Hogy ez ne történjen meg, lassan be kell vezetnünk a korábban elképzelhetetlen gyakorlatot: rendszeresen permeteznünk kell a diófákat a kiskertekben is. Komoly kihívás a védekezés, de az egyik legfontosabb eleme a megfigyelés és az, hogy „ismerjük meg az ellenséget”. Tartsuk szemmel a fáinkat, és kiskertben is alkalmazható előrejelzési módszerekkel figyeljük, hogy mikor kell védekezni. A légy lárvái a dió termésburka alatt fejlődnek és károsítanak. Táplálkozásuk következtében először besüppedő barna foltok jelennek meg a burkon, amik hamarosan rothadásba mennek át, majd a termésburok elfeketedik, rászárad a héjra. A héj mellett a dióbél is károsodik, a termés mennyisége csökken, és a bajt még az is fokozza, hogy a károsítás utat nyit a kórokozóknak, amelyek másodlagos fertőzést okoznak – a bél avas ízű és fogyaszthatatlan lesz. A nyugati dióburok-fúrólégyleg rajzása általában július elején kezdődik és egészen októberig eltart. Tehát a védekezéseket is erre az időszakra kell koncentrálnunk. A legyek jelenlétét zöldessárga ragacs-lapokkal vagy Csalomon csapdákkal tudjuk nyomon követni. A nőtények több száz petét raknak, és egy dióban több nyű is jelen lehet (20-30 is akár). Korai fázisban a termés nem fejlődik rendesen, a



héj ráncosodik és egy idő után lehullik. Tünetei nagyon hasonlítanak a baktériumos betegséghez, de a nyűvek jelenléte egyértelműen utal a kártevőre. A védekezés összetett feladat, nem támaszkodhatunk csak a növényvédő szerek hatékonyságára. A kémiai védekezést sem szabad elhagynunk, de akiknek csak néhány diófájuk van, több módszerhez is nyúlhatnak.

- A kifejlett nyűvek kibújnak a burokból, és a talajra kerülve beássák magukat a sekély talajrétegekbe. Ott bábozódnak és telenek át. Ha meg tudjuk akadályozni, hogy a nyűvek a talajba jussanak, nem tudnak áttelelni, és így nem lesz jövőre imágó, ami továbbszaporodik.
- Ha mulcsozunk, az is csökkenti az áttelelés lehetőségét, de a mulcsot és a lehullott termést a szezon végén össze kell gyűjtenünk, és meg kell semmisítenünk.
- Ha figyeljük a rajzást, és időben beavatkozunk, akkor peterakás idején hatékonyan védekezhetünk kémiai módszerekkel.

A Syngenta ajánlatában a **Karate Zeon** (0,2 l/ha) engedélyezett dióban. Nagyon fontos, hogy a permetlé az egész fát bevonja, mert védtelenekek maradnak azok a részek, ahová nem kerül a készítményből. Ez a lépés a legnehezebben megoldható, hiszen a diófák 10-15 méter magasra is megnöhetnek.