



Öntermékeny, szép cseresznye a Petrus

Májusi cseresznye...

MÁJUS KÖZEPÉN ÉRIK A LEGKORÁBBI MAGYAR NEMESÍTÉSŰ CSERESZNYE, MAJD SORBAN KÖVETIK A TÖBBIET. A HAZAI FAJTÁK KÖZTTŐBB ÖNTERMÉKENY IS VAN, AMIKHEZ NEM KELL PORZÓPARTNERT ÜLTETNÜNK A KERTBE. AKINEK CSAK KEVÉS HELYE VAN, ILYET VÁLASSZON!

HORVÁTH CSILLA

A világon is az egyik legkorábban érő cseresznye a *Rita*, melyet *Brózik Sándor* és *Apostol János* nemesített. Május 20. körül érleli középnagy, széles kúp alakú gyümölcsét. Fényes, vékony héja az érés kezdetén piros, majd később szedve bordóvá sötétül. Húsa piros, közepesen kemény vagy kemény, édes-savas, kellemes ízű. Legnagyobb hibája, hogy könnyen reped. Középkorán virágzik, jó pollenadója az addig legkorábbi cseresznyefajta, a *Bigarreau Burlat* (május végén érlik), a másik korai magyar cseresznye, a *Tünde*, a *Vera*, valamint két öntermékeny hazai fajta, a *Paulus* és a *Petrus*. A

Rita kis fát nevel, gyenge-középerős a növekedési erélye, koronája lehajló gömb alakú. Vörös vesszői is lehajlók.

Következő az érési sorban a *Sándor*, amit a *Bigarreau Burlat* és az öntermékeny *Stella* keresztezésével hozott létre *Brózik Sándor* és *Apostol János*. (A további fajták is az ő munkájukat dicsérik.) Közvetlenül a *BB* előtt érlik május végén, június elején. Középnagy gyümölcse kissé megnyúlt gömb alakú, közepesen kemény húsu. Héja és húsa is sötét, édes-savas ízű. Középerős növekedésű fajta feltörekvő, ritka ágakból álló, kúpos koronát nevel.

A *Tünde* a *BB* fajtával egy időben érlik. Lapított gömb alakú gyümölcse eléri a 26 milliméteres átmérőt. Közepesen vastag héja fénylő bordópiros, húsa is sötét, közepesen kemény, kellemesen édes-savas, harmonikus ízű. Nagy előnye, hogy kimondottan sokat terem, amihez porzópartnerre van szüksége. Ültessük mellé a *Sándor*, a *Petrus*, a *Paulus*, a *Katalin* fajták valamelyikét, vagy a *Bigarreau Burlatot*, esetleg a *Valerij Cskalovot*. (Ez utóbbi fajtát a *BB* megtermékenyítésére honosították, egy időben érlik



A korai cseresznyéket a francia tájfajta *Bigarreau Burlat*hoz mérjük



A *Tünde* gyümölcse eléri a 26 milliméteres átmérőt



A nagyon korai *Rita* kis fát nevel, lehajló hajtásokkal

vele, és a gyümölcsminősége is hasonló.) Gombabetegségekkel szemben viszonylag ellenálló. Fája középerős vagy annál erősebb növekedésű, széles gömb alakú koronával.

Néhány nappal követi a *Tündét* az érési sorban a *Petrus*, a férfinévből már látszik, hogy ez is öntermékeny fajta, önmagában ültetve is bőven terem. Június 10. körül érleli megnyúlt szív alakú, 25 milliméter átmérőjű gyümölcseit. Sötétbordó héja közepesen vastag, húsa sötét, savanykás-édes. Középerős növekedésű a fája, laza kúp alakú koronával.

Június 10. körül érlik az igen bőtermő *Annus* gyümölcse is. A megnyúlt gömb alakú cseresznye 23–24 milliméter átmérőjű, ami a kereskedelmi forgalomban már nem elég nagy, de kellemes savanykás-édes íze és igen kemény húsa



Igen nagy a Carmen gyümölcse



A Paulus nem hajlamos a repedésre

fordul és bőtermő, gyönyörű nagy gyümölcse van. A fénylő bordópiros cseresznye átmérője 27–30 milliméter, alakja nyomott gömb. Kemény húsa kellemesen édes-savas, finom cseresznye-ízű, kocsánya az átlagnál hosszabb és vékony. Pollenadója a *Germersdorfi* és a *Paulus*. Fája gyenge növekedésű, feltörekvő, kis koronával.

Az öntermékeny *Paulus* is június 10–12. körül érik, nagy, bordópiros, kissé lapított gömb alakú gyümölcse 26 milliméteres, igen kemény húsú, repedésre nem hajlamos. Magja kimondottan kicsi, ezért nagyon kellemes fogyasztani. Fája középerős-erős növekedésű, feltörekvő kúp alakú koronával.

Június 10–12. körül érik a *Margit*, ez a ropogós, festőlevű, zamatos cseresznye. Bordópiros gyümölcse 24 milliméter átmérőjű, lapított gömb alakú, minősége a *Germersdorfi*éhoz hasonló. Középhosszú kocsánya szárazon válik el a gyümölcstől. Termőképessége közepes, de a minősége kárpótol ezért. Porzópartnere a többi közt a *Germersdorfi*, amit 8-10 nappal megelőz az érése. Fája középerős növekedésű, kissé megnyúlt gömb alakú koronával.

miatt érdemes ültetni belőle a kertbe. Porzónak a *Tünde*, *Petrus*, *Linda* és *Katalin* fajtákat ajánlja mellé a nemesítő gyümölcsstermesztési kutatóintézet: jó megtermékenyülés esetén igen bőven terem. A feldolgozását megkönnyíti, hogy a kocsány szárazon válik el a gyümölcstől, nem ereszt levet. Szabályos kúp alakú koronája a közepesenél erősebb növekedési eréllyel fejlődik ki.

Nagy nemzetközi sikert ért el a *Carmen* fajta, ami ugyanebben az időben érkezik, korán termőre

Bízzunk az idei jó cseresznye- és meggyeszüretben



E cikk írásakor még nem tudhatjuk, hogy a tavaszi időjárás milyen nyomokat hagy a gyümölcsöseinken, de az eddigiek nem sok jóval kecsegtetnek. A cseresznye és a meggy később virágozik, mint a korai csonthéjasok, még lehet reménykedni. A két gyümölcs közeli rokon, a növényvédelmi stratégiájuk is hasonló, de bizonyos részekben eltérnek. Például a virágot támadó monília inkább a meggyet, míg a cseresznyelég inkább az édesebb cseresznyét károsítja.

Növényvédelmi szempontból négy fontos sarokpontja van a védekezéseknek:

- A lemosó permetezések nagyon fontosak a „tiszta laphoz”.
- A monília elleni kezelés, akár a virágot vagy a termést támadó fajról beszélünk, a védelem sarokpontja.
- A termést és lombot támadó kórokozók elleni védekezés a szüretig.
- A termést támadó károsítók elleni védelem.

A növényvédelmi permetezések számát és az időzítést elsősorban az évjárat határozza meg, de e sarokpontok különös odafigyelést igényelnek.

A lemosó permetezéshez javasolt visszagondolni az előző évre, hogy mivel küszködtünk az év folyamán, és annak megfelelően kérjünk tanácsot, hogy milyen lemosó készítményre van szükségünk (olajos, nem olajos, rezes, kénes). A virágzaskor támadó monília intenzív fertőzéséhez hűvös, csapadékos időjárás szükséges. A tünetek súlyosak, a virágok és a hajtások elszáradnak. A kórokozó gombafonalai a virágkocsányon keresztül behatolhatnak a fás részekbe, elpusztul a termőnyárs, ezáltal az ott

képződő termés. A termésveszteség súlyos esetben 80-90% is lehet. Hűvös időjárásban a klasszikus triazolok nem nyújtanak megfelelő védelmet, érdemes a hidegben is jól működő **Chorust** használni. A Chorusról azt érdemes megjegyeznünk, hogy nemcsak hidegben, de meleg időjárás esetén is alkalmazhatjuk, tehát nem kell abbahagyni a használatát, ha melegszik az idő.

A virágzást követő időszakban a termést és a lombotató támadó betegségek ellen továbbra is használható a jól ismert **Topas**. A permetezések számát az évjárat is befolyásolja, de eb-



ben az időszakban mindenképpen széles hatékonyságú készítményeket érdemes használni. A rovarkártvevők közül a legfontosabb a cseresznyelég elleni védelem. Fontos a rajzás folyamatos figyelése, de nem szabad megvárni a rajzácsúcsot. Ahhoz, hogy garantáltan nyügmentes legyen a gyümölcs, korán el kell kezdeni a védekezéseket.

Az idei szezon indulása eddig nagyon is messze esett az ideáltól, de bízzunk a jobb folytatásban! A portfóliónkban kis kertbe és nagy területre is tudunk megoldást biztosítani.