Rengeteg lett a drótféreg

A 2020-as decemberi tavasz megengedte, hogy az egyik jól előkészített parcellába új ribizlitöveket telepítsek, majd melléjük idén január-februárban folytatásként átültessek málnatöveket is. Ezen a 22 négyzetméteren régóta bogyósok voltak, évente többször kapálva, mindig teljesen gyommentesen tartva. Március elején gondosan ismét fellazítottam a sorok közét irtókapával, jónéhány drótférget találva. *Zsigó György* talajlakó kártevőkről szóló értékes kertbarát felhívására gondolva 2021. március 23-án ismét igen gondosan felkapáltam a területet, nem egészen ásónyommélységben. Az eredmény „félelmetes". A parcellából nem egészen egy ásónyom mélységéből összesen 90 lárvát szedtem ki. Két nappal később próbalyukakat ásva elenyésző számú kártevőt találtam. A terület teljes szegélyét március 27-én egy ásónyomra és mélységben körbeástam, összesen 5 férget találtam, melyek közül kettő igen kicsi, eddig nem látott juvenil alak volt.

Az, hogy evvel az egyelőre mechanikus védekezéssel a kártevőket milyen arányban sikerült megsemmisíteni, nem tudom. A kert egészét tekintve a korábbi hosszú évek munkálati alatt nem találkoztam drótféreggel, pattanóbogárral, most „bepótolták". A több évig is talajban fejlődő kártevőt az őszi ásásnál, sőt a korábbi években sem találtam.

Megdöbbentően sok drótférget találtam 22 négyzetméteren

A szignalizációs és gyakorló szakemberek a négyzetméterenként 4 lárva sűrűségű előfordulást az erős fertőzés kategóriába sorolják, és mindenképpen vegyi védekezést javasolnak.

Egy másik, lényegesen nagyobb kockába március 5-én korai *Peti* (rajnai törpe) borsót vetettem, a termés leszedése után (amúgy a megmaradt értékes borsószalmát mindig beforgatom a talajba) ismét alaposan megfigyelem a fellelhető kártevőket.

A naposabb részre átültetett és öntözött málnatövek gyorsabban fejlődtek

Mivel a málna fény- és vízigényes növény is, próbaképp telepítettem néhány tövet a napfényes keleti oldalra, melyeket átültettem a többi bokor elé. A keletieket öntöztem is, az eredmény pedig: az öntözött és több fényt kapott növények fenológiai állapotát nézve csaknem 2 hét előnyben vannak a többiekkel szemben.

Molnár István Mihály
Gellért-hegy