



Tombol a nyár, öntözni kell

A SZESZÉLYES TAVASZT MELEG ÉS SZÁRAZ IDŐ VÁLTOTTA FEL. KEVÉS A CSAPADÉK, NAGYA FORRÓSÁG, ÉS MÉG AZ UV-SUGÁRZÁS IS NAGYON MAGAS, - EZ NEMCSAK MINKET VISEL MEG, HANEM A NÖVÉNYEINK FEJLŐDÉSÉRE IS RÁNYOMJA A BÉLYEGÉT.

NAGYKUTASI VIKTOR

Most a díszkertben a legfontosabb munka az öntözés, a víz és az abban oldott tápanyagok kijuttatása a növényeink számára. De jön a kérdés, mikor és hogyan locsoljunk, hogy az a legjobb legyen a növényeink számára? A legjobb a kora reggeli órákban elvégezni a locsolást, mert akkor még a talaj, a környezet is hűvösebb, sőt még harmat is lehet. Ez azért előnyös, mert olyankor a növények sokkal jobban felveszik és hasznosítják a vizet. Reggelente még a hideg kútvíz sem árt annyira.

Ha kicsi a kertünk és van elég eszközünk (hordó, műanyag tartály) a legjobb, ha a már állott vízzel locsolunk, ami a dézsás, cserepes vagy balkonládás növények számára is kedvezőbb. Főleg akkor, ha este is kell locsolnunk, vagy csak akkor van időnk rá. Gondoljunk bele, egy barna virágláda, amit egész nap tűz a nap, akár 50-60 °C-ra is fölmelegszik, és mi ezt egy átlagos 7-10 °C-os kútvízzel, vagy 10-15 °C-os csapvízzel öntözzük meg, milyen hősokkot okozunk a növénynek. Az sem jó, ha a cserepek vagy dézsák alatti alátéte-

ket folyamatosan vízzel töltjük fel, mert a felforrósodott edény a vizet is felmelegíti és attól sérül vagy elhal a növények gyökérzete.

Edényben nevelt növényeinknél fontos, hogy csak akkor locsoljuk, amikor a talaj felszíne az ujjunk tapintására már száraz. Ha egy-egy cserepes növény kiszáradt, lekókad, maximum 1-2 órára állítsuk vízfürdőbe, mert így a növényünk és a talaj is felveszi a vizet. Virágzó növényeinknél minden harmadik-negyedik locsolást egészítsünk ki tápoldatos öntözéssel, betartva a gyártó által előírt hígítási arányokat.

Jó megoldás, ha csepegtetőrendszert építünk ki, amit akár egy gazdaboltban kapható kész rendszer beüzemelésével elérhetünk, vagy mi magunk is olcsón készíthetünk, hiszen csak egy víztartályra és egy perforált, azaz csepegtetőlyukas vagy csepegtetőtestes csőre van hozzá szükségünk.

Gyeppek locsolása

Nincs is talán olyan kert, ahol legalább pár négyzetméter gyep ne lenne. A fű sem szereti, ha napközben, a legnagyobb melegben locsoljuk, inkább a kora reggeli vagy esti időszakban adjuk neki vizet. Ne öntözzük napon, legalább heti 1-2 napot hagyjuk szárazon, mert ha egy gombás betegség fellépne benne, akkor a folyamatos nedvesen tartás miatt akár az egész gyepfelületet károsíthatják. Sőt, inkább törekedjünk arra, hogy ritkábban, de nagyobb vízáddal öntözzünk.

Nyári metszés

Azért a locsolás mellett is van még bőven tenivaló a díszkertben. A kertek királynői, a rózsák már ontják virágaikat, sőt az első szálak már elvirágoztak, ezért távolítsuk el azokat. Legjobb, ha az első 5-ös levélnél vágjuk el a szarát, mert



A futórózsákról csak az elvirágozott virágfejeket vágjuk le

így gyorsan hozzák a következő virágaikat. Futórózsáknál elegendő az elvirágozott fejeket eltávolítani. Ha műtrágyát használunk a fejlődésük megerősítéséhez, azt még a hónap végéig kijuttathatjuk.

Ha magasra nővő vagy támasztékra szoruló virágaink vannak, akkor rendszeresen ellenőrizzük a támasztékot, illetve a kötözőanyagok fe-



A cserepes növényeket lehetőleg állott vízzel öntözzük

szességét. Az utóbbi idők egyre szélsőséesebb időjárása miatt érdemes a könnyen korhadó, rongálódó fa támasztékokat fémre cserélni.

A fás szárú évelőknél, cserjéknél érdemes a talajt levágott fűvel vagy aprított, darált faforgács-csal 5-7 cm vastagon takarni, így nem szárad ki a talaj, nem gyomosodik, és ahogy korhad, a növényi apríték tápanyaggal szolgálja növényeinket.

Itt van a lombhullató sövények nyírásának is az ideje. Előtte érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e lakott madárfészek a növényben. Ha van, várjunk a munkával a madarak kirepüléséig. A nyírást éles szerszámokkal végezzük, és lehetőleg ne a legnagyobb forróságban. A frissen telepített sövényeknél a kilógó vagy nagy hajtásokat vágjuk csak vissza.

Szobanövények a kertben

Ha a szobanövényeinket kivinnénk a kertbe, balkonra, soha ne napos időben tegyük, mert akár a lombozat teljes leégését is okozhatja az erős napsugárzás.

Most érdemes szaporítani szobanövényeinket tőosztással vagy törzsdarabolással és gyökeretetéssel, amihez 25-30 cm-es darabokat vágunk a növény törzséből, vízben gyökeresztessük meg. Így szaporítható a *Dieffenbachia*, a *Dracae-*



Tőosztással szaporíthatjuk az évelőket



Nagy termetű szobanövényeinket a törzs földdarabolásával tudjuk szaporítani

na, a *Ficus elastica*, a *Monstera* (könnyezőpálma), a *Yucca*.

A tavasszal elvirágozott hagymásainkat még felszedhetjük, amihez a legjobb ásóvillát használni. A felszedett hagymákat válogassuk szét, és az őszi ültetésig tegyük száraz, hűvös helyre.

A kerti tavak, csobogók vize a nagy melegben nagyon párolog, így folyamatosan gondoskodnunk kell az utánpótlásról. Az aranyhalak kedvenc csemegéje a szúnyoglárva, úgyhogy ne féljünk attól, hogy a tavunk szúnyogkeltető lesz.

Figyeljünk rá, hogy a melegbe sokkal könnyebb túletetni a halainkat, aminek következménye, hogy káros folyamatok indulnak be, amit aztán nagyon nehéz megállítani, ezért inkább előzzük meg. Ezekben a meleg napokban ne kezdjünk neki a tó takarításához, mert a vízínövények nagyon hamar megéghetnek, vagy el is pusztulhatnak.

Monília almában és csonthéjasokban



A moníliai betegséget több kórokozó fertőzése is kiváltja; az ellene való védekezés több összetevőből áll. Beszéljünk akár csak egy-két fáról, vagy ültetvényi méretekről, fontos, hogy odafigyeljünk néhány alapvető kérdésre. Ne ültessünk mély fekvésű, párás területre, figyeljünk oda, hogy lombzat mindig szellős, levegővel jól átjárható legyen. Ha a virágot fertőző monília megjelent, a fákról mechanikusan el kell távolítanunk a beteg részeket, és lehetőség szerint gyűjtsük össze az összes „gyümölcsmúmiát”, hogy ne maradjon a betegségnek fertőzési forrása a következő évben.

A vegyszeres védekezést programszerűen és megelőző jelleggel kell végeznünk, mert ha megjelentek a tünetek, akkor már elkéstünk. A kora tavaszi lemosó permetezések és a virágzaskori védelem létfontosságú a megfelelő gyümölcsvédelemhez. A virágzáson már túl vagyunk, de figyeljünk oda, hogy a korán megjelenő tünetek jelzik a kórokozó jelenlétét. A gyümölcsöt támadó monília mechanikai sérüléseken keresztül (rovarrágás, szélsőséges időjárás okozta sérülések) képes a gyümölcsöt támadni, ezért viharok után, amint lehet, permetezzünk.

A cseresznye fogékonyabb a gyümölcsöt támadó monília, míg a meggyet inkább a virágmónia támadja. Ha az időjárás virágzás után párás, csapadékos, a fertőzés kialakulásához még mindig megfelelőek a körülmények. Ebben az esetben a **Topas** (5 ml/10 l permetlé) alkalmazása megakadályozhatja, hogy a monília problémát okozzon. A gyümölcsöt támadó

monília ellen később a **Switch** (8 g/10 l permetlé) használata adhat megfelelő védelmet.

Őszi- és kajsziarack esetén a **Topas** (3 ml/10 l permetlé) ideális választás nemcsak a monília, de a levéllikacsosodás elleni hatékonysága miatt is. A gyümölcsmonília ellen a későbbi időszakban a **Switch** (10 g/10 l permetlé) alkalmazását javasoljuk.

Almatermésűek esetén előfordulhat, hogy nem is látjuk a tüneteket a szüretkor, de a tárolás alatt a monília szintén károsíthatja az almát. A szüret előtt érdemes a tárolásra szánt almát még egyszer lepermetezni **Switch**-csel (8 g/10 l permetlé), hiszen rövid várakozási idejének (3 nap) köszönhetően gyorsan és nagyobb biztonsággal betárolható a termés.

Összefoglalásként azt lehet mondani, hogy moníliai betegség sok gyümölcsfajt támadhat meg. Ellene leghatékonyabban megelőző jelleggel tudunk védekezni, hogy egészséges gyümölcsöt szüretelhessünk a szezon végén.