



AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK

Aggodalommal írom, hogy végére érkezünk ennek az enyhe, de csapadéokban nagyon szegényes télnek. A *Sinkovits Imre* kiváló szín-

művész és kertészkedő ember

főszereplésével készült *A tizedes és a többiek* című filmben

hangzott el ez a mondat,

hogy „az oroszok már a spájzban vannak”. Mi is jog-

gal mondhatjuk, hogy a klíma-

változás már nem a küszöbün-

kön, hanem a kertjeinkben jár. Itt

az ideje a tél végi lemosó permetezés-

nek, mert az enyhe télben a kártevők tojásai

és a betegségek spórái sem pusztultak el.

Tessék olyan permetezőszert használni,

amelyben kén (gombák ellen) és réz, vala-

mint olajos rovarölő szer (állati kártevők el-

len) is van. Lemosószerűen úgy kell perme-

tezni, hogy a gyümölcsfák és -bokrok minden

eldugott része is kapjon a permetező-

szerekből.

Rózsa, mogoró, mandula...

Március a fák és a bokrok metszésének az

optimális időszaka. Az úgynevezett fenn-

tartó metszést a következő sorrendben kell

elvégezni: rózsabokrok, mogoróbokrok, mandula-, cseresznye-, meggy- és a szilva-

fák, köszméte- és fügebokrok, majd a

körte-, és a legkésőbbben virágzó

almafák. A kajszibarackfák

fenntartó és az őszibarackfák

termőre metszése csak a

nedvkeringés élénkülő sza-

kaszában válik esedékessé.

Fagyűrő zöldségek

Miután a talajban a fagy kienge-

dett és valószínűnek látszik a tavaszod-

dás, nem tűr halasztást azoknak a zöldsé-

geknek a magvetése, amelyeknek a csírája

nem károsodik a mínusz 2-3 °C-os éjszakai

fagyoktól. Ilyenek a zöldborsó, a

mezei saláta, a hónapos retek, a

sóska és a spenót.

Minden kertészkedő ember jól

ismeri a borsó két fajtáját: a ko-

rai kifejtőborsót és az azt követő

velőborsót. Sajnos szinte elfelejtettük a

harmadik típusát, amelyet cukorborsónak

neveztek. Ennek az a jellegzetessége, hogy

a hüvely belső felületéhez tapadó cellulóz-

réteg hiányzik, és ezért a borsószemek a

hüvellyel együtt alkalmasak konyhai fel-

dolgozásra. Ezzel megtakaríthatjuk a borsó

fejtésének munkáját és kevesebb hulladé-

kot termelünk. Vetőmagja a szakboltok-

ban kapható.

A fagyűrő zöldségfélék közé tartozik a ka-

ralábé is, azt azonban palántákkal szaporít-

juk. Lehetőség szerint edényben nevelt

palántákat vásároljanak, mert azok nem

szenvedik meg az átültetés stresszhatását

és két-három héttel korábban lesznek fo-

gyaszthatók.

A rebarbarabokrok korán kezde-

nek nyeles leveleket fejlesz-

tetni, ezt segíteni lehet

azzal, hogy a nö-

vényt éj-



szakára be-

takarjuk nagyobb

agyagcseréppel. A műanyagcse-

rép erre a célra alkalmatlan. A rebarbara

nyeléből hámozás után igen ízletes kom-

pótot lehet készíteni. A friss levelekből a spenó-

thoz hasonló leves vagy mártás főzhető.

Az idősebb levelek olyan sok savat tartal-

maznak, hogy feldolgozásra alkalmatlanok.

Szedjük fel a virághagymákat

Amikor Önök ezeket a sorokat olvassák,

már pompáznak a kertekben a tulipánok, a

nárciszok és áprilisban már a jácintok is. A

már hároméves növények hagymáit ajánla-

tos fölszedni, de csak akkor, ha a leveleik

már megbarnultak és elszáradtak, mert ek-

korra a hagymákba elegendő tápanyag ju-

tott ahhoz, hogy augusztusban elültetve jö-

vő tavasszal még gazdagabb virágzásban

gyönyörködhessünk.

Örömteli kertészkedést kíván:

Bálint

