

KONDÍCIÓBECSLÉS



MI EZ?

A kondíció általában véve az erőnléteket és a tápláltságot jelenti, azonban a kondícióbecslés során a bőr alatti zsír mennyiségét (a ló hizottságát) értékelik.

MI A CÉLJA?

A lovon található zsírszövet a ló aktuális energiamelegéről ad visszajelzést. Az energiadús takarmányok (pl. szénhidrát, zsír) és a mozgáshiány elhízáshoz vezetnek, az éhezés eredménye a soványság.


MI KELL HOZZÁ?

Látás és tapintás útján lehet megbecsülni az állat kondícióját. Fotóról tapasztalt szakember számára is legfeljebb 80-90%-os biztonsággal állapítható meg a ló kondíciója.



MI A MENETE?

A lovat az ábrán sárgával jelölt helyeken szemrevételezik, tenyérrel megtapogatják, az eredményt rögzítik.



Érdemes a lovat három testtájra osztani (nyak, törzs, far) és azokat külön-külön értékelni!

A tulajdonos is elvégezheti a kondícióbecslést, rendszeres időközönként.

A kondícióbecslés egy texasi állatorvos, Dr. Don Henneke módszerén alapszik. Kilencpontos módszernek is hívják, mert a lovakat kondíciójuk alapján 9 csoportba sorolja be. Angolul: Equine Body Score System (BSC).

A különböző fajtajellegetek figyelembe kell venni a kondícióbírálathoz (különösen pónik és hidegvérű fajták esetén)!

- EXTRÉM SOVÁNY 1
- NAGYON SOVÁNY 2
- SOVÁNY 3
- KISSÉ SOVÁNY 4
- MEGFELELŐ 5
- KISSÉ TÚLSÚLYOS 6
- TÚLSÚLYOS 7
- ELHÍZOTT 8
- EXTRÉM ELHÍZOTT 9

MEGFELELŐ TESTZSÍR-ARÁNYOKKAL RENDELKEZŐ LÓ

A gerinc a mellette futó izmokkal nagyjából egy szinten van (nem emelkedik ki és nem süllyed be).

A nyak és a vállak finoman belesimulnak a törzs vonalába, a mar enyhén zsírral burkolt.

A faroktő melletti zsírszövet szemmel láthatóan burkolt, érintésre puha (szivacsos vagy tömöttebb).

EZ AZ ETALON, DE VERSENYLOVAKNÁL A KISSÉ SOVÁNYABB IS TELJESEN ELFOGADOTT

A bordák szemre nem különülnek el egymástól, de tenyérrel könnyen kitapinthatók.



ÉRDEKESSÉGEK

Szezonálisan változik az optimális testzsír-arány: tavasztól nyárig normális, ha súlyt szed a ló, a télre pedig a versenylovak esetében a szezon előtti állapot energiát tartalékol.

A száraz, szikár, inas ló kevés zsírral borított, de csontjai nem állnak ki. Intenzív edzésben lévő versenylovaknál kívánatos ez a kondíció, mert nem cipel felesleges terhet magán a ló.

Az energiát keményítőben gazdag abrakokkal vagy növényi olajokkal biztosítják a versenylovaknak. A keményítő-terhelés a vastagbél elsavasodásához és patairha-gyulladásához vezethet.



SOVÁNY VAGY KÖVÉR?



Az elzsírosodás folyamata (balról jobbra): az extrém soványtól kezdve, a megfelelő állapoton keresztül a túlsúlyos, majd az elhízott lóg.



ÉRDEKESSÉGEK

A test gömbölyded formáját az izmok és a zsír egyaránt biztosíthatja. Az izomépítéshez fehérje és izommunka szükséges. A zsírszövet energiádús takarmányból és mozgáshiánytól épül fel.

A soványság hátterében esetenként fogászati probléma vagy betegség (pl. gyomorfekély, felszívódási zavar, férgesség) áll. „Hizulás” előtt átfogó állatorvosi vizsgálat szükséges!

A sovány ló hidegben a zsirtartalékok hiánya miatt nehezebben tudja testmelegét biztosítani. Könnyen megfázik, immunrendszere legyengül, hajlamossá válik megfázásra, fertőzésekre.

SOVÁNY LÓ

A nyakon, vállon és a maron a csontok messziről látszódnak, szerkezetük könnyen felismerhető.

A csigolyák felső nyúlványai feltűnően kiállnak, a gerinc élesen kiemelkedő, felszíne hepehupás.

A PIROSSAL JELELT RÉSZEK „HIÁNYOZNAK” A LÓROL.

A faroktő, a csípőcsont és a farbűb észrevehetően, élesen kiállnak.

A bordák a testvonalból kiállnak, tapintásra jól elkülönülnek egymástól. Szemmel megszámolhatók.

1

ELHÍZOTT LÓ

ÉRDEKESSÉGEK

Az elhízott ló koplaltatása megbetegítő hatású: enyhe esetben gyomorfekélyes lesz tőle a ló, súlyos esetben ketogén anyagok szaporodnak fel a vérben (éhezési ketózis).

A túlsúlyos ló zsírraktárai gyulladáskeltő anyagokat termelnek. Az elhízás gyakori következménye a patairha-gyulladás, a metabolikus szindróma és az inzulinrezisztencia.

A felső nyakéki megvastagodása azt a hamis illüziót kelti sok lovasban, hogy lovuk nyaka jól izmolt, „kerek”. Valójában egy vastag szalonnaréteget cipel a ló a nyakának felső részén.

A gerinc erőteljesen becsüllyed a hátra, extrém esetben megáll a víz az árokban.

A felső nyakélen lévő zsír kézzel jobbra-balra elbillenthető, súlyos esetben eldőlhethet, oldalra leföghat.

A SÁRGA KÖRVONAL AZ IDEÁLIS ALAKOT JELZI, AMI EZEN KÍVÜL VAN, AZ ZSÍRSZÖVETI

A faroktő melletti zsírszövet szemmel láthatóan is puha, nem csak érintésre.

Egy túlsúlyos ló is lehet alultáplált: amennyiben egyes tápanyagokból (pl. vitaminok, ásványi anyagok) hiányt szenved. Ez a minőségi éhezés.

Egyenetlen zsírsíkok fedik a bordákat, amelyek határvonalai nehezen kitapinthatók.

9

Lektorálás: Dr. Kutasi Orsolya - lóspecialista belgyógyász állatorvos; kutasi.orsolya@gmail.com

Dr. Mézes Miklós - takarmánytoxikológiai szakértő, egyetemi tanár; mezes.miklos@mkk.szie.hu