



dr. Sztareczky Géza gyógyszerész ezredes (1901–1985)

Mély megrendüléssel és nehéz szívvel emlékezünk meg Dr. Sztareczky Géza gyógyszerész ezredes elvtárs, munkatársunk, barátunk haláláról.

1985. nov. 30-án, 84 éves korában, jó egészségnek örvendő, váratlan hirtelenséggel távozott szeretett családjá köréből.

Hosszú életpályájára a tolesvai néptanító édesapa szellemi örökségével, Sárospatakon befejezett középiskolai tanulmányaival indult. A Pázmány Péter Tudomány Egyetemen 1922-ben gyógyszerési oklevelet, majd az egyetem Közegészségügyi-Járványügyi tanszékén gyógyszerész doktori címet szerzett.

1922-től mintegy 48 évet töltött a magyar katonaegészségügy szolgálatában. A 3. sz. Honvéd Kórházban beosztott polgári gyógyszerészként kezdte munkáját. 1931-től a Honvéd Egészségügyi Anyagszertár osztályvezetője. 1938-tól őrnagy és a Honvéd Közegészségügyi Intézet kémia osztályát vezette.

A felszabadulás után a Központi Honvéd Kórház gyógyszerzetárának vezetője. 1947-ben már ezredes és 1949-ig a Honvéd Egészségügyi Anyagszertár parancsnoka volt. 1949-ben végleg visszatért a katonai közegészségügyhöz, és ismét a Honvéd Közegészségügyi Intézet kémiai osztályának vezetését bízták rá. 1952-től a Honvéd Egészségügyi Tudományos Kutató Intézet vizsgálgó osztályát vezette.

1957-ben, az akkor megalakult MN KÖJÁL-ból vonult először nyugállományba, de polgári dolgozóként 1970 novemberéig tovább végezte az intézet ivóvíz-szennyvízvizsgáló laboratóriumának munkáit.

Hosszú, folyamatos munkában gazdag élete során tudományos munkásságával számos, a vízellátás problémáival, a tábori vízvizsgálat és tisztítás módszereivel, valamint vízjogi kérdésekkel foglalkozó közleményeivel beírta nevét nemcsak a katonai, hanem az egész magyar vízhigéniá történetébe is.

Sokirányú és tartalmas munkája elismerésül pályafutása során számos dícséretet és kitüntetést kapott, melyek közül kiemelkedik a Vörös Csillag Érdemrend, a Magyar Köztársasági Érdemérem arany fokozata és az Egészségügy Kiváló Dolgozója cím.

Az otthoni és sárospataki környezetből magába szívott igaz hittel, céltudatossággal és szeretettel oktatta, nevelte fiatal kollégáit az egyetemes emberi haladást jelentő tudás megszerzésére. Magas beosztásokban, nehéz kötelesség teljesítése közben is olyan ember tudott maradni, aki méltó volt munkatársai szeretetére. Közvetlensége, szerénysége, mindenki által tisztelt szakmai tudása tette őt megbecsültté, nélkülözhetetlenné. Munkatársai mesterüket tisztelték benne.

Hivatását és az embereket szerető, tiszta szívű kolléga elhunytá nagy veszteséget jelent a katonai közegészségügy és az egész magyar közegészségügy számára.

Példamutató életét, munkáját, emlékét híven megőrizzük.

calypsol[®] injekció

Gyors hatású altató és általános érzéstelenítő, amely valószínűleg az agykéregre és a középagyra hat, különösen a limbikus rendszerre.

Felnőtteknek 10 mg/tskg adagja rendszerint 12—25 perces anesztéziát biztosít.

Az altatás fenntartásához az említett dózisok fele használatos.

HATÓANYAG

500 mg ketaminum, sósavas só alakjában 10 ml-es üvegben.

JAVALLATOK

Önállóan alkalmazva rövid műtétek, eszközös, ill. fájdalom diagnosztikai beavatkozások.

Anesztézia bevezetése egyéb narkotikumok használatát előtti. Gyengébb hatású narkotikumok (pl. dinitrogénoxid) erősítése.

ELLENJAVALLATOK

Eclampsia, hipertónia-betegség.

ADAGOLÁS

Egyénenként változó.

Az intravénás kezdeti adag:

- felnőtteknek 1,0—4,5 mg/tskg;
- gyermekeknek 0,5—4,5 mg/tskg.

Az 5—10 perces narkózist eredményező átlagos adag 2,0 mg/tskg.

Az intramuscularis kezdeti adag:

- felnőtteknek 6,5—13,0 mg/tskg;
- gyermekeknek 2,0—5,0 mg/tskg.

MELLÉKHATÁSOK

Tenziónövekedés, pulzusszám-emelkedés, nyálfolyás, hányinger, hányás, légzési és látási zavarok. Az ébredési szakban hallucináció, pszichomotoros nyugtalanság, zavartság.

A poszt-narkotikus nyugtalanság Droperidollal (0,1 mg/tskg im.) rendszerint megelőzhető.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK

Kompatibilis más narkotikumokkal és izomrelaxánsokkal.

Fokozza a tubokurarin neuromuskuláris blokkoló hatását, de nem befolyásolja a pankuronium és szukcinilkolin hatását.

Thyroid-kezelés során emelheti a vérnyomást és tachikardizál.

FIGYELMEZTETÉS

Túlادagolás esetén légzési elégtelenség léphet fel. Ilyenkor a légcserét mechanikusan kell támogatni, mert az analeptikumok rendszerint elégtelenek. A készítmény alkalmazása aneszteziológus jelenlétéhez és megfelelő intézeti körülményekhez kötött. Lassan iv. fecskendezendő be, több mint 60 másodperc alatt. A barbiturátok kémiaiilag összeférhetetlenek a ketammal, így közös fecskendőbe nem szívhatók fel.

Kőbányai Gyógyszerárugyár,
Budapest

