

REFERÁTUMOK

Ebotabe Arrey A., Bilsen J., Lacor P., Deschepper R.:

“It’s My Secret”: Fear of Disclosure among Sub-Saharan African Migrant Women Living with HIV/AIDS in Belgium

(„Ez az én titkom”: Beismeréstől való félelem Belgiumban élő HIV/AIDS pozitív szubszaharai migránsnők körében.)

PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0119653 March 17, 2015.

A HIV fertőzött személyeknek nemcsak a gyógyíthatatlan betegség kihívásaival kell szembenézniük, de azzal is, hogy vajon elmondják-e partnereiknek, családjuknak és barátaiknak az állapotukat. Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen mértékben vállalják fel HIV pozitívitásukat a Belgiumban élő szubszaharai régióból érkezett migránsnők, a beismeréshez, vagy eltitkoláshoz vezető okokat, és miképp küzdenek meg a beismeréssel járó nehézségekkel.

Ez a kvalitatív tanulmány 28 szubszaharai HIV pozitív vagy AIDS beteg nővel készült. Tematikus tartomelemzést használtak a felmerülő témák analizálására. A tanulmányból kiderül, hogy ezek a személyek általában csak az egészségügyi ellátóknak vallják be állapotukat/betegségüket, és kizárólagosan azért teszik, mert csak így juthatnak hozzá a szükséges gyógykezeléshez. A szelektív bevallás leginkább annak a tabunak köszönhető, ami körülveszi a HIV/AIDS beteget a szubszaharai populációban. A stigmatizáció és önstigmatizáció is jelentősen megnehezíti a HIV/AIDS-ről való beszédet és a bevallást. Szükségesek olyan technikák, amelyek szisztematikusan magukban foglalják a bevallás elősegítését. Ezeket a módszereket fontos lenne beépíteni a tesztelés utáni terápiákba, segítve mind a fertőzötteket, mind az egészségeseket.

Sharma S, Carballo M, Feld J. J., Janssen H. L.A.:

Immigration and viral hepatitis (Migránsok és a virális Hepatitis)

Journal of Hepatology, Vol. 63, Issue 2, p 515–522, Published online: May 8 2015

A WHO becslése szerint a virális eredetű Hepatitis prevalenciája akár 500 millióra is tehető, valamint 1,3 millió haláleset köthető a betegséghez. Ez a probléma túlnyomórészt a fejlődő országok lakosait sújtja, ahol nagyarányú a HBV és HCV vertikális és a iatrogén fertőződés előfordulási aránya, melyhez további súlyosbító tényezőként társul az egészségügyi ellátórendszer elégtelensége is.

2013-ban a világ teljes lakosságának 3,2%-a (231 millió fő) vándorolt befogadó nemzetéhez. A migránsok elsősorban a fejlődő országokból származnak, elsődleges úti céljaik pedig Észak-Amerika és Nyugat-Európa. Ez a típusú migráció (fejlődő országok lakosságának vándorlása) egy különleges kihívás elé állítja a befogadó országok egészségügyi ellátó hálóját.

Az általános szűrési, vakcinációs, kezelési standardok és protokollok hiányában a krónikus májbetegségek, a hepatocelluláris májkarcinómák világszerte egyre nagyobb problémát jelentenek a migráns populációkon belül. Azok az erőfeszítések, amelyek az esetek szűrését és kezelését célozzák, csupán néhány városi központ programjaira korlátozódnak, miközben a bevándorlók nagy része nem is tud a fertőzöttségéről.

Ez a tanulmány összefoglalja a rendelkezésre álló adatokat a virális hepatitis és a krónikus májbetegségek előfordulási arányáról, a migráns csoportok körében alkalmazott szűrési és kezelési eljárások jelenlegi szabályzóit, valamint a felismerést és kezelést elősegítő programokat.

Referálta: Damás D. Éva